

Series Acanthophorae KLOTZ, ser. nov.

Typus: *Rochefortia acanthophora* (DC.) GRISEB.

Lamina foliorum parva (ad 15 x 6 mm magna), flores sessiles vel breviter pedicellati.

*Rochefortia acanthophora* (DC.) GRISEB. Fl. Brit. W.  
Ind. 482 (1862)

Bas.: *Ehretia acanthophora* DC. Prodr. 9: 510 (1845)

Typus: Santo Domingo, prope Biajama; leg. BERTERO  
no. 565.

Distrib. geogr.: Jamaica, Hispaniola, Porto Rico,  
Ins. Antill. min.

*Rochefortia cubensis* BRITT. & WILS. in Mem.  
Torr. Bot. Club 16: 96 (1920)

Typus: Cuba centralis, prope Marianao,  
leg. LEON no. 7228.

Distrib. geogr.: Cuba end.

*Rochefortia oblanceata* KLOTZ spec. nov.

Species nova *R. acanthophorae* valde similis sed laminis foliorum angustioribus in petiolum longe angustatis supra glabris differt.

Typus: Cuba occidentalis, Loma Peluda de Cajalbana  
leg. J. BISSE & H. LIPPOLD 15. IX. 1970 HAJB.

Distrib. geogr.: Cuba occidentalis, Altiplano de  
Cajalbana et Sierra del Infierno.  
Hab. in fruticetis siccis serpentinosis et calcareis.

Sectio Stellatae KLOTZ in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Nat. R. 29: 470 (1980)

Lamina foliorum subtus plerumque stellato-tomentosa.