V. *Ueber neue Schwefelsalze;
von R. Schneider.*

(Neunte Abhandlung.)¹⁾

32. Schwefelkalium - Schwefelnickel.

Zur Darstellung dieser Verbindung schmilzt man am besten 1 Theil krystallisirtes schwefelsaures Nickeloxydul mit 9 Theilen reinem kohlsaurem Kali und 9 Theilen Schwefel über der Gebläselampe zusammen, hält die Masse etwa 8 bis 10 Minuten bei Rothglühhitze in Fluß und behandelt die erkaltete Schmelze mit kaltem luftfreiem Wasser. Dabei hinterbleibt, während der Ueberschuß des Schwefelkaliums nebst etwas (Zweifach-) Schwefelnickel sich mit brauner Farbe löst, die neue Verbindung in der Form speigelber, metallglänzender Krystallblättchen, die unter dem Mikroskop theils sechseitig und dann häufig in der Richtung dreier von den abwechselnden Ecken nach dem Mittelpunkte des Sechsecks laufenden Linien zerrissen, theils rautenförmig und dann nicht selten schnurartig aneinander gereiht erscheinen.

Man wäscht dieselben zunächst mit luftfreiem Wasser — wobei sie sich indeß in Folge beginnender Oxydation und eines theilweisen Verlustes an Schwefelkalium stets tobackbraun färben —, zuletzt mit absolutem Alkohol aus, preßt sie stark zwischen Fließpapier ab und trocknet sie endlich entweder im Vacuum über Schwefelsäure oder im Strome von trockener Kohlensäure. Die Ausbeute pflegt für 10 Theile schwefelsaures Nickeloxydul nur etwa 4 Theile zu betragen.

Wendet man bei der Darstellung dieser Verbindung auf 1 Theil schwefelsaures Nickeloxydul weniger als je 9 Theile Pottasche und Schwefel an, etwa nur 6 Theile von jedem, so findet man in der Bodenschicht der er-

1) Achte Abhandlung s. diese Annalen, Jubelband S. 158 bis 165.

starrten Schmelze einen kleineren oder größeren Regulus eingelagert, der wesentlich aus Halb-Schwefelnickel besteht.

Da die in Rede stehende Verbindung, wie oben bereits bemerkt wurde, sich in Berührung mit Luft und Wasser schon bei gewöhnlicher Temperatur leicht verändert, so konnte kaum erwartet werden, daß bei der Analyse derselben genaue und übereinstimmende Resultate sich ergeben würden. Die beobachteten Werthe waren folgende:

- 1) 0,379 Grm., durch Schmelzen mit Kali und Salpeter zersetzt, gaben 0,224 Grm. Nickeloxydul und 0,924 Grm. schwefelsauren Baryt.
- 2) 0,294 Grm. (einer anderen Bereitung) gaben bei gleicher Behandlung 0,171 Grm. Nickeloxydul und 0,732 Grm. schwefelsauren Baryt.
- 3) 0,295 Grm. (derselben Bereitung wie bei 2) gaben 0,124 Grm. schwefelsaures Kali.
- 4) 0,3025 Grm. einer besonderen Bereitung (unter Kohlensäure stark erhitzt) gaben 0,180 Grm. Nickeloxydul und 0,777 Grm. schwefelsauren Baryt.

Aus diesen Zahlen ergibt sich das atomistische Verhältniß zwischen Kalium, Nickel und Schwefel annähernd wie

K		Ni		S
2	:	3	:	4

wie aus folgender Zusammenstellung des Näheren ersichtlich ist.

Berechnet:		Gefunden:			
		I.	II.	III.	IV.
K ₂ = 78,26	20,53 Proc.	—	—	18,91	
Ni ₃ = 174,00 1)	45,79 „	46,30	45,60	—	46,64
S ₄ = 128,00	33,68 „	33,48	34,18	—	35,27
	<hr/> 380,26				
	100,00.				

- 1) Es wird kaum einer besonderen Rechtfertigung bedürfen, wenn ich das Atomgewicht des Nickels = 58 setze. Es ist dies die Zahl, die ich selbst (diese Annal. Bd. 101, S. 387 und Bd. 107, S. 616)

Aus diesen Daten können für die rationelle Zusammensetzung der fraglichen Verbindung die beiden folgenden Ausdrücke abgeleitet werden:

bei wiederholten Bestimmungen gefunden habe und die später auch v. Sommaruga (Sitzungsber. der Wiener Acad. Juni 1866; auch chem. Centralbl. 1866, S. 1009) erhalten hat und zwar bei einer längeren Reihe von Versuchen, die nach einer von der meinigen ganz abweichenden Methode ausgeführt wurden.

Während v. Sommaruga das Atomgewicht des Nickels aus dem Schwefelsäuregehalte des krystallisirten, wasserhaltigen schwefelsauren Nickeloxydul-Kalis ableitete, wurde bei meinen Versuchen das relative Gewichtsverhältniß zwischen dem Kohlenstoff- und dem Nickelgehalte im reinen oxalsauren Nickeloxydul bestimmt und daraus das Atomgewicht des Metalles berechnet.

Ich glaube, daß beide Methoden sich sowohl durch ihre Einfachheit als durch die Sicherheit der Basis, auf der sie ruhen, vorthellhaft auszeichnen. Der gegen meine Methode erhobene Einwand, daß man oxalsaure Salze nicht mit Sicherheit völlig trocken und zugleich unzersetzt erhalten könne, ist durchaus hinfällig: ich habe mich gar nicht bemüht, das oxalsaure Nickeloxydul vor der Verwendung in den völlig trockenen Zustand zu bringen und ich brauchte dies um so weniger, als der Wassergehalt des Salzes weder die Genauigkeit der Kohlenstoff-, noch die der Nickelbestimmung im Geringsten zu alteriren vermochte.

Abweichend von v. Sommaruga und mir haben Marignac, Dumas, Russel und Winkler für das Atomgewicht des Nickels Zahlen erhalten, die zwischen 58,4 und 59,28 schwanken. Was die Bestimmungen von Marignac und Dumas betrifft, so habe ich schon im Jahre 1859 (diese Annal. Bd. 107, S. 616) die Bedenken angedeutet, die mir der Zuverlässigkeit der von diesen Chemikern gewählten Methoden entgegenzustehen scheinen. Aehnliches ist später (diese Annal. Bd. 130, S. 303) bezüglich der Arbeit von Russel geschehen. Keiner dieser von mir erhobenen Einwände hat bis jetzt eine Entgegnung erfahren und dies bestärkt mich in der Annahme, daß dieselben nicht ganz unbegründet gewesen sind.

Der Versuch von Winkler (Zeitschr. d. analyt. Chemie Bd. VI, S. 28), das Atomgewicht des Nickels aus der Menge von Gold zu bestimmen, die aus einer neutralen Goldchloridlösung durch eine bekannte Menge metallischen Nickels gefällt wird, scheint mir kein besonders glücklicher zu seyn, da das Atomgewicht des Goldes nicht

Nach dem Verhalten der Verbindung hat der letztere Ausdruck die grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Die-

genau genug bestimmt ist, um als Basis für die Bestimmung anderer Atomgewichte benutzt werden zu können. Ausserdem sind die Versuche mit verhältnissmässig sehr geringen und mit wenig unter einander verschiedenen Mengen (0,436 bis 0,6002 Grm.) Nickel ausgeführt worden; auch findet sich (worauf schon im Jahresbericht der Chemie für 1867 S. 290 aufmerksam gemacht ist) über die Prüfung des reducirten Goldes auf seine Reinheit Nichts angegeben.

Was endlich die Versuche von Lee (Sill. Journ. (3) 2, S. 44, auch Chem. Centralbl. 1871, S. 532) betrifft, bei denen das Atomgewicht des Nickels aus der Analyse des Brucin- und Strychnin-Nickecyanids abgeleitet wurde, so haben dieselben wohl kaum auf die Bezeichnung einer Atomgewichtsbestimmung Anspruch. Salze von so complicirter Zusammensetzung wie die in diesem Falle herangezogenen, deren Metallgehalt noch nicht 6 Proc. beträgt und deren absolute Reinheit doch wohl kaum mit genügender Sicherheit verbürgt werden kann, sollten nicht als Basis für Atomgewichtsbestimmungen genommen werden.

Ich glaube unter diesen Umständen auch keinen besonderen Werth darauf legen zu sollen, daß bei diesen Bestimmungen das Atomgewicht des Nickels = 58 gefunden wurde: ich kann darin eine Bestätigung der von mir gefundenen Zahl ebenso wenig erkennen, als ich geneigt bin, die von Lee aus ähnlichen Versuchen für das Atomgewicht des Kobalts abgeleitete Zahl (59) als eine Widerlegung der von mir erhaltenen Zahl (60) zu betrachten.

Auch die Angaben, die von verschiedenen anderen Chemikern über das Atomgewicht des Kobalts gemacht worden sind, haben mich nicht von der Unrichtigkeit der von mir gefundenen, durch v. Sommaruga (l. c.) bestätigten Zahl (60) überzeugen können.

Das von mir bei der Bestimmung dieser Zahl gewählte Verfahren ist im Wesentlichen dasselbe, nach dem ich auch das Atomgewicht des Nickels bestimmt habe. v. Sommaruga leitete das Atomgewicht des Kobalts aus dem Kobaltgehalte des reinen Purpureokobaltchlorids (nach Gibbs und Genth) ab. Daß bei beiden, so wesentlich von einander abweichenden Methoden genau dasselbe Resultat erhalten wurde, dürfte für die von uns gefundene Zahl als eine bedeutende Stütze zu betrachten seyn.

Bezüglich der Bestimmungen von Marignac, Dumas, Russel, Winkler und Lee gelten ganz dieselben Bedenken, die ich betreffs der Angaben dieser Chemiker über das Atomgewicht des Nickels theils früher (l. c.), theils im Vorstehenden ausgesprochen habe.

Es erübrigt nur, der Versuche, die neuerlich von Weselsky

selbe verliert nämlich beim Erhitzen im Wasserstoffstrome einen Theil ihres Schwefels unter Schwefelwasserstoff-Entwicklung. Da nun nach den Beobachtungen von Arfvedson, die durch H. Rose¹⁾ bestätigt worden sind, das Einfach-Schwefelnickel selbst bei Glühhitze nicht durch Wasserstoff reducirt wird und da nicht anzunehmen ist, daß es in Verbindung mit Schwefelkalium leichter, als für sich reducirt werden sollte, so kann die Verbindung nicht wohl Einfach-Schwefelnickel enthalten und es erscheint demnach die Formel $K_2S, 3NiS$ ausgeschlossen.

Ist aber die Formel $K_2S, Ni_2S \mid NiS_2$ der richtige Ausdruck, so muß die Verbindung beim Erhitzen im Wasserstoffstrome $\frac{1}{4}$ ihres Schwefelgehaltes verlieren. Dies ist in der That der Fall, wie die folgenden Zahlen beweisen.

- 1) 0,636 Grm. (unter Kohlensäure scharf getrocknet), so lange im Wasserstoffstrome zum Glühen erhitzt, bis kein Schwefelwasserstoff mehr auftrat, verloren 0,054 Gr. Das Auftreten von freiem Schwefel wurde dabei nicht beobachtet.
- 2) 0,397 Gr. gaben (beim Erhitzen im Wasserstoffstrome, Einleiten des entwickelten Schwefelwasserstoffs in

(Sitzungs-Ber. der Wiener Acad. LX, 261; auch Chem. Centralbl. 1870, S. 92) angestellt worden sind, mit einigen Worten zu gedenken. W. hat das Atomgewicht des Kobalts aus dem Kobaltgehalte des Ammoniumkobaltcyanids und des Phenylammoniumkobaltcyanids abzuleiten versucht. Die gefundenen Zahlen ergaben im Mittel aus 5 Versuchen $Co = 58,96$.

Ich glaube nicht allein zu stehen mit der Ansicht, daß Salze von so complicirter Zusammensetzung, wie die von W. benutzten, — Salze, die sich gewiß nur sehr schwierig im völlig reinen und zugleich im Zustande normaler Trockenheit darstellen lassen —, für den Zweck von Atomgewichts-Bestimmungen wenig geeignete Formen sind. Genaue Analysen solcher Salze haben unbestritten ihren hohen wissenschaftlichen Werth, den ich durchaus nicht unterschätze, die Bedeutung von Atomgewichts-Bestimmungen aber haben sie nach meinem Dafürhalten nicht, — wenigstens nicht im Sinne der auch jetzt noch sehr beherzigenswerthen Grundsätze, die einst Berzelius für die Ausführung derartiger Bestimmungen aufgestellt hat.

1) Diese Bd. 4, S. 129.

eine ammoniakalische Lösung von salpetersaurem Kupferoxyd und Oxydation des Schwefelkupfers) 0,233 Grm. schwefelsauren Baryt.

$\frac{1}{4}$ vom Schwefelgehalte der Verbindung beträgt:	Beobachteter Verlust:	
	I.	II.
8,42 Proc.	8,47	8,06.

Die Reaction verläuft demnach wohl im Sinne der Zeichen

Der Reductionsrückstand, der in der Hitze dunkelkupferroth, nach dem Erkalten broncefarben erscheint, zeigt nicht mehr das Verhalten eines Sulfosalzes. Wasser entzieht demselben ziemlich leicht den Gehalt an Schwefelkalium; der Rückstand giebt an Salzsäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff einen Theil des Nickels ab mit Hinterlassung eines stahlgrauen krystallinischen Pulvers, das selbst von kochender Salzsäure kaum angegriffen wird.

Nach diesem Allen glaube ich, daß der fraglichen Verbindung die rationelle Formel

ertheilt werden muß. Die Annahme, daß Zweifach-Schwefelnickel als näherer Bestandtheil in derselben enthalten sey, dürfte umsomehr gerechtfertigt erscheinen, als schon bei früheren Versuchen anderer Chemiker und zwar unter Bedingungen, die den von mir eingehaltenen mindestens sehr ähnlich waren, die Bildung von Zweifach-Schwefelnickel beobachtet wurde. Fellenberg ¹⁾ erhielt diese Verbindung als dunkeleisengraues, sich zart anfühlendes, metallglänzendes Pulver beim starken Glühen von Nickeloxydul mit Schwefel und kohlensaurem Kali und Auswaschen mit Wasser. Daraus, daß Fellenberg bei der Bereitung der Schmelze, wie es scheint, eine verhältnißmäßsig ge-

1) Diese Annal. Bd. 50, S. 75.

ringe Menge ¹⁾ kohlensaures Kali und Schwefel und eine sehr hohe Temperatur (Weißgluth) anwandte, mag es sich erklären, daß bei seinen Versuchen nur Zweifach-Schwefelnickel, nicht ein Sulfosalz desselben erhalten wurde.

Es verdient Beachtung, daß das in Rede stehende Sulfosalz hinsichtlich seiner Constitution der schönen Palladium-Verbindung

gleichet, die ich unter 22 (in der fünften Abhandlung ²⁾) ausführlich besprochen habe.

Schmilzt man schwefelsaures Nickeloxydul anstatt mit Pottasche und Schwefel mit Soda und Schwefel (im Verhältniß von 1 : 6 : 6) zusammen, so erhält man bei der Behandlung der Schmelze mit Wasser Krystallblättchen, die der oben beschriebenen Kaliumverbindung ähnlich, aber von etwas dunklerer Farbe, nach dem Trocknen fast schwarzbraun sind. Ich habe dieselben nicht näher untersucht, halte es aber für sehr wahrscheinlich, daß sie eine der Kaliumverbindung analoge Zusammensetzung besitzen.

33. Schwefelkalium-Schwefelkobalt (?) und Anderthalbfach-Schwefelkobalt.

Fellenberg ³⁾ erhielt, als er ein Gemenge von kohlen-saurem Kobaltoxydul, Schwefelblumen und kohlen-saurem Kali der starken Weißgluth aussetzte, eine Masse, die nach dem Auslaugen mit Wasser ein graphitgraues, metallisch glänzendes, krystallinisches Pulver von der Zusammensetzung des *Anderthalbfach-Schwefelkobalts* hinterließ. Es wurden nämlich bei der Analyse dieses Pulvers 55,45 Proc. Kobalt und 44,45 Proc. Schwefel gefunden, was der Formel $Co_2 S_3$ sehr nahe entspricht.

1) Die angewandten Verhältnisse zwischen Nickeloxydul, Pottasche und Schwefel sind in der Original-Abhandlung nicht näher angegeben.

2) Diese Annal. Bd. 141, S. 519.

3) Diese Annal. Bd. 50, S. 73.

Mir ist es trotz wiederholter Versuche nicht gelungen, durch Zusammenschmelzen von metallischem Kobalt (oder Kobaltchlorür) mit Pottasche und Schwefel reines *Anderthalbfach-Schwefelkobalt* oder ein Schwefelsalz des Kobalts im reinen Zustande zu erhalten. Wendet man auf 1 Theil Kobalt (oder 2 Theile Kobaltchlorür) 18 bis 24 Theile Pottasche und ebensoviel Schwefel an, so scheiden sich aus der Schmelze bei der Behandlung mit Wasser zwar ziemlich zahlreiche weißgraue, lebhaft glänzende, hexagonale Blättchen ab, die ein Schwefelsalz (Schwefelkalium-Schwefelkobalt?) zu seyn scheinen; doch ist denselben stets ein schwarzes, undeutlich krystallinisches Pulver in relativ großer Quantität beigemischt, von welchem jene Blättchen durch Schlämmen nicht vollständig und nicht sicher getrennt werden können.

Ich vermag daher über die Zusammensetzung beider Substanzen Näheres nicht anzugeben.

Beim Zusammenschmelzen von Kobaltchlorür mit Soda und Schwefel wird gleichfalls die Bildung eines Schwefelsalzes nicht beobachtet, dagegen erhält man unter diesen Umständen mit Leichtigkeit ein sehr reines *Anderthalbfach-Schwefelkobalt*. Dasselbe hinterbleibt, wenn man 1 Theil Kobaltchlorür mit 6 Theilen Soda und 6 Theilen Schwefel etwa 10 Minuten über der Gebläselampe bei heller Rothgluth zusammenschmilzt, bei der Behandlung der erkalteten Schmelze mit Wasser unter der Form lichteisengrauer Krystallblättchen, die unter dem Mikroskop bisweilen wie zerrissene und zerklüftete Sechsecke erscheinen, meistens aber eine unregelmäßige Begränzung zeigen.

Bei der Analyse dieser Krystallblättchen wurde Folgendes beobachtet:

0,316 Grm. (bei 100 bis 105° C. getrocknet) gaben, durch Schmelzen mit Salpeter und Kali zersetzt, 0,1755 Grm. Kobalt und 0,998 Gr. schwefelsauren Baryt.

Der Formel Co_2S_3 entsprechen folgende Zahlen:

	Berechn.	Gefund.
$\text{Co}_2 = 120$ ¹⁾	55,55 Proc.	55,54
$\text{S}_2 = 96$	44,45 „	44,18
<hr/> 216	<hr/> 100,00.	

Die in Rede stehende Substanz ist also reines *Andert-halbfach-Schwefelkobalt* und es dürfte die im Vorstehen- den beschriebene Methode die bequemste und sicherste zur Darstellung dieser Verbindung seyn.

Bezüglich des Verhaltens der letzteren wäre nur noch hinzuzufügen, daß sie von Salzsäure nur wenig angegrif- fen und selbst von Königswasser nur langsam, bei fort- gesetztem Kochen aber vollständig unter Ausscheidung von Schwefel zersetzt wird.

34. Schwefelnatrium-Schwefelmangan und Schwefelmangan.

Ueber Verbindungen des Schwefelmangans mit Schwe- felalkalimetallen liegen einige ältere Angaben vor, deren hier kurz Erwähnung zu thun ist.

Berthier ²⁾ erhielt, indem er ein Gemenge von 10 Thei- len trockenem schwefelsaurem Manganoxydul und 5 Thei- len geschmolzenem Glaubersalz in einem Kohlentiegel der Weißgluth aussetzte, eine dichte, blaßbräunlichrothe, nicht metallglänzende Masse von körnigem Bruch, die 26 Proc. Schwefelnatrium enthielt. Diesem Gehalte an Schwefel- natrium würde, wenn sonst die fragliche Substanz über- haupt als eine Verbindung nach einfachen Verhältnissen angesehen werden darf, ziemlich genau die Formel $2\text{Na}_2\text{S}$, 5MnS entsprechen.

Nach den Beobachtungen von Völker ³⁾ werden beim Zusammenschmelzen von 1 Theil wasserfreiem schwefel- saurem Manganoxydul mit $\frac{1}{2}$ Theil Kienruß, 3 Theilen koh- lensaurem Kali und 3 Theilen Schwefel und Auslaugen der Schmelze mit Wasser dunkelrothe Krystallblättchen erhalten, die nach der Formel K_2S , 3MnS zusammenge-

1) Siehe die Note auf S. 440 und 441.

2) *Ann. chim. phys.* T. 22, p. 274.

3) *Annual. d. Chem. und Pharm.* Bd. 59, S. 35.

setzt sind. Dieselben oxydiren sich im feuchten Zustande an der Luft sehr leicht, wobei sie schwarz und undurchsichtig werden; beim Auswaschen mit lufthaltigem Wasser werden sie unter Hinterlassung von Schwefel und Manganoxyd allmählig zersetzt.

Auf ähnliche Weise wurde von Völker die Verbindung Na_2S , 3MnS erhalten. Diese bildet nach ihm kleine glänzende, hellrothe, nadelförmige Krystalle, die im feuchten Zustande gleichfalls zur Oxydation sehr geneigt sind.

Bei den von mir angestellten Versuchen wurden auf 1 Theil kryst. schwefelsaures Manganoxydul 6 Th. trockne Soda und 6 Theile Schwefel angewandt und es wurde die Masse 10 Minuten lang bei heller Rothgluth in Fluß erhalten. Die erkaltete Schmelze hinterließ bei der Behandlung mit luftfreiem Wasser zahlreiche, lichtfleischfarbene, zarte glänzende Krystallchen von der Form etwas plattgedrückter, zum Theil federbartartig aneinander gereihter Nadeln. War indeß die Temperatur nicht hoch genug gesteigert oder war die Schmelzdauer abgekürzt worden, so fand sich mehr oder weniger grünes Schwefelmangan (s. darüber weiter unten) den fleischrothen Nadeln beigemengt.

Die letzteren wurden nun, da sie bei der Berührung mit Wasser leicht einen Verlust an Schwefelnatrium erfahren und da sie zugleich zur Oxydation in hohem Maasse geneigt sind, schnell mit wenig luftfreiem Wasser ausgewaschen, zwischen Fließpapier abgepresst und im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet. Wenn es trotz aller dieser Vorsichtsmaßregeln nicht gelungen ist, das Präparat vor einer partiellen Zersetzung zu bewahren, so ist dieß für die Veränderlichkeit desselben der beste Beweis.

Obschon die so bereitete Verbindung hinsichtlich ihrer äußeren Eigenschaften und ihres Verhaltens mit der von Völker erhaltenen Verbindung Na_2S , 3MnS eine große Uebereinstimmung zeigt, so weicht sie doch in der Zusammensetzung wesentlich von dieser ab, wie die folgenden Zahlen zeigen werden.

- 1) 0,344 Grm. (trotz der Aufbewahrung in einem dicht verschlossenen Gefäße schwach gebräunt) gaben, durch Salzsäure zersetzt, 0,170 Grm. schwefelsaures Natron und 0,202 Gr. Manganoxyduloxyd.
- 2) 0,330 Grm. (derselben Bereitung) gaben beim Schmelzen mit Salpeter und Kali 0,626 Grm. schwefelsauren Baryt.
- 3) 0,416 Grm. (einer besonderen Bereitung) gaben 0,212 Grm. schwefelsaures Natron und 0,250 Grm. Manganoxyduloxyd. Bei der Zersetzung dieser Substanz durch Salzsäure schied sich ein wenig Schwefel aus, was auf eine schwache Oxydation hindeutet, die das Präparat bereits erfahren hatte.

Diese Zahlen führen zu der Formel

Zwar befinden sie sich mit derselben nicht in genauer Uebereinstimmung, doch dürfte kaum ein anderer formularischer Ausdruck größere Wahrscheinlichkeit für sich haben; keinenfalls erscheint die Formel $\text{Na}_2\text{S}, 3\text{MnS}$ zulässig, wie aus folgender Zusammenstellung sich ergibt.

Berechnet:		Gefunden:			Berechnet nach $\text{Na}_2\text{S}, 3\text{MnS}$:
		I.	II.	III.	
$\text{Mn}_2 = 108^1)$	43,2 Proc.	42,07	—	43,07	48,21
$\text{Na}_2 = 46$	18,4 „	16,00	—	16,51	13,69
$\text{S}_3 = 96$	38,4 „	—	37,4	—	38,10
<hr/>		250	100,0.		

- 1) Obschon das Atomgewicht des Mangans jetzt ziemlich allgemein zu 55 angenommen wird, vermag ich doch die von mir (diese Annal. Bd. 107, S. 605) gefundene Zahl (54), selbst bei der gewissenhaftesten Prüfung alles dessen, was etwa gegen dieselbe sprechen könnte, nicht als widerlegt zu betrachten.

Die Zahl 55 gründet sich hauptsächlich auf die neueren Bestimmungen von Dumas (*Annal. d. chim. et phys.* (3) T. LV, p. 129) und sie ist eine von denen, die aus der Analyse der entsprechenden Chloride abgeleitet worden sind. Ich kann bezüglich dieser Bestimmungen nur wiederholen, was ich schon einmal ausgesprochen habe: daß ich die Wahl von Chlormetallen als Grundlage für Atomgewichts-Bestimmungen nicht unbedingt für eine glückliche halte, —

Wie man sieht, wurde erheblich weniger Natrium und auch weniger Schwefel gefunden, als der Formel entspricht, auch wurde die Analyse von einem Verlust von über 3 Proc. getroffen; dies Alles aber scheint mir mit Rücksicht auf das oben erwähnte Verhalten der Substanz gegen Wasser und den atmosphärischen Sauerstoff weit mehr zu Gunsten der Formel Na_2S , 3MnS als gegen dieselbe zu sprechen.

Es existiren demnach zwei Verbindungen von Schwefelmangan mit Schwefelnatrium, diese sind

Die Verbindung Na_2S , 2MnS gleicht hinsichtlich ihrer

deshalb nicht, weil viele dieser Verbindungen (so auch das Chlormangan) sehr hygroskopisch und bei der Temperatur, der sie behufs der völligen Entwässerung ausgesetzt werden müssen, zur Aufnahme von Sauerstoff (sey es aus der Luft, sey es aus einer partiellen Zersetzung des angezogenen Wassers herrührend) außerordentlich geneigt sind. Ich erinnere daran, daß Dumas bei Anwendung desselben Principis auf die Bestimmung des Atomgewichts des Magnesiums dieses zu 25, also über 4 Proc. zu hoch fand. Was beweist, daß nicht die nach ganz demselben Verfahren ausgeführte Bestimmung der Größe des Manganatoms von einem ähnlichen Fehler getroffen worden ist?

Leider scheinen einige Angaben von H. Rose, die als eine Bestätigung für die von mir gefundene Zahl (54) gelten können, wenig beachtet worden zu seyn. Diese Angaben finden sich in den chemisch-analytischen Beiträgen, die H. Rose in den letzten Jahren seines Lebens geliefert hat und zwar in dem Abschnitt „Mangan“ (diese Annal. Bd. 110, S. 124), wo die Zahlennachweise gegeben sind für das Gewichtsverhältniß zwischen kryst. schwefelsaurem Manganoxydul und dem daraus durch Reduction erhaltenen Schwefelmangan. Ich mache darauf aufmerksam, daß die dabei beobachteten Werthe sich weit besser mit der von mir gefundenen Zahl (54) als mit der Zahl 55 für Mn in Einklang befinden. — Wer, wie ich, aus eigener Anschauung die Genauigkeit und Sorgfalt kennen gelernt hat, mit der jene Versuche ausgeführt wurden, kann nicht umhin, den dabei erhaltenen Resultaten einiges Gewicht beizulegen. Es wird hiernach nicht ungerechtfertigt erscheinen, wenn ich den obigen Berechnungen für Mn die Zahl 54 zu Grunde gelegt habe.

Constitution der früher von mir ¹⁾ beobachteten Verbindung K_2S , $2HgS$ und sie erinnert insofern an das Verhalten der letzteren, als sie bei der Behandlung mit Wasser Schwefelnatrium an dieses abgibt; freilich findet dies nur langsam und allmählich statt, während das Kalium-Quecksilbersulfid beim Zusammentreffen mit Wasser sofort den ganzen Gehalt an Schwefelkalium verliert, schwarzes Schwefelquecksilber hinterlassend.

Eine der im Vorstehenden beschriebenen Natrium-Verbindung entsprechend zusammengesetzte Verbindung von Schwefelkalium mit Schwefelmangan zu erhalten, habe ich mich vergeblich bemüht. Wird 1 Theil Mangansulfat mit 6 Theilen Pottasche und 6 Theilen Schwefel 5 bis 6 Minuten lang bei heller Rothgluth über der Gebläselampe zusammengeschmolzen, so hinterläßt die Schmelze bei der Behandlung mit Wasser wesentlich grünes und zwar krystallisirtes *Schwefelmangan* (s. darüber weiter unten), dem nur einzelne dünne, röthliche, durch Schlämmen leicht zu entfernende Blättchen beigemennt zu seyn pflegen. Ich habe diese Blättchen nicht in einer für die Analyse ausreichenden Menge erhalten können und vermag daher über ihre Zusammensetzung nichts Genaueres anzugeben, doch halte ich es nicht für unwahrscheinlich, daß ihnen die Formel K_2S , $2MnS$ zukommt.

Ähnlich ist der Erfolg, wenn man auf die gleiche Menge Mangansulfat die doppelte Menge kohlen-saures Kali und Schwefel anwendet, nur wird in diesem Falle ganz reines, von jeder fremden Beimengung freies Schwefelmangan als lebhaft grünes, krystallinisches Pulver erhalten.

Es scheint demnach nur die eine von Völker beobachtete Verbindung von Schwefelkalium mit Schwefelmangan (K_2S , $3MnS$) zu existiren und es scheinen für die Bildung derselben ein großer Reichthum der Schmelze an Mangan und die Anwendung einer sehr hohen Temperatur wesentliche Bedingungen zu seyn.

1) Diese Annal. Bd. 127, S. 488.

Das im Vorstehenden mehrfach erwähnte *Schwefelmangan* bildet ein grünes Krystallpulver, das unter dem Mikroskop als ein Aggregat von Nadeln erscheint, die häufig baumartig mit einander verwachsen sind. Bei sehr starker Vergrößerung gesehen, stellen sich diese Nadeln als Aggregate kleiner Krystallchen von regulärem Habitus (Octaëder und Würfel) dar.

Das Präparat läßt sich nicht an der Luft (im Wasserbade) trocknen, ohne eine partielle Oxydation (unter oberflächlicher Braunfärbung) zu erfahren. Es muß daher unter Wasserstoff getrocknet werden. Im trockenen Zustande ist es dunkelgrün.

Bei der Analyse desselben wurden aus 0,275 Grm. (unter mäßigem Erwärmen im Wasserstoffstrome getrocknet) 0,241 Grm. Manganoxyduloxyd erhalten. Dieser Werth befindet sich mit der Formel des Schwefelmangans in fast völliger Uebereinstimmung.

	Berechnet:	Gefunden:
Mn = 54	62,79 Proc.	62,84
S = 32	27,21 „	
86	100,00.	

Hinsichtlich seiner Eigenschaften und seines Verhaltens stimmt das Präparat mit dem auf andere Weise bereiteten Schwefelmangan überein.

Berlin, im November 1873.