ならたけハ歐米諸國ハ勿論本邦ニアリテモ極メテ普通ナル食用帽菌類ニシテ、種々ノ樹木ニ死物寄生ヲナスモノナルガ、予ノ東京附近及日光地方ニ於ケル觀察ニヨレバ、其針金狀ヲナセル菌絲束ハ、好ンデなら、くぬぎノ生活セル老株根上ニ繁殖シ、猶該樹林中ノ地中ニハ、到處夥シク蔓延スルヲ見ル。而シテおにのやがらハ此等樹株ニ接近シテ殊ニ多ク發生スルノ事實ハ、野外ノ觀察ニヨリテ容易ニ該植物ト菌絲束トノ間ニ密接ナル關係アルコトヲ知り得ベシ。

猶右ノ研究ニ關スル詳細ナル報告ハ圖版ト共ニ追テ發表スベシ。

○さんせうもノ生活史

保井　　コ　　ノ

Yasui, Miss K. : The Life History of *Sclerotinia natans*.

一、序　　論

さんしやうもニ關シテハ既ニ前世紀ノ前半頃ヨリホフマイスター (Hofmeister) メテニアス (Mehenius) 等ノ諸學者ノ研究記載セラレシモノアリト雖、千八百六十三年ニプリングスハイム (Pringsheim) 氏ノ公ケニセラレタル論文ニ至リテ初メテ詳細ナル研究ヲ得タリト云フ可シ、氏以前ニ於テハ此種ノ水中ニ存スル葉ヲ以テ根ト誤認シタリシガ氏ハ發生上ノ研究ヨリシテ其本性ヲ明カニシ初メテ水中葉ノ名ヲ下サレシナリ、サレバ氏ノ此論文モ其主要ナル點ハ茲ニアリテ前半ハ實ニ水中葉ニ關スル記載ヲ以テ占メラレ後半ニ於テ其他ノ部分即雌雄原葉體ノ發育及胚ノ發生ニ關スル記載ヲ收メラレシモ惜ム可シ氏ハ孢子ノ發育ニツキテハ何ノ記載ヲモ殘サレザリキ。

ジュラニー (Juranyi) 氏ハ大小孢子ノ發育ニ關シテ研究セラレ大孢子囊内ニ多數ノ大孢子ヲ生ズルモ其内一箇ノミ成熟シテ他ハ皆頽廢スルコトヲ觀察セラレ千八百七十三年是ニ關スル論文ヲ公ケニセラレタルモ尙不完全ノ點

多カリキ。

千八百七十九年ニプラントル (Pantle) 氏ハ大胞子ノ發芽ヨリ初メテ其原葉體上ニ藏卵器ヲ生ズルニ至ル迄ノ研究ヲ記載シ、小胞子ニ關シテモ亦若干ノ觀察ヲ記載シテ公ニセラレシモ、此論文ニハ圖版ヲ伴ハザリシヲ以テ稍其解釋ニ苦シム所アリ。

千八百八十二年ニ至リテハインリッヘル (Heinrich) 氏ハ、其胞子發育ニ關スル研究ヲ公ニシテジュラニー氏ノ說ヲ駁セラレ又此種ト近縁種トノ間ノ系統的關係ニツキテ記述セラレタリ、氏ノ大胞子囊ノ發育及大胞子膜ノ發達ニツキテノ記載ハ其正鵠ヲ得タルモノナリ。

千八百八十九年キアムベル (Campbell) 氏ハ小胞子ノ發芽ヨリ精蟲ノ形成ニ至ル迄ノ觀察ヲ公ケニセラル、氏ノ此研究ニツキテ千八百九十八年ベラエフ (Belajeff) 氏ハ其好著 "Über die männlichen Prothallien der Wasserfarne" 中ニ於テ此種ノ雄性原葉體ノ詳細ナル研究ヲ記載セラル、ト共ニ其異ヲ駁論セラレタリ、然ルニ千九百五年ニキアムベル氏ハ其著 "Mosses and Ferns" ノ第二版ニ於テ尙前說ヲ固執シテベラエフ氏ノ說ニ反對セリ。

以上列記スル各種ノ研究ニ於テ其記載ハ重ニ其組織構成ニ關スル點ニ止マリテ毫モ細胞内部ノ事ニツキテノ記載ニ及バザリキ、昨千九百九年一月子ハ本誌上ニ於テ、此種ニ關スル管見ヲ公ケニシ雄性原葉體ノ發育ニ關シテノ觀察ハベラエフ氏ト略ボ一致セル事ヲ報ジタルモ是亦其細胞學的記載ニ至リテハ他日ノ報告ヲ期スルニ止メタリキ。

然ルニ昨年十月ニ至リアーノルデイ (Arnoldi) 氏ハ其研究ノ結果ヲ公ケニセラレタリ、氏ノ研究ハ重ニ有性世代即原葉體ニ關スルモノニシテ雄性原葉體ノ發育ニツキテハ、氏モ亦ベラエフ氏ノ說ニ同意シ、其細胞學的研究ヲモ記載セラレタリ。

カクノ如ク、此種ノ原葉體ノ發育ニツキテハ諸種ノ研究報告ニ富メドモ胞子形成ニ關シテハ其研究數モ比較的少數ニ止マリ殊ニ其細胞學的記載ニ至リテハ皆無ナリト云フヲ妨ゲズ、而シテアーノルデイ氏ノ原葉體ノ細胞學的記載ハ予ノ觀察ト其差異根本的ナルモノアリ、故ニ茲ニ此種ノ發育ノ順序ヲ記載シ以テ其異ヲ辨ゼントス。

茲ニ予ハ此研究中ニ懇篤ナル指導ヲ與ヘラレタル三宅理學博士及此論文發表ニツキテ與ヘラレタル我母校長中川先生ノ御好意ニ對シテ深厚ナル謝意ヲ表ス。

二、研究ノ方法

大小孢子ノ發育ニ關スル材料ハ野外ヨリ採集シタルモノヲ直ニ、又原葉體ニツキテノ材料ハ研究室内ニテ發芽セシメタルモノヲ採リテ、「クローム」酸〇、三「グラム」、醋酸〇、七立方「センチメートル」、ニ水九十九立方「センチメートル」ヲ加ヘタル液、或ハフレミング氏弱性液ニ一晝夜浸シテ固定シ、「バラフィン」ニ封ジテ、三乃至八「ミュー」ノ厚サニ切斷シ、染色液トシテハ、ハイデンハイン氏ノ「鐵明礬ヘマトキシリン」及フレミング氏ノ「ゲンチヤン、ヴィオレット、オランダ」法ヲ用キタリ、染色液ハ前者ヲ用フルヲ佳トシ、固定液ハ此種ガ油質ニ富ムヲ以テ固定後「オスミツク」酸ノ處理ニ困難少キ「クローム」醋酸液ヲ良シトス可シ。

三、小孢子ノ發育 (Microspore-formation)

さんせうもノ孢子ニハ、大孢子 (Megaspore) ト小孢子 (Microspore) トノ別アリ、各別ノ子嚢 (Sporangium) 内ニ發育シ、各子嚢ハ又各群ヲナシテ特別ニ發育セル被包 (Indusium) 内ニ包マル、ヲ以テ特ニ大孢子嚢果、小孢子嚢果 (Meg-, Microspore-carp) ノ稱アリ、是等ノ嚢果ハ群ヲナシテ水中葉ヲ生ズル枝上ニ生ズ、而シテ此各群ニ於テ最初ニ生ズル一箇ノ嚢果ハ常ニ大孢子嚢果ニシテ、第二ニ生ズルモノニハ、會々大孢子嚢果ナル事アリト雖、多クハ其第三以下ニ生ズルモノト共ニ小孢子嚢果ナルヲ常トス。嚢果ノ原初細胞 (Initial-cell) ハ水中葉ト等シク其枝上ニ一箇ノ大形ナル細胞トナリテ表ハル、此細胞順次分裂シテ第一圖ニ示ス如キ形ヲナスニ至ル、此圖ハ若キ小孢子嚢果ヲ縱斷セルモノニシテ、兩側ニ圈ヲ以テ核ノ所在ヲ示セル細胞ハ成育シテ小孢子嚢果ノ被包トナルベキモノニシテ此時期ニ於テハ未ダ發達セズシテ單ニ輪狀ノ突起ヲナセルニ過ギズ、此被包細胞ヨリ上部ニ位スル組織ノ表面ニアル細胞ハ尙分裂ヲ重ネタル後小孢子嚢果ノ原初細胞タル可キモノナリ、第二圖ニ於テハ是等各部ノ尙發達セルヲ見ル可シ、即其基底部分ニ於テ突起ヲ

第一圖

第 二 圖

ナセル部分ハ第一圖ニ於テ五箇ノ細胞ヨリナレル被包組織ノ生育シテ二重ノ細胞壁トナリ、其間ニ氣室Aヲ生ズルニ至レルナリ。此壁ハ後著シク成長シテ子囊群ノ全部ヲ覆フニ至リ其頂細胞ハ異常ニ發達シテ相癒合スルニ至ル、成熟セル囊果ニ於テハ此氣室ハ所々ニテ内外兩壁ヲ連ヌル縦壁ニヨリテ境セラル、ヲ以テ、被包ノ横斷面ハ常ニ車輪狀ヲナシ、其連接部ハ表面凹陷スルヲ以テ囊果ノ外觀ハ恰モ皮ヲ去リタル柑果ノ如ク、其表面ニハ五六箇ノ細胞ヨリナレル毛茸ヲ生ゼリ。

囊果ニ存スル氣室ノ配置ハ水中葉ノ皮部ニ存スル氣室ノ配置ト等シ、サレ達シテ褶襞狀トナリテ被包トナリシモノト考ヘ得可シ(第二圖ノ左方下部ノAハ囊果ノ柄部ノ氣室ノ一部分ナリ)。

同圖ニ於テ細胞内ニ圈ヲ有スルモノハ尙一二回ノ分裂ヲ經テ遂ニ小胞子囊ノ原始タル可キ細胞ヲ示ス、カク小胞子囊ノ原始細胞ハ、常ニ水中葉ノ先端ニ於ケル表皮細胞ニシテ多少突起ヲナシテ表ハレ軸ト略直角ヲナセル膜ニヨリ分裂セラレテ上下ノ二細胞トナル、下ナルハ常ニ小形ニシテ後數回平行セル横壁ヲ生ジテ分裂シ、五、六箇ノ細胞ガ一列ニ并ベル小胞子囊柄ヲ生ズ(第五圖版第1圖S)、上部ニ生ジタル細胞即先端細胞(Apical-cell)ハ少シク斜メニ走ル膜ニヨリテ、一箇ノ基底細胞(Basal-cell)(第2圖W₁)ト一箇ノ先端細胞トニ分タル、此基底細胞ハ後數回ノ分裂ヲ經テ、小胞子囊壁ノ一部ヲナス、次ニ先端細胞ハ今生ジタル膜ト直角ニ稍近キ角度ヲナセル膜ニヨリ分裂シテ、第二ノ小胞子囊壁細胞ノ原始(第3圖W₂)ヲ生ジ、次ニ再ビ分裂シテ第三ノ小胞子囊壁ノ原始細胞(第4圖W₃)ト一箇ノ胞原細胞(Archisporial-cell)(第4圖C)トヲ生ズ、次ニW₂ハ縦裂シテ二箇ノ細胞トナリW₃モ亦縦裂シ、ツギテ各ハ又横裂シ後此各ハ小胞子囊ノ半徑ニ平行ニ走ル膜ニヨリテ屢、分裂シテ遂ニ一層ノ細胞ヨリナレル小胞子囊壁ヲ生ズ。

普通多クノ小囊羊齒ニ於テ、子囊壁ノ原始細胞ハ四箇ニシテ其三箇ハ回旋狀ニ配列シ一箇ハ其上ニ配ブヲ以テ、胞原細胞ハ四面體ヲナスト言ハル、然レドモ此種ニ於テハ、三箇ニシテ其配列ノ方法モ亦異ルヲ以テ胞原細胞モ從ヒテ四面體ヲナサズ。

胞原細胞ハ次ニ此三箇ノ子囊壁原始細胞ヲ生ジタル膜ト平行ナル三箇ノ壁ニヨリ分裂シテ三箇ノ絨氈細胞ノ原始(The initial-cell of the tapetum)ト一箇ノ中心細胞(Central-cell)トヲ生ズ(第6、7圖t及c)、此原始絨氈細胞ハ後、子囊壁細胞ト等シク、子囊ノ半徑ト平行スル膜ニヨリ反覆分裂シテ遂ニ一層ノ細胞ヨリナレル絨氈組織ヲ生ズ(第9、10、11圖t)。

ジュラニー氏ハ其論文中ニ此絨氈組織ハ普通二層ノ細胞ヨリナルモ時ニ一層ノ細胞ヨリナル事アリト記載セラレ、ハインリッヘル氏ハ是ニ反シテ常ニ一層ノ細胞ノミヨリナルト記サル、而シテ予ガ觀察ハ此後說ニ等シクシテジュラニー氏ノ見ラレタル如キ二層ヨリナレル場合ニハ一回モ遭遇セザリキ。

是等ノ分裂ト同時ニ柄細胞ノ分裂モ亦行ハル、ヲ以テ多クノ小胞子囊ハ第三圖ニ示ス如ク、樹枝狀ニ配列スル數群トナルナリ。

圖三第

又是ト同時ニ中心細胞ハ最初子囊ノ軸ト平行スル膜ニヨリテ分裂シテ二箇ノ細胞トナリ、此各ハ第一ノ膜ト直角ニ交ハル膜ニヨリテ横裂シテ四箇ノ細胞トナリ(第8圖)、此各ハ又二分シテ八箇トナリ(第9圖)、後此各ハ又二分シテ十六箇ノ小胞子母細胞(Microspore Mother-cell)ヲ生ズ、カクテ此母細胞ハ其靜止期間ニ著シク成長ス。

母細胞ノ充分ナル成熟ノ域ニ達スルヤ、其細胞ハ周圍ノモノニ比シテ著シク大形ニシテ原形質ハ濃厚ノ度ヲ加ヘ大形ナル核ヲ有ス、核ハ又著シキ一箇ノ仁ヲ含ムモ其「リニンレチキユラム」ハ極メテ纖細ニシテ其内ニ連接セラル、染色質顆粒モ又小形ナリ。此時期ニ於ケル絨氈細胞ハ尙其分裂ヲ止メズ其原

形質ハ母細胞内ノヨリモ濃クシテ染料ニ對スル反應モ著シク核モ又然ルヲ以テ其形ノ著シク小ナルニ伴ヒテ母細胞トノ間ニ非常ノ差異ヲ示シ、子囊壁ノ細胞ハ其原形質ノ量モ少ク核モ又小形ナルヲ以テ此三者間ノ區別ハ歴然タリ。

カクテ小孢子母細胞ノ核ハ直ニ分裂ノ準備ヲ始ム、即其「レチキュラム」ハ漸次著シクナリユキ幾分絲狀ヲ呈シテ遂ニ核質内ノ一部ニ凝集スルニ至リ所謂「シナプシス」期ノ特徵ヲ示ス、此際仁ハ此凝集塊内ニ包含セラル、事アリ或ハ是ト離レテ孤リ存スル事アルモ漸次染料ニ對スル感應力ヲ減殺スルガ如シ、此「シナプシス」期ハ比較的長ク連續シタル後漸次其凝集ヲ解キ始メ、遂ニ絲狀トナリテ核質内ニ分布ス、此時ニ於ケル核ノ染色質ハ「リニン」絲上ニ平等ニ連續シテ配布スト見ル可ク暫クシテ此染色質ハ此絲上ノ所々ニ結節狀ニ短縮シ來リ遂ニ各節ノ間ノ連結ヲ失ヒテ染色體ヲ生ズ。

染色體ノ形成セラル、ト共ニ核ノ周圍ナル原形質中ニハ多數ノ「キノプラスマ」顆粒表ハレ是ヨリ生ズル纖維ハ核膜ニ向ヒテ伸長シ核膜ノ消失ト共ニ核室内ニ突入シテ茲ニ生ジタル染色體ニ接著ス。カク、「スピンドル」ハ其初メ多極性ニシテ後は等ノ極ハ分レテ母細胞ノ兩極ニ向ヒテ移動シ遂ニ二極性ノ「スピンドル」ヲ形成ス、(第13—16圖參照)。

染色體ノ數ハ、染色體ガ「スピンドル」ノ赤道部ニ集マリテ所謂赤道板(Equatorial-plate)ヲ構成スル時ニ最容易ニ計算スルヲ得可シ、即其數ハ凡テ十六箇ニシテ二箇ヅ、相對スルヲ以テ第十五圖ニ示スガ如ク八箇ノ群ヲナス、此對ヲナセル染色體ノ各半ハ分レテ兩極ヨリ來レル「スピンドル」ニ牽引セラレテ相對スル極ニ向ヒテ進ム。

(第17圖)

二箇ノ娘染色體ガ極ニ達スルヤ各染色體ハ暫ク其形ヲ變ゼザルヲ以テ茲ニテモ亦容易ニ其八箇ヨリナレル事ヲ知ルヲ得可シ(第18圖)、カクテ遂ニ各染色體ハ其形ヲ失ヒ周圍ニ核膜ヲ生ジテ靜止期ニ入ルモ仁ハ尙其形ヲ示サズ、「中心スピンドル」ハ其赤道部ニ向ヒテ短縮シユキテ小形ノ顆粒トナリテ細胞板(Cell-plate)ヲ形成ス、此分裂ハ所謂

異型的分裂 (Heterotypic division) ニシテ無性世代ニ於ケル雌雄ノ遺傳體ガ其結合ヲ解キテ二箇ノ娘核内ニ分離スル時期ナリ。(第19圖第20圖)

娘細胞核ノ靜止期ハ極メテ短クシテ第一回分裂ニ於ケル細胞板ハ殆直チニ消失シ初メ同時ニ娘核ハ第二回分裂ノ準備ヲ始ム、即娘核内ノ染色質ハ漸次絲狀ヲナシテ縱裂シ後八箇ノ染色體トナリ核膜ハ消失シ「スビンデル」ハ核室内ニ入りテ染色體ニ接著シ其各半ヲ兩極ニ運ブ、各娘細胞ノ極ニ達シタル孫染色體ノ四群ハ其外ニ核膜ヲ生ジテ小胞子ノ核トナル、而シテ各核ノ間ニ「スビンデル」ヲ生ジ相互間ヲ連ヌルモ暫クシテ其各ノ中間部ニ向ヒテ短縮シユキテ小粒體トナリ、六枚ノ細胞板ヲ生ジテ母細胞ヲ四箇ノ孫細胞即小胞子ニ分ツ、此第二回ノ分裂ハ所謂同型的分裂 (Homotypic division) ニシテ各染色體ハ二箇ノ等シキモノニ分裂セラル、ノミナリ。(第21—22圖)

小胞子母細胞ノ分裂ヲ初ムル頃ヨリ絨氈細胞ハ其膜ヲ消失シ初メ、小胞子ノ形成セラル、ニ至ルヤ、絨氈細胞ノ原形質ハ未ダ分離セザル小胞子群ノ間ニ進入シテ漸次小胞子囊ノ内部ニ擴ガリ胞子群ヲシテ其内ニ浮游セシムルニ至ル、(第26圖)サレド其核ハ尙活動ヲ繼續シテ小胞子ニ養分ヲ供給スルモ漸ク頽廢シ初メ同時ニ小胞子群ハ母細胞膜ノ消失ト共ニ相分離シテ子囊ノ外壁ニ向ヒテ動キ初メ壁ノ内面ニ接スルニ至リテ茲ニ一列トナリテ止マルニ至ル事既ニブリングスハイム氏其他ノ觀察セラレシ所ノ如シ(第27、28圖)而シテ子囊ノ内部ニ充ツル原形質内ニハ多數ノ空胞ヲ生ジ著シク粗鬆トナルニ至ル。

充分成熟セル小胞子(第29圖)ハ二層ノ膜ヲ有ス、内膜(Endospore)ハ極メテ薄クシテ外膜(Exospore)ニ密著シ核ハ比較的大形ニシテ内ニ一箇ノ大ナル仁ト纖細ナル「リニンレチキュラム」ト其上ニ分布スル小顆粒狀ノ染色質ヲ含ミ原形質内ニハ多量ノ養分ヲ含メリ。

四、雄性原葉體 (Male Prothallium)

雄性原葉體ノ發育ヲ見シガ爲ニ小胞子囊果ノ成熟セルモノヲ採リテ水中ニ貯ヘ實驗室内ニ置キタリ、室内ニハ暖爐ノ裝置アリシヲ以テ晝間ハ普通十八度乃至二十一度位ニ保タレシモ夜間ハ著シク室溫降下セシナル可シ、然レド

モ此貯藏瓶中ノ水ハ一回モ凍氷セシヲ見ザリキ、斯ノ如キ状態ニ於テ一月下旬頃ヨリ發芽ヲ初メ水槽中ニ精蟲ノ游泳スルモノアリシヲ以テ特別ニ溫度ヲ上昇セシムル如キ實驗ヲ施サバリキ、精蟲ノ盛ニ出ヅルハ三月頃ニシテ四月ヲ經五月中旬頃迄連續シタリキ。

雄性原葉體ノ發育及ビ其構造ニツキテハベラエフ氏ノ研究セラレシモノト略同一ナリトハ既ニ昨年ノ本誌上ニ於テ報告シタル所ナリ、然レドモ氏ノ研究法ハ原形質分離ノ現象ヲ應用シテ箇々ノ細胞ノ限界ヲ明瞭ナラシムル方法ニヨリタルノミニシテ、切片ヲ製作シタルニアラザルヲ以テ、細胞内部ノ觀察ヲ缺ケルト細胞分裂ニ關スル研究ヲ遺サレタルハ惜ム可キ事ナリ。

小胞子ハ最初小胞子嚢ノ半徑ト直角ニ交ハル膜ニヨリ内外二箇ノ細胞ニ分裂セラル(第30圖)、此分裂ニ於テ表ハル、核ノ染色體數ハ小胞子母細胞ノ第二回分裂ノ際ニ生ジタル數ト等シク八箇ナリ。

アーノルヂイ氏ハ其論文中ニ此種ノ雄性原葉體細胞ノ分裂時ニ表ハル、核ノ染色體數ヲ四箇ナリト記載セラル、而シテ氏ノ論文中ニアル插图ヲ見ルニ其染色體ハ分裂時ニ於テ常ニV字形ヲナシテ甚長シ、是予ノ觀察ト著シク異なるナル點ナリトス。

由來同屬間ノ異種間或ハ原種ト變種トノ間ニ於ケル如キ近縁ナル植物間ニ於ケル染色體數ノ相異ハ既ニ屢記載セラレタル所ニシテ既ニ本誌本卷ノ一、二月號ニ於テ田原氏ノおにたびらコ屬ニ於ケルガ如キ其同屬ノ三種ガ悉ク其染色體數ヲ異ニシ或ハもうせんぐけトながばのもうせんぐけトノ間ニ於ケルガ如キ、或ハまつよひぐさ屬ニ於ケルガ如キ皆極メテ近縁ノ間ニ於テ其染色體數ノ異ナレルヲ見ル、而シテ是等ニツキテ其染色體數ノ相違ト形態上ノ差異トノ間ニ直接ノ關係アリヤ否ヤニツキテハ未正確ナル結論ヲ得ザルガ如シト雖、兩種間ニ於テ此數ノ變化ト共ニ其異種タリ或ハ原種ト變種タリトシテ區別スルニ足ル可キ形態上ノ差異ヲ伴フヲ見ル、然ルニ今予ガ用キタル材料ハアーノルヂイ氏ノ用キラレタル材料ト共ニ *Salvinia nutans* ノ名ヲ以テ呼バル、モノニシテ彼此ノ形態上ニ著シキ差異アル可シトモ思ハレズ唯或ハ遠隔ノ地ニアルニ依リ多少ノ變化ヲ其内ニ存シ異ナリタル Form 或ハ變種トシト

シテ何レカヲ取扱フ可キモノニ非ズヤトノ疑問ヲ狹ム可キ餘地ヲ殘サルニ非ズト雖若シ然ラザルニ於テハ減數分裂ノ際ニ見ル現象ヨリスルモ又此雄性原葉體ノ細胞分裂ニ於テ見ル所ヨリモ或ハ氏ノ研究上何等カノ錯誤ヲ存セシニ非ズヤト考ヘラル、ナリ。

小孢子ノ第一回分裂ニヨリテ内方ニ生ジタル細胞ハ直ニ分裂シテ大小二箇ノ細胞ヲ生ズ(第32圖)、此小ナルハ假根細胞(Root-cell)ニシテ大形ナルハ原葉體細胞(Prothallium-cell)ナリ。

プリングスハイム、アルカンゲリー(Arcangelii)及フランドル等ノ諸氏ハ此「ルートセル」ヲ觀察セラレズ、キアムヘル氏ハ其論文中ニ此細胞ノ存在ヲ否認シテ次ノ如ク言ヘリ。

„Die Spore theilt sich durch eine Querwand und die untere der gebildeten Zellen bleibt ungetheilt, die vegetative Zelle des Prothallium darstellend.“

ベラエフ氏ハ此細胞ノ存在ヲ認メシ最初ノ人ナルモ氏ハ此細胞ガ如何ナル時期ニ生ズルカニツキテハ疑問ノ中ニアルガ如シ、アーノルディ氏ハ其論文中ニ雄性原葉體ノ發育ハベラエフ氏ノト同一ナリト記サル、モ氏ノ挿圖中一モ此細胞ノ存在ヲ明カニシ得可キモノナク、且何等ノ記載ヲモ此細胞ニ對シテハ認メラレザルヲ以テ其意見ヲ窺フ能ハザルナリ。

第一回ノ分裂後或ハ是ニ先ダチテ小孢子ノ外膜ハ其表面ニアルY狀ノ縫合部ヨリ離レテ内部ノ細胞ヲシテ外ニ出デシム。

若キ雄性原葉體ノ最上部ニアル細胞ハ斜メナル膜ニヨリテ分裂ス(第33圖)而シテ此上ナルモノ又分レテ一箇ノ先端細胞ト一體ノ藏精器母細胞(Antheridium mother-cell)トヲ生ズ(第34、35圖)、下ナル細胞モツバキテ分裂シテ一箇ノ無性細胞ト藏精器母細胞トヲ生ズ、(第36圖)、是等ノ分裂ハ皆斜メニ走ル膜ニテ分裂セラル、ヲ以テ茲ニ生ズル細胞ハ一側面ニ長クシテ他側面ニ短シ、此長キ側ハ原葉體ノ腹面ニシテ短キ側ハ其背面ナリ、カク原葉體ハ背腹兩面ヲ存スレドモ他ノ羊齒ニ於ケルガ如ク細胞内ニ葉綠粒ヲ生ズル事モナク且多クハ子囊内ニテ發芽スルヲ以テ敢テ光

○さんせうもノ生活史 保井

線ニ對スル反應ニヨリテ生ズルニハ非ザルガ如シ、次ニ各藏精器母細胞ハ第37、38圖ニ示ス如ク斜メニ走ル膜ニヨリテ二箇ノ細胞cトwトニ分裂ス、此腹面ニ生ジタル小形細胞wハ蓋細胞、大形ナルcハ中心細胞ニシテ精細胞ノ祖母細胞ナリ。

サレバ一箇ノ小孢子ヨリ發育シタル雄性原葉體ハ一ノ「ルートセル」、原葉體細胞、先端細胞ト二箇ノ藏精器ト是ヲ境スル一箇ノ無性細胞トヨリナル、而シテ各藏精器ハ一箇ノ蓋細胞ト一箇ノ中心細胞トヨリナリ中心細胞ハ二回ノ分裂ヲ經テ四箇ノ精細胞ヲ生ジ、各精細胞内ニハ一箇ノ精子(Spermatozoid)ヲ生ズ(第39—43圖)プリングスハイム氏ハ其論文中ニ一箇ノ雄性原葉體上ニハ又一箇ノ藏精器ヲ生ジ八箇ノ精子其内ニ生ズト記シ先端細胞ト二箇ノ精子ノ祖母細胞トヲ圖說シタルノミニシテ蓋細胞及無性細胞ニ付テハ言及スル所ナシ、アルカンゲリー氏ハ二箇ノ藏精器細胞ヲ二箇ノ藏精器ト見做シブランドル氏又同意見ナルガ如シ氏ハ次ノ如ク曰ヘリ。

„Ich glaube die beiden vorderen Zellen eben so gut, wie als zwei Antheridien deuten zu können, deren jedes eine Glied-zelle der rudimentären Prothallien einnimmt.“

而シテキヤムベル氏ノ成熟セル原葉體ニ關スル記載ハ次ノ如シ。

„Das ganze Antheridium (wenn wir den ganzen oberen Theil des Prothalliums als ein einziges Antheridium ansehen) ist jetzt fünf oder sechs Zellen gebildet—zwei inneren (Fig. 26 m), welche die Urmutterzellen der Spermatozoiden darstellen, einer Deckzelle (D) und zwei oder drei anderen peripherischen Zellen (P).“

氏ノ „Peripherische Zelle.“ トハ蓋細胞ニ相等スルモノナルガ其内一箇ハ或ハ氏ガ兩藏精器間ヲ隔ツル無性細胞ヲ見誤リタルモノナランカト思ハル、(氏ノ二十六圖參照)、ペラエフ氏ノ是ヲ批評シテ一箇ノ雄性原葉體上ニ二箇ノ藏精器ヲ生ジ其中間ヲ無性細胞ニテ隔ツト云ヘルニ對シテキヤムベル氏ハ次ノ如ク是ヲ駁セリ、

„This cell, however, did not occur in the specimen studied by me, where the two groups of sperm cells were usually in immediate contact (Fig. 233 E).“

予ガ觀察シタル材料ニ於テハ常ニ無性細胞アリテ二箇ノ藏精器間ヲ隔離セリ故ニ予ハベラエフ氏ノ二箇説ニ同意ス殊ニキヤムベル氏ノ所謂二百二十三圖Eノ左方ニ於ケル „Periphere Zelle.“ ハ此無性細胞ノ位置ヲ示スモノニシテ此圖ニヨレバ氏ハ上部ノ藏精器ノ蓋細胞ヲ見落サレタルノ觀アルニ於テオヤ。

藏精器内ニ四箇ノ精細胞ヲ生ズルヤ、其原形質内ニハ生毛體(Blepharoplast)ヲ生ジ核ニ向ヒテ伸長ス(第42圖)予ハ精細胞内ノ澱粉等ノ爲ニ遮ラレテ此生毛體ノ點狀ヲナセル時期ヲ見ル能ハザリシガアーノルディ氏ハ明瞭ニ觀察セラレシモノ、如シ、生毛體ノ伸長シ來ルト共ニ精核ノ内容ハ明瞭トナリ遂ニ核モ伸長シ初メ、生毛體ハ其背面ニ平行シテ存シ核ト共ニ回旋ス、此精核ハ精子ノ大部分ヲナスモノニシテ凡ニ二回旋シ若干ノ纖毛(Cilia)ハ生毛體ヨリ生シテ其頭部ニ附著ス。

精子ノ成熟スル頃ニ至ラバ第49圖ニ示ス如ク原葉體細胞ハ著シク伸ビテ爲ニ藏精器ノ部分ハ小孢子囊壁ノ細胞間隙ヲ押シ開キテ外部ニ突出シ茲ニ成熟セル精子ハ蓋細胞ト中心細胞トノ間ヲ押シ破リテ水中ニ點出ス、此際上下ノ藏精器ハ少シク其成熟ノ時期ヲ異ニスルガ如シ。

精子ハ其體ノ先端ニ纖毛ヲ有シ後端ニハ澱粉粒ヲ包含スル「ベシクル」ヲ附著シ水中ニ出ヅルヤ此纖毛ト自體ノ伸縮トニヨリテ活潑ニ游泳シテ藏卵器ノ所在ヲ求ム、而シテ「ベシクル」ハ暫時ノ後水中ニ遺棄シ去ラル。(未完)

○田中久藏君送附西安植物目錄

(A List of Plants from Sian, Shen-si)

松 田 定 久

本目錄所載ノ植物ハ西安高等師範學堂ニ在リシ田中久藏氏ノ寄贈ニ係レリ之ヲ採收シタルハ主トシテ中澤謙氏ニシテ梅村次修氏採收ノ分一種ヲ加ヘアリ共ニ一九〇七年内ノ採收ニ係レリ目錄所載總數ハ四十餘種ニシテ外ニ胡蘆科