gerentes. Tubus stamineus perigonium superans, flavus; filamentorum pars libera oblonga; lobus antherifer subnullus v. manifestus, lobi laterales ligulati, brevi usque antheras subaequantes. Stigmata linearia, elongata.

Syn.: *G. mucronata* Moq., l. c., p. 413; Seub., l. c., p. 219.

Brasilia, Rio Grande (Riedel 2229! Brux., Berl., Par., Petr.); Min. Geraes (Mart. III. 217! Brux.); ad Batatoes (Lund, ex Moq.).

f. *ramosissima* Stuchlík.

Caules plurimiramosissimi et foliatissimi; folia aggregata, incanovillosa.

Brasilia, Min. Geraes (Mart. III. 217! Brux.); Rio Grande (Riedel 2229! Petr.).

XXXIV. Eine neue *Berberis* (*Euberberis*) aus dem westlichen Himalaya.

Von Camillo Schneider, Wien.

(Originaldiagnose.)

Berberis Parkeriana.

Frutex; ramuli juniores (hornotini nondum vidi) cinerei, leviter angulato-striati, tenue puberuli, vetustiores glabrescentes; internodia 2—2,5 cm longa; spinae normales, trifidae, flavescentes, satis graciles, mediae ad 1,8 cm longae, subtus levissime sulcatae; folia ad 5 fasciculata, decidua, papyracea, lanceolata, apice acuta, mucronulata, basim versus sensim in petiolum 1—3 mm longum contracta, supra viridia, subtus concoloria, utrinque paulo nitentia, laxe elevato-reticulata, margine integra, minora 2:0,5 cm, majora ad 5,5:1 cm magna; inflorescentiae fasciculato-racemosae vel plerumque racemosae, erectae?, 10—18 florum; flores flavi, mediocres, c. 6 mm diam.; pedicelli 0,8—1,4 cm longi, basi bracteis minutis, 1—1,5 mm longis, triangularibus suffulti; prophylla ovata, rubescentia; sepala externa paulo minora quam interna, obovato-oblonga; petala sepalis similia, apice integra, basi breve unguiculata, glandibus 2 normaliter instructa; stamina normalia, antheris satis longis, albis; ovaria distincte stylosa, ovulis 3 sessilibus; fructus obovati, inflati, purpurei et pruinosi, c. 9×6—7 mm magni, stylosi; semina 3.

Ich erhielt diese Art von Herrn R. N. Parker aus Lahore, welcher sie im Hazaradistrikt (westl. Himalaya) sammelte, und zwar die Blütenzweige in Bagnolár Reserve, 2600 m, April 1910, und die Fruchttriebe in Abbottabad, 1800 m, Juli 1910. Sie gehört in die Sektion *Tinctoriae* C. S. (*Eutinctoriae*), wo sie aber von allen bisher bekannten Arten durch die lanzettlichen, unterseits nicht papillösen Blätter abweicht. In der Blattform ähnelt sie sehr der *B. lycium*, diese hat aber unterseits weissspapillöse Blätter und längere Trauben. Herr Parker bemerkt zu seinen Pflanzen: *B. calliobotrys*? Die Früchte erinnern auch an die *B. calliobotrys* Aitch., allein diese Art hat kleinere Blätter, kahle, braunrote junge Triebe und weicht auch in den kleineren Blütenständen und sonst ab.

Der westliche Himalaya birgt noch viele gute, oft eng lokalisierte *Berberis*-Arten, deren näheres Studium noch zu erfolgen hat.