The illustration Fig. 4 is from plate R414, Exposure 20^m, enlarged 15 diameters, scale 1 mm = 7".5. The variable is indicated by the arrow.

The magnitudes of the comparison stars have been measured from plates

R429, 1914 April 2 15^h7 Exp. 15^m Region of the variable,
R430, 1914 April 2 16^h2 Exp. 15^m Region of the North Pole
as follows:

$$\begin{array}{llll} a = 12^m.0 & c = 13^m.1 & e = 13^m.6 & g = 14^m.25 \\ b = 12.6 & d = 13.5 & f = 13.9 & \end{array}$$

95.1914 Cephei.

(1855) 21^h49^m1 +61°16'. (1900) 21^h50^m4 +61°28'5.

The observations establish a range of variation from 12^m2 to 15^m3, and a period of 295 days with a probable error of not more than about 5 days. The characteristic features of the light curve can also be clearly traced; there is little change in magnitude for about 15 days around maximum, the decline then proceeds rapidly for 50 days; then follows a practically stationary period of about 200 days around minimum after which the star brightens rapidly during 30 days. The following visual observations have been made with the Reflector:

1914 June 14 10^h8 power 140,

The Var. is a shade >e, colour pale red.

1914 June 21 11^h6 power 140,

The Var. is only slightly >g, and is much <e.

The visual order of the comparison stars differs from the photographic order in that *d* is decidedly >*a*, and *h*

Tatsfield, 1914 July 3.

is = *f*. During the discussion of the photographic observations both *d* and *f* were noted as variable over a small range.

The illustration Fig. 5 is from plate R489, Exposure 20^m, enlarged 8.7 diameters, scale 1 mm = 12".9. The variable is indicated by the arrow.

The magnitudes of the comparison stars have been measured from plates

R479, 1914 June 14 11^h7 Exp. 20^m Region of the variable,
R480, 1914 June 14 12^h5 Exp. 20^m Region of the North Pole
as follows:

$$\begin{array}{llll} a = 10^m.7 & c = 12^m.3 & i = 13^m.6 & m = 14^m.8 \\ b = 11.3 & f = 12.4 & j = 13.9 & n = 14.9 \\ c = 11.9 & g = 12.8 & k = 14.1 & o = 15.0 \\ d = \pm 12.0, \text{ Var. } & h = \pm 13.0, \text{ Var. } & l = 14.5 & p = 15.3 \end{array}$$

9.1913 Cephei, see A. N. 4640.

The range of variation is from 11^m2 to 12^m4. The suggested period of 360 days is not confirmed, the variation being apparently entirely irregular. Visually the star has been observed on 12 dates since 1913 March 11, the range of variation being from »a shade <*c*« to »=*f*«; it shows no decided colour.

The magnitudes of the comparison stars have been measured on the Harvard scale from plates

R459, 1914 May 16 11^h5 Exp. 20^m Region of the North Pole
R460, 1914 May 16 12^h1 Exp. 20^m Region of the variable
as follows:

$$\begin{array}{llll} a = 10^m.1 & c = 11^m.2 & e = 11^m.9 & g = 12^m.8 \\ b = 10.6 & d = 11.4 & f = 12.2 & h = 13.6. \end{array}$$

C. R. D'Esterre.

Copernic vu à l'œil nu.

C'était à Commugny, près Genève, entre 9^h et 10^h du soir, le 3 Juin 1914, le ciel était clair et la lune brillait de tout son éclat; le premier quartier déjà dépassé et le terminateur nettement convexe. On remarquait à l'œil nu une tache brillante, près du terminateur, sur la partie obscure de la lune, presque vis-à-vis de la tache sombre de la »Mare Crisium« aussi visible à l'œil nu. C'était comme une étoile

Zürich, le 11 Juin 1914.

qui vient d'être occultée, quelques minutes après l'émergence. Cet objet brillant, que toutes les personnes présentes ont pu voir, était formé par les sommets du grand cirque de Copernic, éclairés par le soleil levant. Je pus du reste m'en assurer au moyen d'une petite lunette terrestre. J'ai admiré souvent ce spectacle au réfracteur, mais j'ignorais que l'on puisse le voir à l'œil nu.

G. Pidoux.

A Photograph of a Meteor Trail. By J. H. Metcalf.

[Mit Tafel 4.]

On Febr. 27 1914 on a plate, the middle time of which was 14^h35^m Gr. M.T., an interesting meteor was photographed at this observatory with the 12 inch. and the 6 inch. objectives while taking an asteroid plate. The exact time of the meteor can not be given as it was not seen by the assistant taking the plate.

The ends of the trail are in RA. 12^h19^m16^s7 Decl. +16°58' and RA. 12^h37^m53^s Decl. +18°52'. The length of the trail is approximately 4".75. Throughout its length the trail is broader than the star trails of similar density.

Assuming the meteor began in RA. 12^h19^m Decl. +16°58', it started very faint and gradually increased in

brightness through nearly 4° of its photographed path and then suddenly burst out with a great accession of light and was followed by three other outbursts, each fainter than the preceeding one.

After the fourth outburst the meteor made no impression on either plate.

At the point of largest outburst the trail is 1".0 broad and shows that the meteor was composite, consisting of at least 4 objects.

At the next outburst 3 of these objects are visible, at the third 2 and at the last the meteor is so faint that only the main meteor is seen.

An examination of the plate at the point of these outbursts shows that the broadening is not due to any burnt out effect on the plate, for nowhere does such photographic irradiation exist. It is therefore evident that the meteor was in several parts and that these parts grew brighter together and faded together. This could only be if the outbursts were due to a train of meteors passing through several denser strata of the earth's atmosphere and so received the greater illumination at the same point in their paths or else the increased illumination came only to the central and brighter part illuminating the outer components by reflected light in part. This would leave unexplained how the central and presumably larger meteor should brighten up so

Winchester, Mass., 1914 June 26.

much more than the outlying ones when we should expect the greater friction on the outer ones.

If we assume a stratification of the atmosphere, it is not necessary to assume that the parts were closely together for they may have been in practically the same path but separated.

If however the smaller ones were photographed by partly reflected light from the main meteor, they must have been closely bunched.

Another supposition is that we have here a mass partly solid and partly gaseous moving as a ball through the air with a diameter of at least 1' and subject to sudden increases of brightness to be compared with explosions.

Joel H. Metcalf.

Eine Bemerkung zu den Helligkeitsbeobachtungen des Kometen 1907 IV.

Ich bin erst jetzt durch die Notiz von Prof. H. Kobold in der Vierteljahrsschrift der A. G. (1914, p. 91) darauf aufmerksam geworden, daß Herr Orlow bei der Untersuchung der beobachteten Helligkeiten des Kometen 1907 IV (A. N. 195.309) in der ersten Juli-Hälfte jenes Jahres eine jähe Änderung der Helligkeitskurve bemerkt und dieselbe mit einem partiellen Minimum der Relativzahl der Sonnenflecke in Verbindung bringen zu können gemeint hat.

Da diese Helligkeitsbeobachtungen von mir sind, möchte ich zu meiner Mitteilung derselben (A. N. 175.305 und 177.99) als Ergänzung hinzufügen, daß sie gerade an der fraglichen Stelle wenig sicher sind, und zwar darum, weil der Komet zu jener Zeit, insbesondere zwischen dem 4. und 10. Juli, von der teleskopischen Sichtbarkeit zur Sichtbarkeit für das freie Auge übergegangen ist. In diesem Stadium werden Helligkeitsbestimmungen von einigen Beobachtern mit bloßen Augen, von anderen mit kleinen Sucherfernrohren oder über-

Wien, 1914 Juni 18.

haupt mit optischen Mitteln von geringer Stärke gemacht, und dadurch können Ungleichmäßigkeiten entstehen, besonders in den letzteren Fällen, weil da öfters keine passenden Vergleichsterne in der Nähe sind. Bestimmungen mit Photometern sind hier nicht immer am Platze, denn diese liefern bei einem Kometen meistens etwas ganz anderes als den Gesamthelligkeitseindruck.

Daß dies nicht nur von meinen, sondern auch von den Helligkeitsangaben anderer Beobachter gilt, hat sich bei der Sammlung und Zusammenfassung sämtlicher Helligkeitsbestimmungen dieses Kometen gezeigt, worauf ich im Wiener »Astronomischen Kalender« für 1910, p. 130, besonders aufmerksam gemacht habe. Es scheint nunmehr nötig, auch hier darauf hinzuweisen, daß der Grund der in der Helligkeitskurve des Kometen 1907 IV zu Beginn des Juli erkennbaren Störung nicht so sehr im Kometen selbst als vielmehr in der Art und Weise der Beobachtungen zu suchen ist.

J. Holetschek.

Witterungsaussichten für Europa am Tage des Merkursdurchganges.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in A. N. 4738 über das unsichere Wetter am Tage der diesjährigen totalen Sonnenfinsternis teile ich mit, daß Ähnliches vom Tage des Merkursdurchganges gilt. Die erste und die zweite Novemberwoche 1914 sind mit Störungsfolgen aus westpazifischer Sturmbildung besetzt. Die Störungsfolgen der zweiten Novemberwoche, welche wegen gelegentlich beobachteter Verfrühung, auch für November 7 in betracht kommen, knüpfen

Schnelsen, 1914 Oktober 4.

sich an ein Ereignis der Sonnentätigkeit, das nach früheren Erfahrungen auf eine besondere Steigerung ihrer Intensität schließen läßt. Ein mittelgroßer, zweikerniger Sonnenfleck verschwand spurlos von Oktober 1 zu Oktober 2, nachdem er unter September 30 den Mittelmeridian gekreuzt hatte. Er bot ein neues Beispiel für die von Mrs. A. S. D. Maunder in M. N. 67.451 statistisch nachgewiesene Regel.

Wilhelm Krebs.

Berichtigung zu Nr. 4765 Bd. 199 p. 210 Z. 4 v. u. statt: η und W Geminorum lies: η Geminorum und W Cygni.

» » » » » » » 216 » 18 v. o. statt: Termen lies: Ternen.

» » » » » » » 219 » 8 unter der Tabelle statt: $\frac{1}{2}(S-R+0^m.32)$ lies: $\frac{1}{2}(S+R+0^m.32)$.

» » Nr. 4767 Bd. 199 p. 241 Z. 13 v. o. statt 1914 lies 1913.

Inhalt zu Nr. 4770. D. Dubiago. Beobachtungen auf der Engelhardt-Sternwarte im Jahre 1913. 289. — V. Láska. Ein Nomogramm zur Auflösung der Keplerschen Gleichung. 295. — C. R. D'Esterre. Four new variable stars 92., 93., 94. and 95. 1914 Cephei, and further observations of 9. 1913 Cephei. 297. — G. Pidoux. Copernic vu à l'œil nu. 301. — J. H. Metcalf. A Photograph of a Meteor Trail. 301. — J. Holetschek. Eine Bemerkung zu den Helligkeitsbeobachtungen des Kometen 1907 IV. 303. — W. Krebs. Witterungsaussichten für Europa am Tage des Merkursdurchganges. 303. — Berichtigungen. 303.