salzung“ erfolgt als sekundärer Vorgang noch eine irreversible Eiweißveränderung, welche hier nicht studiert werden soll. — Die Säuren ordnen sich dabei nicht allein nach ihrer Stärke, sondern es spielt auch die Natur des Anions mit. Es war danach zu erwarten, daß eine um so höhere Konzentration des gemeinsamen Säureanions zur Eiweißfällung nötig sei, je stärker das Eiweißsalz hydratisiert bzw. ionisiert ist. Die Hydratation äußert sich auch im Viskositätsgrad. Deshalb wird hier bei der Bestimmung der Wirksamkeit verschiedener Säuren neben der Fällung auch die Viskosität bestimmt. Schließlich wird die Hydratation durch verschiedene Säuren bestimmt durch den Quellungsgrad von Glutin, der in niederen Säurekonzentrationen durch ein Maximum geht und mit steigendem Säuregehalt in verschiedenen Säuren verschieden rasch abfällt. (Hier ist ein allgemeiner Parallelismus im Verhalten der Salze von Säuren des Albumins mit denen des Glutins vorausgesetzt, was auch in Wirklichkeit zutrifft.)

Alle drei Versuchsreihen machen es (wenigstens für eine Anzahl von Säuren) sehr wahrscheinlich, daß in der Tat der Hydratations- und Ionisationszustand des betr. Eiweißsalzes seine Fällbarkeit im Säureüberschuß bedingt. Diese Fällbarkeit wäre also primär als eine Verdrängung eines Salzes aus seiner Lösung durch den Ueberschuß seiner Säure zu betrachten.

Bei den Laugen ist dagegen nur deren Stärke maßgebend für die Ionisationszurückdrängung und Dehydratation im Laugenüberschuß maßgebend. Dies äußert sich nur bei starken Laugen (Alkalihydroxyden von über 5 n). Auch hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine „Aussalzung“ gleicher Art. R. E. Lg.

Arbeiten über Mineralogie und Agrikulturchemie.

Emmons, W. H., Die Anreicherung von Erzlagerstätten. (U. S. Geol. Surv. Bull. 625, 1, 1917.)

Obgleich dieses Lebenswerk des Verfassers nicht wörtlich Kolloide und Diffusionen nennt, liest man darüber zwischen den Zeilen. Z. B. in den Kapiteln über Permeabilität und Verwitterung: Eine Menge von Tatsachen zeigt, daß die meisten Gesteine nicht ganz undurchlässig sind. In sehr vielen Fällen sind die Kapillaren darin so eng, daß es nicht zu einer wirklichen Zirkulation des Wassers kommen kann. Trotzdem kommt es vor, daß (auch) kalte mineralbringende Wasser z. B. in einer sekundären Sulfidzone in jenen minimalen Räumen ihre Erze ablagern.

Auch Emmons kämpft gegen die Vorstellung, daß bei der Metasomatose und den Pseudomorphosen eine Umsetzung Molekül für Molekül stattfindet. Denn er schiebt eine intermediäre Lösung dazwischen, bei welcher eine Verschiebung stattfindet. Deshalb lagert sich so oft zwischen das ursprüngliche und neue Mineral eine schwammähnliche poröse Zone. In einzelnen Fällen stoßen allerdings bei der Betrachtung mit bloßem Auge beide anscheinend unmittelbar aneinander. Das war auch bei einem mit Anglesit (PbSO_4) umkrusteten Bleiglanz (PbS) der Fall. Durch Behandlung mit einem Anilinfarbstoff ließ sich jedoch auch hier an der Grenze eine mikroskopisch schmale porösere Zone nachweisen. Aber selbst in ultramikroskopischen Räumen haben noch unzählige Moleküle Platz. Die Grenzzone braucht dadurch nicht leichter abtrennbar zu werden. R. E. Lg.

Kerner v. Marilaun, F., Geologie der Bauxitlagerstätten. (Berg- u. hüttenmänn. Jahrb. 1916, 161.)

Bestätigung der Angabe von Kispatic, daß in den wasserreichen karstländischen Bauxiten ziemlich Mengen von Hydrargillit in kolloider Form (= Kijakita nach Corau, Sporogelit nach Kispatic) vorkommen. „Das Wasser scheint — soweit es nicht an die beiden Tonerdehydrate geknüpft ist — an kolloide SiO_2 und nicht an das Fe gebunden zu sein. Letzteres dürfte sonach als wasserfreies Oxyd, und zwar gleichfalls in Gelform (Hämatogelit) vorhanden sein.“ R. E. Lg.

Siebenthal, C. E., Ursprung der Zink- und Blei-Lagerstätten des Joplin-Bezirks. (U. S. Geol. Surv. Bull. 606, 1, 1916.)

S. 241 behandelt ein Kapitel die Bedeutung der Diffusion beim Zustandekommen dieser sulfidischen Lagerstätten. — Sehr dankenswert ist in den zahlreichen Tabellen der Mineral- und Mineralwasser (S. 107 bis 146) die Anführung des Gehaltes an kolloid gelöstem SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , BO_3 usw. S. 166 wird die Bedeutung des kolloid Gelöstes für den Transport der Erze geschildert. — Der Ersatz von Kalkstein durch SiO_2 erklärt sich nach A. H. Curch (Phil. Mag. a. Journ. Sci. [4] 23, 101, 1862): Ein dialysiertes, mit CO_2 versetztes SiO_2 -Sol wird durch CaCO_3 zum Gelatinieren gebracht. [Vgl. auch Koll.-Zeitschr. 10, 273, 1912.] — Die Bänderungen eines jaspisähnlichen Materials werden erklärt durch rhythmische Fällung in einen ursprünglichen Gel. R. E. Lg.

Arbeiten technischen Inhalts.

h) Leim, Gelatine, Stärke, Klebmittel.

Low, W. H., Prüfung der Festigkeit von Leimgallerten. (Journ. Ind. Engin. Chem. 12, 355, 1920.)

Eine Modifikation des Leimprüfers von Smith und E. C. Hülbert (ibid. 5, 235, 1913) soll die in der Praxis vielfach gebräuchliche Fingerdruckprobe ersetzen. Ein mit Wasser teilweise gefüllte Kapillare wird auf die zu prüfende Gallerte gesetzt. Mittels Luftdruck wird der Wasserstand in der Kapillare um eine gewisse Strecke heruntergedrückt. Bei einer festeren Gallerte ist mehr Druck nötig als bei einer weichen. Eine zwischengeschaltete Kautschukmembran hindert die Quellwirkung der Manometerwassers auf die Gallerte. R. E. Lg.

Bücherbesprechungen.

Die Lichtpausverfahren. Herstellung der Lichtpauspapiere und Lichtpausen. Von H. Wandrowsky. (Verlag der Papier-Zeitung, Berlin SW 11, 1920.) 113 Seiten mit 4 Abb.

Das Buch, in welchem der Verfasser seine Betriebserfahrungen preisgibt, enthält viel Kolloidchemisches: Die Gerbung der bichromathaltigen Gelatine und anderer Kolloide durch die Belichtung, das Wiederlöslichwerden der durch Ferrisalze gegebenen Gelatine bei der Belichtung, die Bedeutung der Saugfähigkeit der Papierunterlage für die Aufnahme der lichtempfindlichen Lösungen, die Adsorptionsfähigkeit der verschiedenen Faserarten für Turnbullblau, der Einfluß der Mahlung und der Leimung des Papiers usw. Auch eine Form des kolloidchemisch so interessanten Bromölodrucks ist hier für Lichtpauszwecke umgearbeitet. R. E. Lg.

Die Farben für graphische Zwecke. Ihre Herstellung und Verarbeitung. Von Otto Wäzberger.

(Frankfurt a. M. 1920. Verlag von Klimsch & Co.) 134 S.

Ich übergehe eine ganze Reihe von Einwänden, welche von rein chemischer Seite gegen die Beschreibung der Pigmente und Bindemittel gemacht werden müssen und verweise hier in der üblichen Weise auf das viele kolloidchemische interessante, welches dieses Buch enthält. Der Druck wird dadurch möglich, daß die Farbe am Papier besser haftet als an der Druckplatte. Fehler, wie Rupfen usw. entstehen, wenn dieser Unterschied nicht groß genug ist. Die Verhältnisse werden komplizierter beim Offsetdruck, wobei der Druck erst auf Paragummituch und von diesem erst auf das Papier kommt. Während man normalerweise ein seitliches kapillares Verdrängen des Bindemittels im Papier zu verringern sucht, steigert man dieses bei den Doppeltonfarben. Hierbei enthält der Firnis noch irgendeinen fettlöslichen Farbstoff. Letzterer dehnt sich mit dem Firnis seitwärts aus und erzeugt nun beim Druck von Halbtonbildern um jedes Rasterkorn herum einen anders gefärbten Hof. Wichtig sind für uns auch die Erörterungen über die Korngröße des Russes in den für verschiedene Zwecke verwendeten schwarzen Farben, über matte und glänzende Farben, über den kopierbaren Druck, über den direkten und den Puderbronzedruck und manches andere. Daß man einmal dasselbe Bild in den verschiedenen Druckarten ausgeführt sieht, ist sehr lehrreich.

R. E. Lg.

Neue Patente.

1. Anmeldungen.

- 12p, 16. F. 44824. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. Verfahren zur Darstellung von Goldverbindungen wasserlöslicher Abbauprodukte von Eiweißstoffen. 26. 6. 19. (14. 10. 20.)
- 12r, 1. B. 86893. Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. Verfahren zur Entwässerung wasserhaltiger Emulsionen von Teeren und Ölen. 19. 7. 18. (14. 10. 20.)
- 30h, 3. P. 38511. Hans Potratz, Werchow b. Kalsau. N.-L. Verfahren zur Herstellung starker Kalksalzlösungen in Emulsionsform. 27. 9. 19. (14. 10. 20.)
- 1a, 25. M. 69433. Minerals Separation Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, Dipl.-Ing. C. Weihe, Dr. Weill, M. M. Wirth, Frankfurt a. M., u. Dipl.-Ing. T. R. Koehnborn, Berlin SW 11. Schaumschwimmverfahren, bei dem das gepulverte Erz mit einem schaumbildenden Mittel unter Luftzutritt behandelt wird. 27. 5. 20. England 3. 10. 13. (18. 10. 20.)

2. Erteilungen.

- 30i, 3. 329733. Chinoin Fabrik chemisch-pharmazeutischer Produkte, A.-G. (Dr. v. Kereszty u. Dr. Wolf) Ujpest; Vertr.: Dr. J. Ephraim, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Verfahren zur Herstellung eines gelartigen Antiseptikums. 27. 9. 18. C. 27607. Ungarn 16. 5. 18. (18. 10. 20.)
- 12p, 16. 330816. F. Hoffmann-La Roche & Co., A.-G., Basel, Schweiz; Vertr.: Fr. Schmidt, Rechts Anw., Lörrach i. B. Verfahren zur Darstellung von kolloidal löslichen Metallpyrophosphat-kasein-Verbindungen. 14. 10. 19. H. 78707. Schweiz 19. 5. 19. (15. 11. 20.)

Notizen.

Dr. Lüppe-Cramer-München ist wegen hervorragender Leistungen auf dem Gebiete der Photochemie von der Photographischen Gesellschaft in Wien zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Am 8. Januar starb im 62. Lebensjahre der Laboratoriumsvorstand der Spatenbrauerei München.

Albert Reichard

Er gehörte zu den ersten Forschern, die physikalisch-chemische und besonders kolloidchemische Denkmittel und Methoden in die Technologie der Brauerei einfuhrte. Auch die „Kolloid-Zeitschrift“ verliert in ihm einen getreuen und begeisterten Mitarbeiter.

Prof. Martin H. Fischer von der Universität von Cincinnati hielt im Januar in Leipzig, Berlin und Halle vor verschiedenen chemischen und medizinischen Gesellschaften Vorträge über kolloidchemische Themata, wie z. B. über die Kolloidchemie der Seifen, der Wasserabsorption und -sekretion im Organismus, über Oedem und Nephritis usw.

In Anerkennung der Wichtigkeit der Kolloidchemie für die Lederindustrie hat der Tanners Council of the United States (bestehend aus den führenden Lederindustriellen von U. S. America) ein Forschungsinstitut am College of Engineering der Universität von Cincinnati errichtet. George D. McLaughlin wurde zum Direktor des neuen Laboratoriums ernannt.

C. F. Cross hat von der Society of Dyers and Colourists die Medaille der Dyers Company für seine Arbeit: „Kolloide Tanninverbindungen und ihre Anwendungen“ erhalten.

Prof. Dr. P. Rona, Privatdozent an der Universität Berlin, ist ein Lehrauftrag zur Vertretung der speziellen Kolloidchemie in ihrer Anwendung auf Biologie und Medizin erteilt worden.

Die nächsten Hefte der Kolloid-Zeitschrift bzw. der Kolloidchemischen Beihefte werden u. a. folgende Arbeiten enthalten:

A. Kolloid-Zeitschrift:

- Lüppe-Cramer: Kolloidchemie und Photographie, LII.
- A. Steigmann: Ueber ein neues photographisches Emulsionungsverfahren.
- Zur Kenntnis der chemischen und physikalischen Entwicklung.
- A. Gyeant: Elektroendosmose und Ionenadsorption.
- Th. Fredale: Elastischer Schwefel.
- R. Auerbach: Ueber Koagulation und Dissolution.
- W. Moeller: Die Adsorption des Formaldehyds durch Tierkohle.
- E. Knafl-Lenz: Beitrag zur Kenntnis der Goldsole.
- G. M. de Toni: Ueber kolloides Kalziumphosphat.
- A. Gutb er u. P. Beckmann: Studien über Schntzkolloide, IX.
- W. K aus: Weitere Untersuchungen über das Bechholdische Kapillarphänomen.
- F. Weigert: Zur Kenntnis der optischen Eigenschaften disperser Systeme, I u. II.
- W. Moeller: Die Gerinnungserscheinungen in Gelatine-NaCl-Lösungen.
- F. Sekera: Einfaches Tyndallmeter.
- A. Ackermann: Die mikroskopischen Formen des Eisenrostes.
- K. Schaum u. H. Lang: Ueber die Farbe von Photochlorid in kolloidem Silber.
- G. Klemp u. J. von Gynlay: Ueber kolloide Arsenate, II.
- F. Sekera: Kolloidchemische Studien und die Keimwirkung.

B. Kolloidchemische Beihefte:

- K. Knoevenagel: Ueber die Natur der Quellungsvorgänge 1.