photoelektrischer Messungen untereinander, die mit Zellen verschiedener selektiver Empfindlichkeit ausgeführt sind, sehr genaue Farbenindexbestimmungen ausgeführt werden können. Um die große Genauigkeit der zweiten, rein photoelektrischen Methode für die verschiedenen Aufgaben voll ausnutzen zu können, ist es aber zunächst nötig, von einer größeren Anzahl sorgfältig ausgewählter Sterne, welche nicht spektroskopische Doppelsterne sind und auch sonst keine spektralen Anomalien zeigen, den Spektraltypus möglichst genau zu bestimmen, und aus ihnen die Beziehung zwischen Farbenindex und Spektraltypus durch photoelektrische Messungen abzuleiten. Sollte es sich dann herausstellen, daß für nicht

auffallend atypische Sterne die abgeleitete Beziehung auch individuell hinreichend streng gilt, was vorerst noch durchaus nicht festzustehen scheint, so würde die photoelektrische Methode es ohne Schwierigkeit und mit verhältnismäßig geringem Zeitaufwand ermöglichen, das Zehntel einer Spektralstufe scharf zu bestimmen, indem einem solchen Spektralintervall ein Unterschied des Farbenindex ($N\alpha - R\beta$) von $0^m 0.13$ bis $0^m 0.22$ entspricht. Abweichungen von $0^m 1$, die etwa einer halben bis dreiviertel Spektralstufe entsprächen, würden bei Sternen mit gut bekannten Spektren ohne weiteres auffallen und den betreffenden Stern der Duplizität oder sonstiger Anomalien verdächtig machen.

Königl. Sternwarte Berlin-Babelsberg, 1914 April 8.

P. Guthnick.

Ephemeride des Kometen 1914 a (*Kritzing*).

12^h m. Z. Berlin. Fortsetzung von A. N. 4739, 4753, gerechnet mit Herrn *P. Chofardets* Elementen.

1914	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	Gr.	1914	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	Gr.
Okt. 3	22 ^h 37 ^m 45 ^s	+9° 50' 0"	0.3317	0.0868	13 ^m 4	Okt. 31	22 ^h 50 ^m 52 ^s	+2° 43' 1"	0.3904	0.2381	14 ^m 5
4	37 59	9 28.8				Nov. 1	51 33	2 33.7			
5	38 15	9 8.0				2	52 14	2 24.6			
6	38 32	8 47.7				3	52 56	2 15.9			
7	38 50	8 27.8	0.3405	0.1084	13.6	4	53 39	2 7.5	0.3982	0.2588	14.6
8	39 9	8 8.4				5	54 23	1 59.4			
9	39 28	7 49.4				6	55 7	1 51.6			
10	39 49	7 30.9				7	55 52	1 44.1			
11	40 11	7 12.9	0.3492	0.1302	13.7	8	56 38	1 37.0	0.4058	0.2791	14.7
12	40 34	6 55.3				9	57 24	1 30.2			
13	40 58	6 38.2				10	58 11	1 23.6			
14	41 23	6 21.6				11	58 58	1 17.4			
15	41 49	6 5.4	0.3578	0.1521	13.9	12	22 59 46	1 11.4	0.4133	0.2990	14.9
16	42 16	5 49.6				13	23 0 35	1 5.7			
17	42 44	5 34.3				14	1 24	1 0.3			
18	43 13	5 19.4				15	2 13	0 55.1			
19	43 43	5 5.0	0.3662	0.1739	14.0	16	3 3	0 50.2	0.4207	0.3185	15.0
20	44 14	4 51.0				17	3 53	0 45.6			
21	44 46	4 37.4				18	4 44	0 41.2			
22	45 19	4 24.2				19	5 36	0 37.0			
23	45 52	4 11.5	0.3744	0.1956	14.2	20	6 28	0 33.1	0.4279	0.3375	15.2
24	46 27	3 59.1				21	7 21	0 29.4			
25	47 2	3 47.1				22	8 14	0 26.0			
26	47 39	3 35.5				23	9 7	0 22.7			
27	48 16	3 24.3	0.3825	0.2170	14.3	24	10 1	0 19.7	0.4350	0.3559	15.3
28	48 54	3 13.5				25	10 55	0 16.9			
29	49 33	3 3.0				26	11 50	0 14.3			
30	50 12	2 52.9				27	12 45	0 11.9			
31	22 50 52	+2 43.1	0.3904	0.2381	14.5	28	23 13 41	+0 9.8	0.4420	0.3739	15.4

Der Berechnung der Größe liegt die Schätzung 11^m 5 Juli 18 und das $r^2 \Delta^2$ -Gesetz zugrunde.

Genäherte Korrektur nach einer Beobachtung von Dr. *Graff* am großen Refraktor zu Bergedorf

Sept. 22 — $0^m 24^s$ — $0'.8$. Größe 13^m.

Kiel, Bureau der Astron. Nachr., 1914 Okt. 6.

M. Ebell.

Inhalt zu Nr. 4763. *P. Guthnick.* Weitere Ergebnisse photoelektrischer Messungen. 177. — *M. Ebell.* Ephemeride des Kometen 1914 a (*Kritzing*). 191.