diese nicht eigentlich dem Raumgitter des Kristalles ihre Entstehung verdanken, sondern wesentlich an das Auftreten vieler die Regelmäßigkeit des Raumgitters störenden Spaltflächen gebunden sind. Ist nämlich diese Regelmäßigkeit in einer Richtung häufig gestört, so bleiben von den drei bekannten Bedingungen für das Auftreten einer merklichen Intensität nur zwei bestehen, ganz wie das in der Theorie der ebenen Kreuzgitter der Fall ist.

Wir sind nun zu einer Beobachtung gelangt, welche diese Ansicht stützt. Ein Stück trigonalen Magnesium-Hydroxydes ergab bei der Durchstrahlung längs der dreizähligen Achse zunächst Interferenzpunkte; als es aber auf 340° erwärmt und bei dieser Temperatur untersucht wurde, fanden wir *ausschließlich* 6 vom Mittelpunkt ausgehende Striche, welche offenbar den von *Friedrich* beschriebenen Kreuzgitterspektren wesensverwandt sind; sie sind nahe dem Mittelpunkt verhältnismäßig schwach, nehmen mit wachsender Entfernung davon an Intensität zunächst zu, um nach Überschreitung eines Maximums wieder abzuklingen. Die Intensitätsverteilung im Spektrum der einfallenden Röntgenstrahlung (d. h. abgesehen von den spektral homogenen Fluoreszenzanteilen) spiegelt sich unseres Erachtens in dieser Energieverteilung wieder. Nach der Abkühlung auf Zimmertemperatur traten bei erneuter Durchstrahlung noch mehr derartige Striche, aber kein Interferenzpunkt auf. Zugleich zeigte sich, daß der anfangs durchsichtige Kristall vollständig trüb und sehr bröckelig geworden war, daß also zahlreiche neue Spaltflächen bei der Erwärmung in ihm entstanden waren.

Diese Versuche sind mit den vom Institut international de physique Solvay und von der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften gewährten Mitteln im physikalischen Institut der Universität Zürich durchgeführt.

Bemerkung zu dem Aufsatz von Holle „Gehirn und Seele“.

Zu der interessanten Frage, in welcher Weise sinn gemäß die Gehirngewichte verschiedener Tiere verglichen werden können, möchte ich mir einige Worte der Ergänzung im Anschluß an den Aufsatz von *Holle*, „Gehirn und Seele“ in Nr. 12 erlauben.

Daß ein Vergleich der Hirngewichte mit den Oberflächen zu besseren Resultaten führt, als der Vergleich mit den Körpergewichten, geht aus *Holles* Ausführungen klar hervor, doch ist diese Betrachtung noch einer Vertiefung fähig, die *E. Dubois*¹⁾ schon 1898 erreicht und in einer Arbeit, die soeben erschienen ist²⁾, weiter ausgearbeitet hat. Wenn man ohne eine Voraussetzung über die Form des Gesetzes, nach dem bei Tieren von gleichen geistigen Fähigkeiten das Gehirngewicht als Funktion der Körpergröße variiert, die tatsächlichen Werte für Formen vergleicht, die möglichst verschieden groß sind, so erhält man eine zahlenmäßige Beziehung, die nicht einfach auf die Körperfläche hinweist. Die Dimension der Körperfläche ist $s^{2/3}$, wenn s

das Körpergewicht bedeutet, oder $s^{0,666}$. Vergleicht man ausgewachsene Tiere, die möglichst nahe verwandt sind und auf etwa gleicher Stufe der Entwicklung des Nervensystems stehen, z. B. Maus und Ratte, Katze und Löwen usw., so ergibt sich, daß die Dimension des Gehirns proportional dem Ausdruck $s^{0,555}$ ist, d. h., daß mit zunehmender Größe das Gehirngewicht noch etwas langsamer als die Oberfläche wächst.

Dubois hat den „Relationsexponenten“, den wir r nennen wollen, für alle großen Klassen des Wirbelstammes bestimmt und gibt ihn folgendermaßen an:

für Säugetiere	$r = 0,5613$
Vögel	$r = 0,558$
Reptilien	$r = 0,5436$
Amphibien	$r = 0,5501$
Fische	$r = 0,5576$

für Wirbeltiere im Mittel $r = 0,5554$

Die relative Größe eines Gehirns wird dann gemessen durch eine Zahl c , die *Dubois* als den „Cephalisationsfaktor“ bezeichnet und die sich nach der Formel berechnet:

$$c = \frac{e}{s^r},$$

wenn c das Gehirngewicht, s das Körpergewicht und r den Relationsexponenten 0,555 bedeutet.

Setzen wir den Cephalisationsfaktor für den Menschen gleich 100, so erhalten wir für andere Tiere die folgenden Werte, einerseits nach *Holle*, andererseits nach *Dubois* (umgerechnet)¹⁾:

	nach <i>Holle</i>	nach <i>Dubois</i>
Mensch . . .	100	100
Elefant . . .	33	44,5
Orang . . .	33	26,4
Pferd . . .	14,2	16,3
Makak . . .	26	12,9
Hund . . .	14,2	10,6 bis 12,7
Katze . . .	14,2	11,7
Wal . . .	1,88	9,80
Maus . . .	6,4	2,77

Bei den sehr großen und sehr kleinen Tieren weichen die Werte nach den beiden Berechnungsarten am meisten voneinander ab.

E. Dubois hat aber noch eine weitere bemerkenswerte Beobachtung gemacht, die für die Vergleichung verschieden großer Exemplare derselben Spezies wichtig ist: Innerhalb der Art gilt für die Vergleichung der Individuen nicht der oben angegebene Relations-exponent $r = 0,555$, sondern ein viel kleinerer. Er fand ihn

für den Ochsenfrosch zu	0,2316
für den Menschen zu	$\left\{ \begin{array}{l} 0,245 \\ 0,228 \end{array} \right.$

also im Mittel zu 0,23! Das Gewicht des Gehirns eines Menschen von 50 kg und eines solchen von 80 kg sind in ihrem Gewicht viel weniger voneinander verschieden, als die Gehirne zweier ausgewachsener Tiere verschiedener Spezies von denselben Körpergewichtsdifferenzen. Will man also die relative Gehirnentwicklung verschiedener Rassen vergleichen, so darf man ähnliche Gehirngewichte nicht, wie *Holle* es tut, proportional $s^{0,666}$ setzen, sondern nur proportional $s^{0,23}$. Das Gehirn des Japaners mit 1300 g bei 60 kg

¹⁾ *E. Dubois*, Über die Abhängigkeit des Hirngewichtes von der Körpergröße bei den Säugetieren. Arch. f. Anthropologie Bd. 25, 1898, p. 1—28 und 423 bis 441.

²⁾ *E. Dubois*, On the relation between the quantity of brain and the size of the body in Vertebrates. Koninklijke Akad. van Wetenschappen te Amsterdam Vol. XVI, 1914, p. 1—22.

¹⁾ Umgerechnet aus den Faktoren c von *Dubois*, indem der Wert für den Menschen willkürlich gleich 100 gesetzt wurde.

Körpergewicht würde danach nicht größer sein, als das des Europäers mit 1362 g bei 64 kg Körpergewicht, sondern *kleiner*. Erst bei 1342 g wäre es dem des Europäers gleich. Setzt man die Cephalisation des Europäers gleich 100, so hat der Japaner nur 92,6. Nun aber ergibt sich ein unerwartetes und ganz besonders interessantes Resultat bei der Vergleichung der Mittelwerte für Gehirn- und Körpergewicht bei den beiden Geschlechtern. Die Zahlen, die hier vorliegen, zeigen, daß sich Mann und Weib in bezug auf die Entwicklung des Gehirns *wie zwei verschiedene Spezies* von verschiedener mittlerer Größe verhalten, *nicht dagegen wie verschieden große Individuen derselben Art*. Es ergibt sich nämlich als Relationsexponent für die intersexuelle Vergleichung für den Menschen und den Budeng (*Semnopithecus*) der Wert 0,553, also genau der Wert, der für die Vergleichung verschiedener Spezies in allen Klassen der Wirbeltiere gefunden wurde. Rechnet man die folgenden Werte mit dem Exponenten 0,555 um, so erhält man:

	Körpergewicht	Gehirngewicht	Cephalisationsfaktor
Männer . .	63 685	1353,7	2,9183 = 100,00
Weiber . .	54 432	1233,2	2,9015 = 99,05

Der alte Streit um die relative Größe des männlichen und weiblichen Gehirns schlichtet sich danach in der Weise: beide Gehirne stehen genau in dem Verhältnis, wie die Gehirne zweier gleich gut „cephalisierter“ Tiere verschiedener Spezies.

Prof. Dr. A. Pütter, Bonn.

Die obigen Ausführungen stellen in der Tat eine wertvolle Ergänzung meiner Erörterungen dar, insbesondere was den Nachweis einer Abweichung von der *genauen Proportionalität* der Hirngröße mit der Körperoberfläche betrifft. Eine solche zu behaupten, hat mir fern gelegen; ich habe nur dieses Verhältnis berechnet, um zu zeigen, daß eine wesentliche *Abhängigkeit* der Hirngröße von der Körperoberfläche besteht. Ich begreife nicht, nachdem *E. Dubois* diese schon 1898 erkannt hat, daß dann heute immer noch mit dem Vergleich mit der Körpermasse oder mit der absoluten Hirngröße gearbeitet wird. Was den Vergleich des Japaners mit dem Europäer betrifft, so möchte ich zur Erwägung stellen, ob nicht die Berechnung entsprechend verschiedenen *Arten* berechtigter ist als die für verschieden große Individuen derselben Spezies. Eine besondere Bedeutung der Untersuchungen *Dubois'* liegt, wie mir scheint, darin, daß sie einen bemerkenswerten Unterschied zwischen individueller Variation, auch durch Zuchtwahl gesteigerter und fixierter (Hund), und artlicher Verschiedenheit feststellen. Bei den individuellen Schwankungen der Gesamtgröße um einen Mittelwert ändert sich das Gehirn nur nach einem von der Länge abhängigen Verhältnis und verliert damit seine im Mittelwert vorhandene Orientierung nach der Oberfläche. Eine artgemäße Verschiedenheit der Größe bedeutet dagegen eine *neue Gleichgewichtslage*, die nach dem Oberflächenverhältnis eingestellt ist, das, wie ich wahrscheinlich zu machen versucht habe, auch bei der *Entwicklung* des Einzelwesens inne gehalten wird.

Prof. Dr. H. G. Holle, Bremerhaven.

Besprechungen.

Meyer, Kirstine, *Die Entwicklung des Temperaturbegriffs im Laufe der Zeiten*. Übersetzt aus dem Dänischen von Irmgard Kolde. Braunschweig, Fr. Vie-

weg & Sohn, 1913. 160 S. Preis geh. M. 4,—, geb. M. 4,80.

Wenn wir die Entwicklung des Temperaturbegriffs an Hand des vorliegenden Büchleins verfolgen, so gewinnen wir ein anschauliches Bild von den Kämpfen, die die Wissenschaft durchfechten mußte, um sich zur völligen Klarheit der Begriffe überhaupt hindurchzurufen. Vielleicht sieht man es gerade in der Wärmetheorie, die neben der Mechanik zu den ältesten Zweigen der Physik gehört, am deutlichsten, wie zunächst überall das Empfinden des Menschen oder seine durch mythologische Berichte beeinflusste Phantasie für die Beurteilung der Naturerscheinungen maßgebend ist, und wie erst nach jahrhundertelangen Kämpfen und dem zielbewußten Vorgehen einiger hervorragender Geister allmählich das rein Menschliche aus der Naturwissenschaft entfernt und durch objektive Wahrheit ersetzt wird.

In unserer rasch vorwärts strebenden Zeit bedeutet es eine Art Entsagung, sich in die wirren und unklaren Begriffe jener Zeiten zu vertiefen, in denen wenig experimentiert, die Natur meist schlecht beobachtet, dafür aber um so mehr philosophiert wurde. Dem Referenten ist es nicht leicht geworden, sich durch das Buch hindurchzuarbeiten, zumal der wesentliche Inhalt in ansprechenderer Form in den Prinzipien der Wärmelehre von *Mach* zu finden ist. Für den Historiker indessen hat das Werk *Kirstine Meyers* gewiß hohe Bedeutung, zumal viele Originale des näheren zitiert werden. Besonders eingehend wird der Einfluß *Olaf Römers*, des Landsmannes der Verfasserin, auf die Entwicklung der Thermometrie behandelt.

Aus dem Inhalt des Buches mag hier folgendes mitgeteilt werden:

Der Begriff Temperatur konnte sich naturgemäß erst entwickeln, nachdem die wesentlichsten Grundtatsachen auf dem Gebiet der Wärme richtig erkannt waren. Man mußte sich vor allem darüber klar sein, wann zwei Körper gleich oder verschieden stark erwärmt sind. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts war dies noch keineswegs der Fall. Die physikalische Erkenntnis ging damals in ihren Wurzeln noch auf Aristoteles und die Philosophen des Altertums zurück, in deren Theorien Liebe und Haß der Elemente eine wesentliche Rolle spielten. Ganz deutlich kommen die gleichen Gedanken in der Lehre von der Antiperistasis zum Ausdruck, die im 17. Jahrhundert große Bedeutung gewann. Ihr zufolge sollen Wärme und Kälte von selbst gesteigert werden, wenn sie von ihren Gegensätzen, Kälte oder Wärme, umgeben sind. Man unterschied damals Stoffe, die man an und für sich als warm ansah, wie Alkohol oder Pfeffer, von solchen, die man an und für sich für kalt hielt, wie Opium, Wasser, Erde oder auch die Luft. Daß derselbe Keller, der im Sommer kalt und im Winter warm erschien, auch wirklich je nach der Jahreszeit verschiedene Temperaturen besaß, galt als feststehende Tatsache. Bald hielt man die Wärme sowohl als die Kälte für einen Stoff, bald wurde angenommen, daß sie die Folgen verschiedenartiger Bewegung seien. *Gassendi* (17. Jahrhundert) unterschied Wärme- und Kälteatome, denen er kugelförmige Gestalt, aber verschiedene Größe zuschrieb. Nach dem Vorgange *Demokrits* dachte er sich die Wärmeatome als die Grundbestandteile, aus denen das Feuer gebildet wird. Für die grobsinnliche Vorstellungsart jener Zeit ist es bezeichnend, daß nach *Gassendi* die fetten und klebrigen Körper deshalb leicht Feuer fangen, weil sie die Feueratome leicht festhalten können.