*	α 1909.0	δ 1909.0	Autorità	*	α 1909.0	δ 1909.0	Autorità
44	10 ^h 55 ^m 38 ^s .20	— 5° 19' 8".8	AG Strb 4191	61	18 ^h 34 ^m 7 ^s .99	— 20° 17' 49".7	Anon. (10 ^m 0) riferita a *60
45	10 59 0.55	+ 33 38 17.2	AG Lei 4348	62	16 11 32.99	+ 5 25 26.6	AG Lpz II 7250
46	11 8 11.71	+ 0 42 56.9	AG Nic 3207	63	16 10 14.97	— 30 53 52.1	GZ 16 ^h 569
47	11 39 26.94	— 14 57 2.4	AG Wa 4591	64	17 42 5.70	— 6 10 17.8	AG Ott 5996
48	12 33 1.95	+ 11 5 4.5	AG Lpz I 4630	65	19 18 25.41	— 19 50 54.2	Ci ₂ 1650
49	12 30 16.43	+ 11 20 19.4	" 4613	66	18 54 30.58	— 18 33 35.9	Par ₃ 25080
50	11 4 43.59	+ 6 44 20.6	AG Lpz II 5707	67	23 30 49.10	— 2 19 35.1	AG Strb 8085
51	13 33 13.64	— 18 43 28.7	AW 10672	68	23 29 1.10	— 2 44 47.5	" 8088
52	14 10 27.15	+ 3 13 19.7	AG Alb 4914	69	0 21 51.20	+ 10 46 43.6	AG Lpz I 104
53	12 19 52.13	+ 11 40 20.2	AG Lpz I 4570	70	0 19 17.30	+ 10 27 53.1	Anon. (10 ^m 7) riferita a AG Lpz I 87
54	15 15 53.88	— 3 11 27.4	AG Strb 5360	71	23 50 26.77	— 8 56 53.1	AG Ott 8429
55	15 2 47.25	— 20 30 10.5	Mill ₂ 1501	72	0 10 3.20	— 10 26 21.6	San ₃ 14
56	17 21 3.18	— 7 40 21.6	AG Ott 5912	73	23 46 8.25	— 16 37 47.7	AG Wa 8775
57	17 32 11.37	— 9 27 6.8	" 5956	74	23 44 25.57	— 16 46 3.0	" 8763
58	19 25 22.26	— 10 41 31.5	1/4 (Par ₂ 16239 + San ₃ 2148 + Sj 7362 + Par ₃ 16239)	75	23 23 17.47	— 8 41 22.6	AG Ott 8319
59	18 51 37.87	— 14 8 45.7	AG Wa 7006	76	2 54 27.83	+ 26 56 21.0	AG Cbr E. 1538
60	18 34 29.70	— 20 9 8.0	1/3 (Cp ₀₀ 2553 + II 10 y 4650 + RC ₀₀ 4898)	77	0 18 51.47	— 21 11 59.8	AW 133
				78	2 9 4.92	— 10 10 24.7	1/2 (San ₃ 173 + W 2 ^h 82)

La stella 8 = BD + 28° 59' è di 10^m8 mentre BD = 9^m5. AG 9^m5 (1893 Dic. 22, 1894 Dic. 19, 1895 Gienn. 18), Argelander 9^m6 (1857 Nov. 15). 1908 Nov. 28 e Dic. 18 = 10^m8 come sopra.

Eclisse totale di luna del 3 Giugno 1909.

Cielo sereno. Appena la luna entrò nell'ombra terrestre la lunula occultata apparve nitida con colore cinereo; la qual cosa generalmente non ha luogo; anzi il lembo lunare occultato non si scorge che a fase avanzata quando comincia ad essere sensibile la colorazione rossastra. La colorazione rossastra si fece evidente 50^m prima dell'immersione. Anche al momento del medio dell'eclisse, per essere questo eccentrico, la parte Sud della luna restò tinta di lieve colorazione argentea.

Seguendo il programma elaborato dal Dr. E. Bianchi vennero osservate all'equatoriale Steinheil-Cavignato dal Dr. G. Zappa le seguenti occultazioni:

Roma, 21 Novembre 1909.

Grandezza osservata cioè affetta da assorbimento atmosferico	BD	Fenomeno I = Immersione E = Emersione	Tempo sidereo locale (Roma C. R.)
9 ^m 2	— 22° 42' 19	I	18 ^h 35 ^m 0 ^s .16
10.3	— 22 42 22	I	18 36 11.62
10.7	— 22 42 23	I	18 47 38.02
10.2	— 22 42 27	I	19 7 37.11
9.2	— 22 42 19	E	19 9 40.31?
10.7	— 22 42 25	I	19 13 28.70
10.5	— 22 42 29	I	19 17 20.01

E. Millosevich.

On the orbit of Σ 1768.

By W. Doberck.

The double star 25 Canum Venaticorum, the components of which are of the 5¹/₂ and 7¹/₂ magnitudes, was discovered by W. Struve in 1829. The companion disappeared in 1856, when the distance must have decreased to 0".14. It was not visible in the Pulkowa refractor in 1872, but was rediscovered and measured by O. Struve in 1875. Different observers suspected that they saw it in small telescopes between 1856 and 1875. Their observations are not represented by the following elements, with the exception of Dunér's observations in 1869 and 1870, when the distance between the components had increased to a third of a second of arc (compare γ Coronae A. N. 4041). The elements of the orbit are as follows (precession has been neglected in this case):

$$\begin{aligned}
 \Omega &= 257^\circ 33' & P &= 553.76 \\
 \lambda &= 36.39 & T &= 1859.15 \\
 \gamma &= 56.31 & a &= 2".038 \\
 e &= 0.9005 & & \text{Retrograde.}
 \end{aligned}$$

The great eccentricity agrees with the long period (A. N. 3519). The following ephemeris has been calculated from the formulae (the anomaly is taken positive before and negative after the periastron passage):

$$\begin{aligned}
 q \cos \theta &= -0".2728 + 0".5820 \sin (E + 31^\circ 21') \\
 q \sin \theta &= +1.5685 + 1.7948 \sin (E - 76^\circ 4') \\
 \pm s &= -0.9139 + 1.1751 \sin (E + 59^\circ 42')
 \end{aligned}$$

The hypothetical parallax amounts to 0".030.

t	θ	ϱ	$\pm z$
1830.5	76.2	1.28	—
1835.5	73.9	1.11	—
1840.5	71.0	0.95	—
1845.5	66.2	0.73	—
1850.5	57.2	0.48	—
1855.5	23.7	0.20	—
1860.5	257.8	0.24	—
1865.5	212.3	0.31	—
1870.5	183.0	0.38	—
1875.5	165.0	0.47	—
1880.5	153.4	0.59	—

t	θ	ϱ	$\pm z$
1885.5	145.7	0.71	—
1890.5	139.8	0.82	—
1895.5	135.6	0.92	—
1900.5	132.3	1.03	—
1905.5	129.4	1.13	—
1910.5	127.0	1.22	—1.410
1912.5	126.2	1.26	—1.438
1914.5	125.4	1.30	—1.463
1916.5	124.7	1.34	—1.487
1918.5	124.0	1.38	—1.511
1920.5	123.3	1.41	—1.532

t	θ	ϱ	$\pm z$
1922.5	122.7	1.44	—1.555
1924.5	122.1	1.48	—1.571
1926.5	121.5	1.52	—1.590
1928.5	121.0	1.56	—1.611
1930.5	120.5	1.59	—1.630
1932.5	120.0	1.63	—1.650
1934.5	119.5	1.66	—1.671
1936.5	118.9	1.69	—1.688
1938.5	118.4	1.72	—1.705
1940.5	117.9	1.75	—1.721

Obs.	t	$\theta_o - \theta_c$	$\varrho_o - \varrho_c$
Σ	1829	+ 3.1	—0.25
»	33	— 2.7	—0.11
»	36	— 1.6	—0.01
O Σ	41	+ 2.1	+0.09
Mä	41	+ 0.5	+0.09
Da	42	— 1.9	+0.12
»	43	+ 1.6	+0.20
Mä	43	+ 2.2	—0.10
O Σ	46	+ 3.3	+0.04
Mä	47	— 7.8	—0.23
O Σ	49	+ 6.6	+0.13
Mä	51	+ 1.6	—0.05
»	52	— 5.9	—0.07
»	53	— 9.7	+0.02
Da	54	— 1.1	+0.08
Mä	54	+12.3	+0.11
Se	56	+23.0	—
Du	69	—10.0	—
»	70	+ 2.7	—0.27
O Σ	75	+ 2.1	+0.16
Sp	76	— 0.9	—0.07
»	77	— 5.5	—0.08
O Σ	77	— 4.9	+0.08
A	78	— 5.8	+0.21
Sp	79	+ 0.2	—0.05
Hl	79	+ 2.1	—0.06
»	80	+ 3.9	—0.25
β	80	+ 1.5	+0.01
Big	81	— 0.3	—0.11
Sp	81	+ 1.6	+0.06
Hl	81	+ 5.6	—0.07
β	81	+ 4.2	—0.19
En	82	— 0.9	+0.12
Hl	82	+ 2.7	—0.18
Sp	82	+ 1.3	+0.07
Hl	83	— 1.6	—0.06
En	83	+ 2.8	+0.15
Sp	83	+ 0.5	+0.05
Per	83	+ 0.8	—0.14
Big	84	— 3.6	—
Hl	84	— 1.6	—0.04
Sp	85	+ 2.5	+0.15
Per	85	+ 3.3	+0.20

Obs.	t	$\theta_o - \theta_c$	$\varrho_o - \varrho_c$
T	1885	+4.0	+0.07
Per	86	—1.4	—
Hl	86	+0.8	+0.07
Sp	86	+2.4	+0.06
Hl	87	+2.5	—0.07
Sp	87	—0.6	—0.02
Hl	88	+3.7	—0.03
Sp	88	+0.9	0.00
»	89	—0.4	+0.05
H Σ	89	+3.1	+0.19
Sp	90	—2.0	0.00
Big	91	+0.1	—0.01
Sp	91	+2.4	—0.03
Mw	91	+4.6	+0.10
β	92	—0.9	+0.13
Big	92	—1.0	+0.13
Com	92	+2.1	+0.08
Jo	93	—3.9	—0.05
Big	93	+0.4	+0.13
Sp	93	+1.2	—0.07
Com	93	+1.8	+0.01
Big	94	—0.1	+0.28
Sp	94	+1.8	—0.04
Bar	95	—2.1	+0.31
See	95	+0.6	+0.15
Gla	95	+0.4	0.00
Sp	95	—2.1	+0.04
Cls	95	+2.7	+0.46
Gl	95	+1.6	+0.09
Mw	95	+8.5	+0.01
Com	95	+1.8	—0.02
»	96	+0.1	+0.13
L	96	+1.3	+0.23
Sk	96	+1.0	+0.06
Clm	96	+8.0	—0.07
L	97	—0.9	+0.07
Doo	97	+4.6	+0.45
Com	97	+2.2	+0.11
A	98	+1.6	+0.18
L	98	+6.4	—0.06
Com	98	+0.9	—0.02
Bow	98	+6.1	—0.30
Gl	98	—1.3	+0.02

Obs.	t	$\theta_o - \theta_c$	$\varrho_o - \varrho_c$
Bry	1898	—0.1	—0.01
A	99	—1.0	+0.18
Br	99	—4.3	+0.44
See	99	—4.2	+0.41
Doo	99	—2.0	+0.18
Bry	99	—5.1	+0.19
L	99	—2.2	—0.11
Com	99	+1.4	+0.12
Mw	99	+2.1	+0.04
Gl	1900	—2.5	+0.17
Lh	00	—2.2	+0.43
L	00	+1.9	—0.09
Doo	00	+1.7	+0.12
Bry	00	—2.5	—0.15
Lh	01	—0.5	+0.20
Bow	01	—1.4	+0.07
Com	01	+3.6	+0.15
Bry	01	—1.0	—0.16
Bry	02	+0.1	+0.13
Bow	02	—3.7	+0.31
Com	02	+3.6	+0.09
Bry	03	—0.4	+0.09
Bis	03	+1.8	—0.09
Lh	03	—2.6	—0.19
Com	03	—1.8	+0.15
Do	03	—0.6	—0.05
Doo	03	+2.7	+0.19
»	04	+3.4	+0.34
Lh	04	+0.6	+0.04
Bow	04	+3.4	0.00
Com	04	+2.2	—0.14
Fm	05	—3.4	—0.21
Lh	05	—1.3	+0.09
Bis	05	—0.7	—0.18
Lh	06	—2.8	+0.45
Com	06	+2.4	—0.06
Do	08	+2.7	—0.10
Prz	08	+2.4	+0.19
Fx	08	+0.4	0.00
Do	09	+0.7	—0.01
JK	09	—2.1	—0.14

Obs.	P. E. of Angle				Errors of Distance		
	ρ	Deg. at 1"	arc	n	Const.	P. E.	n
Mä	0.5	± 2.08	± 0.035	7	-0.033	± 0.083	7
Da	0.6	± 1.14	± 0.019	3	$+0.133$	± 0.044	3
OZ	0.6	± 2.09	± 0.036	5	$+0.100$	± 0.034	5
Per	0.7	± 1.31	± 0.022	3	$+0.030$	± 0.17	2
β	0.7	± 1.45	± 0.025	3	-0.017	± 0.121	3
Sp	0.7	± 0.98	± 0.017	16	$+0.007$	± 0.046	16
Hl	0.7	± 1.58	± 0.027	9	-0.077	± 0.057	9
Big	0.8	± 0.65	± 0.011	6	$+0.084$	± 0.100	5
Mw	0.9	± 4.65	± 0.079	3	$+0.050$	± 0.034	3

Obs.	P. E. of Angle				Errors of Distance		
	ρ	Deg. at 1"	arc	n	Const.	P. E.	n
Com	1.0	± 1.74	± 0.029	12	$+0.051$	± 0.068	12
Gl	1.0	± 1.79	± 0.031	3	$+0.093$	± 0.052	3
L	1.0	± 2.40	± 0.041	5	$+0.008$	± 0.109	5
Bry	1.0	± 1.41	± 0.024	6	$+0.015$	± 0.113	6
Doo	1.0	± 2.85	± 0.049	5	$+0.256$	± 0.106	5
Bow	1.0	± 3.73	± 0.064	4	$+0.020$	± 0.166	4
Lh	1.1	± 1.66	± 0.029	6	$+0.170$	± 0.175	6
Do	1.2	± 1.62	± 0.027	3	-0.053	± 0.034	3
Σ	1.2	± 3.10	± 0.053	3	-0.123	± 0.086	3

If the anomalies are considered negative before and positive after the periastron passage, the inclination must be in the second quadrant, and the elements may be written: Ω $77^\circ 33'$, λ $143^\circ 21'$, and γ $123^\circ 29'$. This is doubtless the best way to indicate retrograde motion.

Sutton, Surrey, 1909 Dec. 8.

W. Doberck.

Neuer Veränderlicher 1.1910 Pegasi.

Im Astron. Journal 26.46 teilt Herr P. S. Yendell mit, daß er den Stern BD +34°4598 in der Zeit 1909 Nov. 30 bis Dez. 11 stets schwächer als 10^m gefunden habe. Eine Abnahme der Helligkeit um etwa 0^m.5 in dieser Zeit hält er noch nicht für verbürgt. Der Ort ist nach Kü 9796:

$$\begin{aligned} 1855.0 & \quad 21^h 59^m 27.89 + 34^\circ 12' 4.9 \\ 1900.0 & \quad 22 \quad 1 \quad 25.68 + 34 \quad 25 \quad 7.3 \end{aligned}$$

Der Stern ist in Poph III p. 79 (Aufnahme von 1894 Sept. 14 23^h 15^m 1 Sternz. Potsdam) als 9^m.7 enthalten. Auf Grund der folgenden Notiz von Geheimrat F. Küstner wird er als 1.1910 Pegasi zur weiteren Beobachtung empfohlen. Prof. Küstner schreibt, Bonn 1910 Jan. 11:

»Die beiden von Yendell (A. J. No. 605) beobachteten Sterne:

$$\begin{aligned} a &= \text{BD} + 33^\circ 44' 24 \quad 9^m.4 \quad 22^h \quad 0^m \quad 9^s.8 \quad + 33^\circ 51' 6 \\ v &= \quad + 34 \quad 45' 98 \quad 9.2 \quad 21 \quad 59 \quad 27.7 \quad + 34 \quad 13.0 \end{aligned}$$

sind dreimal zusammen in BD wie folgt beobachtet:

SZ. 988 Sch. 1856 Aug. 2, sehr klare Luft

$$a = 9^m.5 \quad v = 9^m.0$$

SZ. 1009 Kr. 1856 Aug. 10, sehr klar

$$a = 9^m.5 \quad v = 9^m.0$$

SZ. 1012 Sch. 1856 Aug. 24, heller C und dunstig

$$a = 9^m.2 \quad v = 9^m.5.$$

Meine originalen Schätzungen von v in Zone 370 (1897 Okt. 18): 9^m.2 und in Zone 374 (1897 Okt. 24): 9^m.3 schließen sich der Skala der BD an (die Größe 9^m.63 im Katalog ist reduziert auf »normale Skala«, die erheblich schwächer als die der BD ist).

Die Beobachtungen von Yendell verglichen mit denen der BD und den meinigen lassen kaum einen Zweifel, daß der Stern $v = +34^\circ 45' 98$ veränderlich ist.«

Beobachtung der Bedeckung eines Sternes durch den Kern des Halleyschen Kometen

mit dem großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte am 5. Dezember 1909.

Als ich am Sonntag (1909 Dez. 5) Abend Versuchsaufnahmen des Halleyschen Kometen mit dem großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte (Öffnung 65 cm, Brennweite 21 m) machte, bemerkte ich, daß der Komet in die Nähe eines Sternes 12. Größe rückte und ihn bald bedecken würde. Ich unterbrach sofort die Aufnahme, nahm die Kassette ab und setzte das Okular an. Inzwischen war jedoch bereits der Kern des Kometen auf den Stern gerückt, so daß er ihn schon völlig bedeckte. Da der Kometenkern sehr scharf begrenzt war, und nur ein klein wenig größer erschien als der Stern, so konnte ich den Wiederaustritt des Sternes genau beobachten. Es sah so aus, als ob sich der Kometenkern in zwei Teile auflöste, wovon der rechts liegende, der Stern, etwas lichtschwächer war. Es war während der Bedeckung

keine Spur von Farbenwechsel am Stern zu beobachten. Ich habe den Kern des Kometen mit den Nachbarsternen nach der Argelanderschen Methode verglichen und gebe hier die Schätzungen und eine Lageskizze wieder.

Wenn ich der Helligkeit nach die Sterne mit A, B,

C, D bezeichne und den Kometenkern mit K, so ergaben die Schätzungen: A 10 B, K 2 B, B 1 C, C 2 D. Keiner der vier Sterne ist in der BD noch in den AG Katalogen zu finden, so daß sich über die Helligkeit derselben keine bestimmten Angaben machen lassen. Nehme