$\Delta\beta = +3''.2$ oder nach Rechnung mit den angegebenen Gaußschen Konstanten $\Delta\alpha \cos \delta = -10''.8$ $\Delta\delta = +1''.8$ übrig, und dieser Fehler ist auf Grundlage der parabolischen Hypothese nicht zum Verschwinden zu bringen. Da an den einzelnen Tagen in den auf den gleichen Zeitpunkt reduzierten Beobachtungen Unterschiede bis $0''.5$ bez. $11''$ übrig bleiben, gestattet das vorhandene Material zurzeit noch keine weitergehenden Versuche, eine befriedigendere Darstellung zu erlangen. Wenn auch eine später mitgeteilte Beobachtung

1911 M. Z. Bothkamp α app. δ app.
 Aug. 8 $13^h 45^m 20^s$ $3^h 20^m 14^s 20$ $+15^\circ 19' 31''.4$
 von der Ephemeride schon die Abweichung $B-R$ $\Delta\alpha = -3''.7$ $\Delta\delta = -1' 54''$ zeigt, dürfte die nachstehende Ephemeride sich dem scheinbaren Laufe des Kometen doch für die Beobachtung hinreichend nahe anschließen.

Nach telegraphischer Mitteilung ward der Komet am 5. August von Kanzleioffiziant *Raimond Moravansky* in Gaya (Mähren) selbständig aufgefunden.

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1911	α vera	δ vera	$\log r$	$\log A$	Gr.
Aug. 13	$2^h 23^m 8^s$	$-3^\circ 27'.3$	0.0447	9.3848	3 ^m 8
14	2 4 46	9 31.5		9.3531	
15	1 42 52	16 22.4		9.3283	
16	1 16 53	23 42.5		9.3137	
17	0 46 31	31 0.5	0.0667	9.3116	3.6
18	0 12 0	37 39.8		9.3223	
19	23 34 16	43 9.6		9.3441	
20	22 55 7	47 15.8		9.3742	
21	22 16 50	50 1.2	0.0878	9.4092	4.1
22	21 41 23	51 39.6		9.4467	
23	21 9 59	52 28.5		9.4847	
24	20 43 1	52 44.0		9.5222	
25	20 20 15	52 38.4	0.1081	9.5585	5.0
26	20 1 11	52 20.0		9.5933	
27	19 45 13	51 54.9		9.6264	
28	19 31 50	51 26.1		9.6579	
29	19 20 32	-50 56.2	0.1275	9.6878	5.8

1911	α vera	δ vera	$\log r$	$\log A$	Gr.
Aug. 30	$19^h 10^m 57^s$	$-50^\circ 26'.4$			
31	19 2 46	49 57.2			
Sept. 1	18 55 44	49 29.3			
2	49 40	49 2.9	0.1461	9.7930	6 ^m 4
3	44 24	48 37.8			
4	39 48	48 14.3			
5	35 47	47 52.1			
6	32 16	47 31.4	0.1640	9.8796	6.9
7	29 10	47 12.0			
8	26 26	46 53.7			
9	24 1	46 36.6			
10	21 53	46 20.4	0.1811	9.9525	7.4
11	20 0	46 5.3			
12	18 25	45 51.0			
13	16 52	45 37.6			
14	18 15 34	-45 24.9	0.1975	0.0151	7.8

Kiel, 1911 Aug. 11.

H. Kobold.

Mitteilungen über kleine Planeten.

Ephemeride von (89) Julia.
 12^h M. Z. Berlin. Gr. = 8^m9.

1911	α	δ	$\log r$	$\log A$
Aug. 15	$23^h 2^m 21^s$	$+7^\circ 26'.7$	0.3219	0.0647
19	22 58 46	7 59.7		
23	54 48	8 29.1	0.3210	0.0519
27	50 33	8 54.6		
31	46 8	9 16.3	0.3202	0.0445
Sept. 4	41 38	9 34.0		
8	37 8	9 47.9	0.3196	0.0430
12	32 46	9 58.0		
16	28 36	10 4.8	0.3192	0.0473
20	24 44	10 8.5		
24	22 21 15	+10 9.5	0.3189	0.0572

Variation: $\pm 1^m$, $\pm 10''.6$ Aug. 23
 $\pm 1^m$, $\pm 11''.3$ Sept. 16

Diese Ephemeride ist gerechnet unter den Annahmen:

1909 Jan. 31.5 $dM = -96''.0$ $M = 124^\circ 11'.0$
 $d\mu = -0''.8000$.

Diese empirischen Korrekturen reduzieren die zur genäher-
 ten Darstellung der Erscheinungen 1897, 1903, 1905, 1907
 und 1909 erforderlichen Änderungen von M , nämlich $-34''.7$,

$-64''.6$, $-64''.0$, $-83''.3$ und $-96''.0$ auf die Reständerungen
 $+0''.2$, $+2''.3$, $+9''.3$, $+2''.9$ und $-3''.0$. Beträchtliche Störungen
 dürften bei der letzten Konjunktion Julia-Jupiter um
 1909.7, die nahe mit dem Julia-Aphel zusammenfiel, erfolgt sein.

Berlin, Astron. Recheninstitut, 1911 Aug. 1.

A. Berberich.

Ephéméride de (386) Siegena.

Les éléments sont tirés du B. J. 1913, les positions
 calculées pour minuit Paris.

1911	α	δ	$\log r$	$\log A$
Août 9	$22^h 39^m 40^s$	$+0^\circ 58'.6$	0.4091	0.2096
11	38 42	0 39.2		
13	37 40	+0 18.7	0.4082	0.2027
15	36 35	-0 2.3		
17	35 26	0 24.4	0.4073	0.1967
19	34 14	0 47.3		
21	33 0	1 11.0	0.4064	0.1918
23	31 43	1 35.4		
25	30 25	2 0.4	0.4055	0.1881
27	29 6	2 26.0		
29	27 45	2 52.1	0.4046	0.1856
31	22 26 24	-3 18.5		

1911	α	δ	$\log r$	$\log A$
Sept. 2	22 ^h 25 ^m 4 ^s	−3° 45' 2"	0.4037	0.1843
4	23 45	4 12.2		
6	22 26	4 39.3	0.4029	0.1843
8	21 8	5 6.4		
10	19 53	5 33.4	0.4020	0.1855
12	18 40	6 0.3		
14	17 30	6 27.1	0.4012	0.1880
16	16 23	6 53.5		
18	22 15 20	−7 19.5	0.4004	0.1916

Gr. 9^m7. Préc. à 1855.0: −2^m53^s −17'2".

Observatoire de Nice, 1911 Juillet 21.

A. Schaumasse.

Beobachtungen auf der k. k. Sternwarte Wien.

Die in A. N. 4516 mitgeteilte Ephemeridenkorrektur von (530) Turandot ist zu streichen. Die Beobachtung scheint sich auf (360) Carlova zu beziehen. Meine Beobachtungen des Planeten lauten:

1911	M. Z. Wien	α app.	$\log p \cdot \Delta$	δ app.	$\log p \cdot \Delta$
Juli 26	13 ^h 22 ^m 44 ^s 21 ^h 58 ^m 38 ^s 84	8.580 _n −14° 9' 8" 2	0.890		
30	12 42 42 21 56 21.27	8.884 _n −14 36 34.4	0.890		
31	11 53 27 21 55 45.87	9.183 _n −14 43 27.2	0.886		

Ferner fand ich folgenden neuen Planeten 1911 MD von der Größe 13^m7:

1911	M. Z. Wien	α app.	$\log p \cdot \Delta$	δ app.	$\log p \cdot \Delta$
Juli 30	14 ^h 8 ^m 1 ^s 21 ^h 47 ^m 9 ^s 65	9.022 −11° 26' 47" 6	0.877		
30	14 48 49 21 47 8.77	9.194 −11 26 54.8	0.874		
31	13 11 10 21 46 29.89	7.382 _n −11 32 36.9	0.879		

1911	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Red. ad l. app.		*
Juli 30	+7 ^s 39	+25".1	+2 ^s 64	+9".1	1
30	+6.51	+17.9	+2.64	+9.1	1

Vergleichstern 1: 21^h 46^m 59^s 62 −11° 27' 21" 8 (1911.0)
Mü₂ 12055.

Wien, 1911 Aug. 1.

J. Palisa.

Ephemeridenkorrekturen 1911 Aug. 2.

[Mitgeteilt von Direktor *B. Baillaud.*]

(360) Carlova (A. N. 4505): −0^m25^s −3'1.

(374) Burgundia (A. N. 4505): +0^m23^s +1'7.

M. Giacobini.

Note on Asteroid Observations in 1908.

In the comparison of observed places with ephemerides in the asteroid observations of 1908 (Astr. Nachr. 4367 p. 387) correction was not made for parallax nor, in the case of Parthenope, for the Equation of Light. Making these corrections the results, O—C, become:

1908	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1908	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
(4) Vesta.			June 25	−0 ^s 41	−5"4
Jan. 24	+0 ^s 29	+6"0	26	+0.32	−1.4
24	+0.29	+8.6	30	−0.11	+0.6
25	+0.61	−0.4			
29	+0.68	−1.6	(11) Parthenope.		
(3) Juno.			July 15	−3 ^m 32 ^s 5	−2' 36"
June 20	−0.24	+1.8	19	−3 31.6	−2 24
24	−0.29	−0.4	21	−3 30.9	−2 15
			31	−3 22.4	−1 37

Columbus, Ohio, 1911 Febr. 23.

E. S. Manson, Jr.

Nota sugli O—C di (674) Rachele in A. N. 186.108.

Il prof. *E. Bianchi* che cura l'orbita di (674) Rachele mi pregò di rivedere gli O—C da me pubblicati in A. N. 186.108, ed aderendo alla preghiera di lui, trovai che nel fare il paragone delle osservazioni coll'effemeride commisi la svista di non tener conto del tempo di aberrazione. Pertanto gli O—C corretti sono:

1910	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1910	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Marz. 4	+9 ^s 51	−66"8	Marz. 8	+9 ^s 76	−66"7
5	+9.65	−68.3	8	+9.57	−67.1
6	+9.50	−67.2	9	+9.68	−66.6
7	+9.47	−69.3	9	+9.50	−66.8

Arcetri-Firenze, 1911 Maggio.

A. Abetti.

Mitteilungen zur Bonner Durchmusterung.

Sur une plaque photographiée le 30 Décembre 1907 contenant au moins les étoiles de 12^{me} grandeur +16°354 est invisible. Une étoile de grandeur 10^m5 environ correspondrait à peu près à +16°354 −10' en déclinaison.

+16°360 aussi est invisible; il n'y a aucune étoile dans un rayon de 5' autour de la position indiquée. Si on suppose une erreur on ne voit pas quelle étoile a pu être observée.

Observatoire de Zô-sè, 1911 Mai 21.

Stanislas Chevalier, S. J.

Hierzu bemerkt Herr Prof. *F. Küstner*:

Die Bemerkungen des Herrn *Chevalier* habe ich an Hand der Originale der BD eingehend geprüft und gefunden, daß zu einer Korrektur der BD keinerlei Anlaß vorliegt.

Insbesondere sind auch die beiden Sterne +16°354 und +16°360 durch je zwei zweifelsfreie Sucherbeobachtungen in BD gesichert; +16°360 kommt außerdem auf *Hind's* Karte als 10^m vor.

Ich fürchte, daß dieses gelegentliche Vermissten schwacher BD-Sterne auf photographischen Aufnahmen uns noch sehr viele, und in den meisten Fällen fruchtlose, Mühe bereiten wird. Die betreffenden Beobachter sollten zum mindesten selbst möglichst bald die Himmelsgegend optisch nachsehen und zwar an einem nicht zu großen Fernrohr und mit schwacher Vergrößerung (am besten an dem Sucher des photographischen Refraktors, wenn der Sucher nicht zu klein und schlecht ist). Erst wenn sie dann die BD-Sterne nicht auffinden und identifizieren können, ist es Zeit Anzeige zu machen. — Die optischen und die photographischen Größen sind doch in vielen Fällen zu verschieden; dazu