5-prozentige Palladiumlösung liefert mit Morphin hellbraune, büschelförmige, garbenartige Kristalle, mit Kodein hellbraune, von einem kugelförmigen Kern ausgehende Kristallbündel und mit β -Eukain dunkelgelbe, warzige, sich kreuzende Nadelchen.

10-prozentige Platinchloridlösung wirkt ein auf Kokaïn, Nikotin, β -Eukain, Antipyrin, Strychnin und Heroin.

Mit Kokaïn erhält man sehr charakteristische, federartige Kristalle, welche den mit Nikotin erhaltenen ähnlich sind, jedoch sind letztere derber und grösser.

β -Eukain gibt blütenartig gruppierte Nadelchen, Antipyrin gelbe, stark verzweigte Kristallkonglomerate, Strychnin meisselförmige Kristalle oder büschelige Nadelchen und schliesslich Heroin zahlreiche feine Nadelchen, die aus einem orangegelben Mittelwürfel hervorgehen.

V. Atomgewichte der Elemente.

Von

A. Czapski.

Das Atomgewicht des Phosphors hat G. P. Baxter im Verein mit Ch. J. Moore¹⁾ einer weiteren Revision unterworfen.²⁾ Für die beiden bisherigen, diesen Gegenstand betreffenden Untersuchungen hatten Silberphosphat, Ag_3PO_4 , und Phosphortribromid, PBr_3 , als Ausgangsmaterial gedient. Weil der Prozentgehalt dieser beiden Verbindungen an Phosphor aber ein sehr geringer ist, und etwaige experimentelle Fehler infolgedessen auf das Endresultat einen grossen Einfluss ausüben konnten, wählten die Verfasser diesmal eine an Phosphor wesentlich reichere Verbindung, das Phosphortrichlorid PCl_3 , als Grundlage für ihre Studien.

Die Herstellung desselben geschah in analoger Weise wie die des Phosphortribromids. Reiner, trockener Phosphor wurde im Vakuum mit einem geringen Überschuss von reinem, trockenem Chlor behandelt und zwar in einem völlig aus Glas bestehenden, eigens für diesen Zweck konstruierten Apparat, betreffs dessen Beschreibung ich auf das Original verweise.

¹⁾ Zeitschrift f. anorg. Chemie **80**, 185.

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift **51**, 727 (1912).

Bei der Trennung des Phosphortrichlorids von dem mitgebildeten Phosphorpentachlorid stellten sich aber Schwierigkeiten heraus, die sich bei der Entfernung des Phosphorpentabromids aus dem Phosphortribromid nicht gezeigt hatten. Bei der unter vermindertem Luftdruck ausgeführten Destillation des Phosphortribromids zersetzt sich das ihm anhaftende Pentabromid fast vollkommen in Tribromid und Brom.

Bei der Reinigung des Phosphortrichlorids musste die fraktionierte Destillation angewendet werden, da sich anders eine vollkommene Trennung von dem Pentachlorid nicht erzielen liess.

Das reine Trichlorid wurde nun unter Anwendung aller nötigen Vorsichtsmaßregeln gewogen und zwar in zugeschmolzenen Kugeln aus Glas, in welche es nach vollkommener Reinigung hineindestilliert war.

Nachdem das Gewicht einer solchen Kugel mit dem darin enthaltenen Trichlorid festgestellt war, wurde sie zugleich mit 200 *ccm* frisch destilliertem Ammoniak und 10 *ccm* reinem, 30-prozentigem Wasserstoffsuperoxyd in einen Literkolben gegeben. Dann wurde auf etwa 60° erhitzt, der Kolben zugestopft und die Kugel, nach dem Abkühlen auf 0°, durch heftiges Schütteln zerbrochen. Die Reaktion ging auf diese Weise in aller Ruhe vor sich, und man konnte behufs Ermittlung des Gewichts der Glasteilchen zur Filtration der Lösung schreiten. Dieselben wurden auf einem kleinen Filter gesammelt, letzteres gut ausgewaschen, verascht und die Asche samt den Glasteilchen in einem Platintiegel gewogen. So ergab sich die Menge des angewandten Phosphortrichlorids.

In dem Filtrat, welches das gebildete Ammoniumchlorid enthielt, wurde das Chlor nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Fällung mit Silberlösung auf die übliche Weise bestimmt. Dabei konnte aber die Löslichkeit des Silberchlorids Fehlerquellen bedingen. Diesen begegneten Baxter und Moore, indem sie Silbernitrat im Überschuss hinzufügten und den Niederschlag teilweise mit Silbernitratlösung auswuschen. Was dann an Spuren Chlorsilber noch gelöst blieb, wurde mit Hilfe des Nephelometers bestimmt.

Auf diese Weise wurden 3 Reihen von Analysen ausgeführt; bei zweien wurde das Verhältnis von Phosphortrichlorid zu Silber, $\text{PCl}_3 : 3 \text{ Ag}$, und bei der dritten das Verhältnis von Phosphortrichlorid zu Silberchlorid, $\text{PCl}_3 : 3 \text{ AgCl}$, festgestellt. Als Mittel der Resultate der beiden ersten Reihen ergaben sich die Zahlen 31,017 und 31,016, und bei der dritten Reihe die Zahl 31,022 für das Atomgewicht des Phosphors.

Die Werte stimmen mit den aus der Analyse sowohl von Silberphosphat als auch von Silbertribromid erhaltenen sehr gut überein, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist.

	Ag = 107,880	Ag = 107,870	Ag = 107,860
Ag ₃ PO ₄	31,04	31,03	31,02
PBr ₃	31,027	31,024	31,021
PCl ₃	31,018	31,015	31,012
Mittel	31,028	31,023	31,018

Weil aber die durch Untersuchung von Silberphosphat erhaltenen Zahlen nicht den gleichen Anspruch auf Genauigkeit machen können, wie die aus der Untersuchung von Phosphortribromid und Phosphortrichlorid resultierenden, geben die Verfasser den Mitteln aus den letzteren, welche zu dem Wert 31,02 für das Atomgewicht des Phosphors führen, den Vorzug.

Das Atomgewicht des Eisens haben G. P. Baxter und Ch. R. Hoover¹⁾ neu bestimmt und zwar in Fortsetzung der früheren Arbeiten über diesen Gegenstand²⁾ auf Grund der Analyse von Ferrioxyd, welches sie zu metallischem Eisen reduzierten. Sie wandten zwei Arten Eisen, die eine irdischen, die andere meteorischen Ursprungs an. Beide Arten hatten schon bei den oben erwähnten Untersuchungen von Baxter, Thorvaldson und Cobb³⁾ und von Baxter und Thorvaldson⁴⁾ als Ausgangsmaterial gedient. Das irdische Eisen enthielt als Verunreinigungen Spuren Schwefel, Phosphor, Kohle, Silizium und Mangan. Ein Stück desselben wurde nach äusserer, sorgfältiger Reinigung in einer Platinschale in 50-prozentiger Salpetersäure teilweise gelöst. Die Lösung wurde, nach dem Abfiltrieren der unlöslichen Bestandteile, wie Kohle und basische Nitrate, in einer Quarzflasche bis zur Kristallisation eingengt und die Kristalle durch Zentrifugieren von der Mutterlauge getrennt. Die weitere Reinigung geschah durch mehrfache Kristallisation; die zuletzt erhaltenen Kristalle wurden durch vorsichtiges Glühen in einer Platinschale in ein Gemisch von Oxyd und basischem Nitrat übergeführt. Durch besonders angestellte Versuche mit absichtlich mit denselben Verunreinigungen versetztem Eisen, wie sie dem angewandten

¹⁾ Zeitschrift f. anorg. Chemie **80**, 201.

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift **41**, 393 (1902); **50**, 794 (1911); **51**, 79, 80 (1912).

³⁾ Vergl. diese Zeitschrift **51**, 79 (1912).

⁴⁾ Vergl. diese Zeitschrift **51**, 80 (1912).