φ_0	α'	$\log \sigma$ 20'	40'	α'	$\log \gamma$ bzw. γ 20'	40'	φ_0	α'	$\log \sigma$ 20'	40'	γ
45°	9.5229	9.5296	9.5362	9.5229	9.5195	9.5160	68°	9.8773	9.8809	9.8844	0.1231
46	.5428	.5494	.5559	.5125	.5090	.5054	69	.8878	.8912	.8946	.1138
47	.5624	.5688	.5751	.5017	.4980	.4942	70	9.8979	.9012	.9044	0.1047
48	.5814	.5877	.5939	.4903	.4864	.4824	71	.9076	.9107	.9138	.0958
49	.6001	.6062	.6123	.4784	.4743	.4702	72	.9168	.9198	.9227	.0872
50	9.6183	.6243	.6302	9.4659	.4616	.4573	73	.9256	.9284	.9312	.0787
51	.6361	.6419	.6477	.4528	.4483	.4438	74	.9339	.9365	.9392	.0706
52	.6535	.6592	.6648	.4391	.4344	.4296	75	9.9417			0.0628
53	.6705	.6760	.6816	.4247	.4197	.4147	76	.9491			.0553
54	.6870	.6925	.6979	.4096	.4043	.3990	77	.9560			.0482
55	9.7032	.7085	.7138	9.3937	.3882	.3826	78	.9624			.0414
56	.7190	.7241	.7293	.3770	.3712	.3653	79	.9684			.0351
57	.7344	.7394	.7444	.3594	.3533	.3472	80	9.9738			0.0293
58	.7493	.7543	.7591	.3409	.3346	.3281	81	.9787			.0239
59	.7639	.7687	.7735	.3215	.3148	.3080	82	.9832			.0190
60	9.7781	.7828	.7874	0.2000			83	.9871			.0146
61	.7919	.7965	.8009	.1903			84	.9905			.0108
62	.8054	.8097	.8141	.1806			85	9.9934			0.0075
63	.8184	.8226	.8268	.1709			86	.9958			.0048
64	.8310	.8351	.8392	.1612			87	.9976			.0027
65	9.8432	.8472	.8511	0.1515			88	.9989			.0012
66	.8550	.8588	.8626	.1419			89	.9997			.0003
67	.8664	.8701	.8737	.1324			90	0.0000			0.0000
68	.8773	.8809	.8844	.1231							

Wien, 1922 April 9.

N. Herz.

Zur Frage einer Atmosphäre des Sternenraumes. Von F. Wächter.

In der Zeitschrift »Sirius« habe ich in mehrfachen Publikationen¹⁾ darzulegen versucht, daß jene Einwände, welche man bisher gegen die Auffassung des Welt- oder Lichtäthers als eines allerdings sehr leichten, aber doch ponderablen Gases vorgebracht hat, nicht stichhaltig sind. Zugleich wies ich darauf hin, daß durch die Annahme eines ponderablen Äthers nicht nur die anormale Bewegung des Merkurperihels, die Ablenkung von Lichtstrahlen in der Nähe der Sonne und die Rotverschiebung der Spektrallinien in der denkbar einfachsten Weise — ohne Zuhilfenahme der Relativitätstheorie — erklärlich wären, sondern daß das Vorhandensein eines ponderablen Äthers auch für die Frage der Fixsternbewegungen von großer Bedeutung wäre.

Auch auf physikalischem und chemischem Gebiete²⁾ habe ich, teils auf Experimental-Untersuchungen gestützt, teils mit Hinweis auf die Erscheinung des »Hemmungspunktes« der Meteore das Vorhandensein eines ponderablen Äthers nachzuweisen mich bemüht. Da die Beantwortung der Frage: gibt es einen ponderablen Äther oder nicht?, sowohl für die Astronomie, wie auch für die Physik und Chemie unzweifelhaft von größter Tragweite wäre, so habe ich weiter versucht — nach Art der militär-ballistischen Berechnung des Luftwiderstandes — den Widerstand des Äthers gegen bewegte Weltkörper zu ermitteln. Da aber schon bei Artilleriegeschossen der Luftwiderstand nicht auf Grund theoretischer Voraussetzungen, sondern nur durch empirisch gefundene Zahlendaten ermittelt werden kann, so würde eine diesbezügliche, theoretische Berechnung des Ätherwiderstandes nur bei willkürlichen Voraussetzungen über die Beschaffenheit des Äthers möglich sein und daher kein Vertrauen erweckendes Resultat ergeben.

Nur der umgekehrte Weg würde ein maßgebendes Resultat erlangen lassen, nämlich aus einem gegebenen Ätherwiderstand die Beschaffenheit des Äthers abzuleiten. Ein solcher Ätherwiderstand scheint mir einzig und allein in jenem Teil der Mondakzeleration gegeben zu sein, welcher durch die Veränderlichkeit der Exzentrizität der Erdbahn nicht erklärlich ist und für welchen man andere Umstände, nach *Delaunay* die Verlangsamung der Erdrotation, herangezogen hat. Ich habe diesbezüglich schon vor dem Weltkriege in mündlicher Besprechung mit *F. K. Ginzl* eine neuerliche Durchrechnung der Mondakzeleration mit Rücksichtnahme auf einen eventuellen Ätherwiderstand durch das Astron. Recheninstitut in Berlin angeregt.

Da diese Arbeit leider nicht in Angriff genommen werden konnte, gestatte ich mir hiermit neuerdings eine Untersuchung der Mondakzeleration behufs Beantwortung der Frage, ob die Annahme eines ponderablen Äthers statthaft ist oder nicht, lebhaft zu empfehlen. Ich selbst kann diese Frage aus dem Grunde, auf astronomischem Gebiete, nicht näher untersuchen, da diese Aufgabe in meiner Eigenschaft als Physiker über meine Kräfte geht. Wohl aber glaube ich in den eingangs zitierten Publikationen nachgewiesen zu haben, daß auf physikalischem und chemischem Gebiete die Annahme eines ponderablen Äthers keinem nachweisbaren Widerspruch begegnet.

Bei dem großen, allgemeinen Interesse, welches die moderne Relativitätstheorie an der Frage nach dem Vorhandensein eines ponderablen Äthers wachgerufen hat und in Anbetracht des Umstandes, daß die Beantwortung dieser Frage auf Grund astronomischer Beobachtungen ebenso große Wichtigkeit hat,

¹⁾ Sirius 1921 p. 71; 1922 p. 27, 41, 70 und 79.

²⁾ Die Naturwissenschaften 1921 p. 250. — Zeitschrift f. Anorg. Chemie 1922, Aprilheft. — Zeitschrift f. techn. Physik.

ob die Antwort »ja« oder »nein« lautet, hege ich die Hoffnung, daß sich vielleicht ein Leser der Astronomischen Nachrichten bewegen fühlen wird, diese in jedem Falle lohnende Arbeit in Angriff zu nehmen. Es sei noch beigelegt, daß die 8 großen Pla-

neten überhaupt keinen Ätherwiderstand erleiden können, wie ich in Hest 4 des Sirius von 1921 ausreichend begründet zu haben glaube.

Treibach-Althofen in Kärnten, 1922 April. *F. Wächter.*

Über die Dissoziationsfähigkeit des Wasserstoffs in der Chromosphäre.

Es ist eine sehr verbreitete Ansicht, daß der Wasserstoff in der Chromosphäre dissoziiert sein könne oder sogar müsse. In Zeitschr. f. Anorg. Chem. 106.191 (1919) spricht dagegen *H. Teudt* dem Wasserstoffatom für sich allein, weil es nur ein einziges Elektron enthält, wegen seiner Unsymmetrie die Existenzfähigkeit ab. Erst wenn zwei Atome sich zu einem Molekül verbänden, entstehe ein symmetrisches und existenzfähiges Gebilde dadurch, daß die beiden Elektronen als Valenzelektronen zwischen die Atome treten. Im folgenden Element, Helium, umkreisen zwei Elektronen den Atomkern, könnten sich symmetrisch einstellen, und das Atom sei daher existenzfähig. Das Heliumatom dürfe aber, um nicht unsymmetrisch und damit existenzunfähig zu werden, kein Valenzelektron abgeben, mit dessen Hilfe es sich mit einem anderen Atom zu einem Molekül verbinden könnte. Die hier entwickelte Ansicht hätte großes astrophysikalisches Interesse, wenn sie richtig wäre. Denn wenn das Wasserstoffatom für sich allein nicht existenzfähig wäre, so könnte in der Chromosphäre kein dissoziierter Wasserstoff existieren. Es drängt sich nun aber die Frage auf, warum nicht nur das Helium, sondern auch die anderen Edelgase keine Valenzelektronen abgeben können? Warum könnte nicht zum Beispiel das Argon zwei von seinen 18 Elektronen abgeben? Die übrigen 16 könnten ja ein symmetrisches und deshalb (nach der Meinung *Teudts*)

existenzfähiges Gebilde geben. Doch das geschieht nicht; also ist die Symmetriefrage dabei gar nicht ausschlaggebend. *Teudt* selbst spricht in demselben Artikel von inneren Elektronen, die sehr stark vom Kern angezogen werden, und von äußeren, weniger stark angezogenen. Zum Beispiel von den 16 Elektronen des Schwefels können nur sechs als Valenzelektronen abgetrennt werden; die übrigen haften zu fest am Kern. Die Edelgase können gar keine Valenzelektronen abgeben. Es kommt also nur die Kraft, mit welcher die Elektronen vom Kern angezogen werden, in Frage. Wenn aber die Atome der Edelgase gar nicht der Symmetrie ihre Existenzfähigkeit zu verdanken haben, so kann man dasselbe auch vom Wasserstoff annehmen. Und warum sollte ein System, in dem ein einziges Elektron um einen positiven Kern rotiert, nicht existenzfähig sein, ebenso wie das unsymmetrische System Erde-Mond vollkommen existenzfähig ist? Wenn um einen positiven Kern zwei oder mehrere Elektronen rotieren, so werden letztere, dank der gegenseitigen Abstoßung, symmetrisch sich zu verteilen suchen. Wenn aber nur ein einziges Elektron um den positiven Kern rotiert, so ist gar keine Ursache vorhanden, weshalb das System symmetrisch zu sein bestrebt wäre (selbst wenn eine Symmetrie möglich wäre). Auf Grund des Gesagten halte ich die Einwände gegen die Existenzmöglichkeit von dissoziiertem Wasserstoff für nicht überzeugend.

Dorpat, 1922 März 5.

W. Anderson.

Elemente des Planeten 1921 JV.

Die Elemente des Planeten 1921 JV sind in einem im vergangenen Wintersemester abgehaltenen astronomischen Seminar von den Herren *F. Becker, K. Heinemann, W. Malsch, Dr. M. Mündler* und *Dr. K. Reinmuth* berechnet worden. Sie sind das Ergebnis einer Bahnverbesserung nach der Methode der Variation der geozentrischen Distanzen und beruhen auf vier aus der Gesamtheit der vorliegenden Beobachtungen gebildeten Normalörter (1921 Aug. 8, Sept. 5, 30, Okt. 25). Die Parallaxe ist berücksichtigt.

Elemente:

Epoche = 1921 Aug. 8.5 m. Z. Gr.

$M = 28^{\circ} 27' 23''.8$

$\omega = 280 \quad 3 \quad 35.3$

$\Omega = 352 \quad 24 \quad 13.3$ } 1921.0

$i = 10 \quad 40 \quad 9.2$

$\varphi = 16 \quad 54 \quad 37.4$

$\mu = 849''.786$

$\log a = 0.413798$

Die Darstellung der Beobachtungen ist folgende:

Heidelberg-Königstuhl, 1922 März.

1921 Aug. 5	$\Delta\alpha = -0''.44$	$\Delta\delta = +0''.5$
» 8	-0.02	$+0.5$
» 30	-0.04	-1.5
» 31	$+0.24$	$+0.1$
Sept. 1	$+0.23$	-0.8
» 5	-0.07	$+1.3$
» 7	-0.23	-0.2
» 8	$+0.24$	-4.2
» 25	-0.11	-1.8
» 27	-0.18	-1.4
» 30	$+0.21$	-1.7
Okt. 5	-0.03	$+4.6$
» 25	-0.14	$+2.2$
» 25	-0.21	$+1.5$

Die Beobachtungen sind sämtlich an der Königstuhl-sternearte erhalten; Aug. 5 (in α unsicher) und Okt. 25 sind photographische, die übrigen visuelle Örter. Verschiedene Versuche, die Normalörter etwa bis auf die Bogensekunde darzustellen, führten zu keinem befriedigenden Resultat.

A. Kopff.

Inhalt zu Nr. 5183. *P. Hügeler.* Über die Bewegungen der Sterne 11. Größe. 421. — *N. Herz.* Zur Theorie der ausgleichenden und flächentreuen Kartendarstellungen. 427. — *F. Wächter.* Zur Frage einer Atmosphäre des Sternerraumes. 433. — *W. Anderson.* Über die Dissoziationsfähigkeit des Wasserstoffs in der Chromosphäre. 435. — *A. Kopff.* Elemente des Planeten 1921 JV. 435.