SUI FASCI DI CUBICHE A MODULO COSTANTE.

Memoria di **Oscar Chisini** (Bologna).

Adunanza del 13 febbraio 1916.

§ 1.

Introduzione.

Come è noto, da un punto O di una cubica piana

$$f_3 = 0$$

escono quattro tangenti alla cubica stessa, il cui birapporto, chiamato *modulo* della cubica, resta costante qualunque sia la posizione assunta dal punto O . Se α è uno dei sei valori che può assumere questo birapporto (dipendentemente dall'ordine in cui si prendono le quattro tangenti), l'espressione

$$J = \frac{4(1 - \alpha + \alpha^2)^3}{(\alpha + 1)^2(1 - 2\alpha)^2(2 - \alpha)^2},$$

che è razionale nei coefficienti della quaterna di tangenti e indipendente dalla posizione del punto O , riesce anche razionale nei coefficienti della cubica f_3 : essa costituisce un invariante della forma f_3 , anzi l'unico invariante assoluto.

Espresso per i coefficienti di f_3 , l'invariante J è una funzione razionale del dodicesimo grado del tipo

$$J = \frac{S^3}{T^2}$$

dove S e T sono due invarianti (relativi) rispettivamente del quarto e del sesto grado.

L'eguaglianza

$$S = 0, \quad \text{cioè} \quad J = 0,$$

esprime che la cubica f_3 è equianarmonica, cioè che tale è la quaterna di tangenti uscenti da un suo punto O ; invece

$$T = 0, \quad \text{cioè} \quad J = \infty,$$

esprime che la cubica è armonica, cioè che tale è la quaterna delle suddette tangenti; infine

$$S^3 - T^2 = 0, \quad \text{cioè} \quad J = 1$$

esprime che la cubica ha un punto doppio.

Poichè — come abbiamo ricordato — J contiene al dodicesimo grado i coefficienti della cubica $f_3 = 0$, così in ogni fascio vi sono 12 cubiche per cui l'invariante J ha un valore, generico, assegnato: ve ne sono invece solo 4 delle equianarmoniche e 6 delle armoniche, ciascuna delle quali conta rispettivamente tre e due volte nel gruppo delle 12 cubiche per cui l'invariante ha il valore $J = 0$ e $J = \infty$.

Ora facili esempi mostrano l'esistenza di fasci di cubiche di ugual modulo, e quindi di ugual invariante, per cui l'equazione $J = K$ riesce identicamente soddisfatta: tali sono i fasci di cubiche con un punto base doppio, oppure i fasci

$$y^2 - \lambda \{(x - a)(x - b)(x - c)\} = 0,$$

nei quali sono fisse le tangenti che partono dal punto all'infinito dell'asse y . Un esempio più notevole e riposto di fasci di cubiche a modulo costante fu incontrato da S. KANTOR nell'esame delle proiettività che lasciano fermo un fascio di cubiche ¹⁾. Egli osserva che, data una proiettività ω , ciclica del terz'ordine, di punti uniti A, B, C , le cubiche passanti per A, B, C , tangenti ivi alle rette AB, BC, CA , e passanti ulteriormente per i tre punti P, Q, R di un ciclo di ω , formano un fascio di cubiche tutte invarianti per la ω , le quali risultano equianarmoniche, essendo — come è noto — proprietà caratteristica di una cubica equianarmonica restare invariata per una proiettività ciclica del terz'ordine coi punti uniti sulla cubica stessa ²⁾.

Ma questi fasci rientrano come casi particolari in famiglie più generali di fasci di cubiche a modulo costante, la cui esistenza è messa in luce anche da un facile computo di costanti che riesce più chiaro col linguaggio della geometria astratta.

Le cubiche del piano costituiscono i punti di un S_9 le cui rette rappresentano i fasci di cubiche; le cubiche di dato invariante (generico) formano una varietà V_8^{12} del dodicesimo grado: le rette del S_9 essendo ∞^6 , e occorrendo 13 condizioni perchè una retta appartenga alla V_8^{12} , si vede che esistono almeno ∞^3 fasci di cubiche per cui l'invariante ha un valore assegnato; analogamente, poichè le cubiche equianarmoniche formano una V_8^4 (trippla) e le armoniche una V_8^6 (doppia) esisteranno (almeno) ∞^{11} fasci di cubiche equianarmoniche e ∞^9 fasci di cubiche armoniche.

Ora è scopo di questo lavoro la determinazione di tutti i fasci le cui cubiche hanno un medesimo invariante (o un medesimo modulo) il cui valore sia diverso da uno: la costruzione dei fasci di cubiche di invariante 1 riesce immediata poichè tali cubiche — per un noto teorema di BERTINI — devono avere un punto doppio fisso ovvero una parte fissa.

Al risultato richiesto si arriva nel seguente modo.

Si osserva dapprima come a un fascio di cubiche di modulo costante corrisponda

¹⁾ S. KANTOR, *Premiers fondements pour une théorie des transformations périodiques univoques* [Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Società Reale di Napoli), serie II, vol. I (1888), n° 7], pp. 6, 9.

²⁾ A proposito di un fascio più generale di cubiche equianarmoniche che KANTOR avrebbe incontrato Cfr. più oltre, § 8, Nota I

un fascio di rette e una quartica segata da queste rette secondo quaterne di punti aventi il medesimo birapporto, e viceversa; si costruiscono poi tutte le quartiche siffatte.

Così, attraverso la considerazione di queste quartiche, si arriva a riconoscere che i fasci di cubiche a modulo (generico) costante sono ∞^8 (anzichè ∞^3 come si era desunto col computo di costanti precedente); sono invece esattamente ∞^9 i fasci di cubiche armoniche e ∞^{11} quelli di cubiche equianarmoniche.

I fasci di cubiche a modulo (generico) costante si dividono in due famiglie distinte, entrambe della medesima dimensione: i fasci della prima famiglia si ottengono prendendo due coniche K_1 e K_2 bitangenti e le tangenti comuni t_1 e t_2 , combinando poi linearmente le due cubiche $K_1 + t_1$ e $K_2 + t_2$; i fasci della seconda famiglia si ottengono invece combinando una cubica degenerare in tre rette per un punto con una seconda cubica spezzata in una retta semplice passante per quel punto e in una retta doppia.

I fasci di cubiche equianarmoniche formano un'unica famiglia. Il tipo generale è costituito dal fascio in cui le dodici cubiche dotate di punto doppio si riducono a sei cubiche cuspidate, le cui cuspidi cadon fuori dei nove punti base. Ogni altro fascio di cubiche equianarmoniche rientra in questo come caso particolare: per esempio il fascio costruito da KANTOR (che costituisce l'unico fascio di cubiche invarianti per un'omografia ciclica del terz'ordine coi punti uniti giacenti sulle cubiche del fascio) si ottiene facendo divenire a coppie infinitamente vicine le 6 cubiche cuspidate: si ha così un fascio in cui vi sono tre cubiche dotate di tacnodo in un punto base del fascio (le tangenti tacnodali non essendo tangenti fisse per le curve del fascio). La costruzione dei fasci di cubiche equianarmoniche, così caratterizzati, può essere ottenuta indirettamente attraverso la quartica segata dalle rette di un fascio secondo quaterne equianarmoniche, di cui è data appunto l'equazione nel § 5.

I fasci di cubiche armoniche costituiscono tre famiglie distinte, tutte di ugual dimensione 9. I fasci della prima famiglia sono caratterizzati dal possedere quattro cubiche dotate di tacnodo (fuori dei punti base); quelli della seconda famiglia dal possedere due cubiche dotate di tacnodo (fuori dei punti base) e due dotate di cuspidi nei punti base (la tangente cuspidale essendo diversa dalla tangente fissa che ivi hanno le curve del fascio); infine i fasci della terza famiglia sono caratterizzati dal possedere quattro cubiche dotate di cuspidi nei punti base (la tangente cuspidale essendo diversa dalla tangente fissa). Ogni altro fascio di cubiche armoniche rientra in uno di questi come caso particolare, quando alcune delle cubiche singolari riescano fra loro infinitamente vicine: vanno segnalati i fasci di cubiche armoniche, ciascuna delle quali è invariante per una medesima omografia ciclica del quart'ordine, i quali sono ∞^8 e rientrano come casi particolari nei fasci della seconda famiglia. Anche nel caso delle cubiche armoniche, come per i fasci di cubiche equianarmoniche, la costruzione effettiva si può ottenere attraverso la corrispondente quartica, di cui appunto sono indicate le equazioni nel § 6.

Ed ora converrà dare un *rapido cenno del contenuto dei paragrafi successivi*.

Nel § 2 si mostra come il problema di determinare i fasci di cubiche a modulo costante si riduca a quello di costruire le quartiche segate dalle rette di un fascio O secondo quaterne le quali abbiano tutte un medesimo birapporto.

I paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, sono dedicati appunto alla costruzione di queste quartiche. Precisamente:

nel § 3 si danno le proposizioni fondamentali per il resto dell'analisi, cioè si determinano le singolarità della quartica nei punti di contatto con le tangenti uscenti da O ;

nei paragrafi 4, 5, 6 si costruiscono le quartiche segate secondo quaterne a birapporto costante dalle rette di un fascio il cui sostegno sia esterno alla quartica stessa, nel n° 4 si esamina il caso che il birapporto abbia un valore generico, nei n° 5, 6 i casi equianarmonico ed armonico;

nel § 7 si studia il caso, lasciato da parte nei tre paragrafi precedenti, che il centro del fascio, O , venga a cadere sulla quartica.

Infine nel § 8 si ritorna alla considerazione dei fasci di cubiche a modulo costante, che vengono determinati in base ai risultati dei paragrafi precedenti; e, in due note a termine del paragrafo, vengono costruiti direttamente i fasci di cubiche equianarmoniche ed armoniche che sono caratterizzati dall'esistenza di omografie cicliche che lascian ferma ciascuna curva del fascio.

§ 2.

Riduzione dei fasci di cubiche alla g_4^1 segata su una quartica da un fascio di raggi.

Cominciamo col dimostrare che a un fascio di cubiche, aventi un modulo costante α , corrisponde un fascio di raggi i quali segano una quartica f_4 (la quale non può mai essere degenerare in quattro rette per un punto) secondo quaterne di punti il cui birapporto ha il valore α , e che viceversa ogni fascio di raggi e quartica siffatti danno origine a un fascio di cubiche di ugual modulo.

Ciò discende immediatamente dal fatto che ogni fascio di cubiche appartiene a una rete di cubiche con sette punti base la quale definisce un piano doppio razionale con quartica di diramazione (non degenerare in quattro rette per un punto), e che, viceversa, come è ben noto, ogni quartica (non degenerare in quattro rette per un punto) è sempre quartica di diramazione per un piano doppio siffatto (CLEBSCH). Ma conviene chiarire la cosa.

Si consideri la rete delle cubiche per 7 punti base:

Poniamo
$$\lambda_1 \varphi_1(x_1 x_2 x_3) + \lambda_2 \varphi_2(x_1 x_2 x_3) + \lambda_3 \varphi_3(x_1 x_2 x_3) = 0.$$

$$(1) \quad \begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1 x_2 x_3), \\ y_2 = \varphi_2(x_1 x_2 x_3), \\ y_3 = \varphi_3(x_1 x_2 x_3); \end{cases}$$

resta così definita una trasformazione tra il piano (x) e il piano (y) tale che ad ogni punto Y del piano (y) corrispondono due punti X_1, X_2 del piano (x) , punti che sono definiti come gli altri due punti base del fascio di cubiche omologhe al fascio di rette per Y ; pertanto le relazioni (1) diconsi definire un piano doppio (y) . I due punti X_1 e X_2 , omologhi del punto Y , coincideranno in un unico punto X se le cubiche del suddetto fascio risultano tangenti fra loro in X . Il luogo dei punti Y , cui corrispondono due X coincidenti, costituisce la linea di diramazione del piano doppio (y) . È facile riconoscere che tale linea è una quartica: infatti ad una retta a del piano (y) corrisponde una cubica φ della rete, e su questa le altre cubiche della rete segano una involuzione g_2^1 di coppie di punti la quale ha precisamente quattro punti uniti corrispondenti alle intersezioni della retta a con la linea di diramazione: la quale risulta quindi una quartica. Per di più il birapporto dei quattro punti intersezioni della a con la quartica di diramazione è uguale al modulo della cubica φ .

Sia infatti $\mu_0 \bar{\varphi}_0 + \mu_1 \bar{\varphi}_1$ uno dei fasci, appartenenti alla nostra rete di cubiche, il quale non contenga la φ ; la g_2^1 segata dalle curve della rete sulla φ è la g_2^1 segata sulla φ stessa dal fascio $\mu_0 \bar{\varphi}_0 + \mu_1 \bar{\varphi}_1$; alle cubiche di questo corrispondono, proiettivamente, le rette del piano (y) passanti per un punto O , e alle cubiche tangenti alla φ le rette che congiungono O coi quattro punti comuni alla retta a e alla quartica di diramazione.

Pertanto il birapporto dei suddetti quattro punti è uguale al birapporto dei valori di μ_1 che definiscono le cubiche tangenti alla φ ; ma questo birapporto, come è ben noto, è uguale a quello delle quattro tangenti condotte alla φ da un suo punto qualunque, cioè al modulo della cubica φ ; dal che segue l'enunciato.

Con ciò risulta chiaro come le cubiche di un fascio, aventi un modulo costante α , diano origine alle rette di un fascio seganti, secondo quaterne di birapporto α , una quartica f_4 , la quale è quartica di diramazione del piano doppio definito dalle cubiche che passano per sette fra i nove punti base del fascio dato.

Per riconoscere l'inversa, osserviamo anzitutto che il piano doppio definito dalle cubiche per sette punti può considerarsi come proiezione di una superficie cubica (fatta da un punto della superficie stessa) le cui sezioni piane sono rappresentate dalle cubiche passanti per sei fra i sette punti base suddetti, sicchè la quartica di diramazione f_4 appare come contorno apparente della superficie cubica vista da un suo punto.

Ciò posto ricordiamo che ogni quartica è contorno apparente di una superficie cubica, la quale si riduce a un cono nel caso che la quartica degeneri in quattro rette per un punto.

Poichè, escluso il cono, ogni superficie cubica è razionale e può rappresentarsi col sistema delle cubiche passanti per sei punti base, si deduce che ogni quartica — non degenerare in quattro rette per un punto — è quartica di diramazione per un piano doppio del tipo considerato, e pertanto le rette di un fascio che la seghino secondo quaterne di birapporto α rappresentano cubiche di un fascio aventi il modulo costante α .

E da quanto precede risulta anche come la nostra quartica f_4 non possa mai ridursi a quattro rette per un punto.

§ 3.

Proposizioni fondamentali.

Ora dobbiamo esaminare quando un fascio di rette intersechi una quartica piana $f_4 = 0$ secondo quaterne di punti a birapporto, e quindi ad invariante, fisso.

Osserviamo anzitutto che se i gruppi G_4 della serie lineare g_4^1 segata sulla quartica f_4 dalle rette per un punto O hanno tutti l'invariante $J = 1$, allora: o il punto O è doppio per la f_4 , o questa ha una parte doppia, e viceversa.

Convorrà inoltre notare che il birapporto, e quindi l'invariante J , di una quaterna è indeterminato se questa ha punto triplo (o quadruplo) e solo allora: pertanto si ha una g_4^1 i cui gruppi hanno un invariante indeterminato se la f_4 passa triplamente per O , o se contiene una parte contata tre volte.

Esauriti così i casi in cui l'invariante J sia indeterminato o abbia il valore fisso $J = 1$, dovremo occuparci esclusivamente delle g_4^1 i cui gruppi G_4 abbiano un invariante fisso ma determinato e diverso da uno: resta così escluso che O sia punto doppio (o multiplo) per f_4 e che la f_4 stessa possenga parti da contarsi più di una volta.

Per quanto abbiamo osservato sopra i fasci di cubiche, nella g_4^1 segata sopra una quartica dalle rette passanti per un punto O vi devono essere 12 gruppi per cui l'invariante ha un valore (generico) assegnato, 6 gruppi armonici ($J = \infty$) e 4 gruppi equianarmonici ($J = 0$). Ma — senza ricorrere alla considerazione dei fasci di cubiche — questo fatto si può dedurre direttamente ove si ricordi che l'invariante di una quaterna di punti (il cui birapporto sia uguale ad α) si può esprimere nella forma

$$J = \frac{4(1 - \alpha + \alpha^2)^3}{(\alpha + 1)^2(1 - 2\alpha)^2(2 - \alpha)^2} = \frac{4i^3}{j^2}$$

dove $i = 0$, e $j = 0$ esprimono che la quaterna è armonica o equianarmonica, e dove $4i^3 - j^2 = 0$ esprime che la quaterna ha un punto doppio.

Infatti, poichè da un punto O qualsiasi del piano vanno alla quartica 12 tangenti, le quali segano appunto i gruppi G_4 dotati di un punto doppio, l'equazione

$$4i^3 - j^2 = 0, \quad (J = 1)$$

deve essere del dodicesimo grado nel parametro λ che individua il G_4 entro la g_4^1 , e quindi i e j devono contenere λ rispettivamente al sesto e al quarto grado.

Si consideri ora una quartica $f_4 = 0$ tale che il fascio delle rette passanti per un punto O seghi su di essa quaterne di punti aventi tutte un medesimo invariante di valore $K \neq 1$. Anche per questa g_4^1 particolare vi devono essere dei gruppi il cui inva-

riante J ha il valore 1: per questi J avendo contemporaneamente il valore K e il valore 1 deve risultare indeterminato. Ora, poichè il birapporto, e quindi l'invariante, di una quaterna non risulta mai indeterminato se questa non possiede un punto triplo, concludiamo:

I gruppi della g_4^1 che hanno un punto doppio hanno questo almeno come triplo o risultano indeterminati; quest'ultimo caso verificandosi ove la $f_4 = 0$ contenga come parte una retta passante per il punto O sostegno del fascio che sega la g_4^1 .

Veniamo ora ad una seconda osservazione che è fondamentale.

Sia λ_0 il valore del parametro λ , di una g_4^1 qualunque segata dalle rette di un fascio sopra una quartica, corrispondente ad un G_4 dotato di punto triplo: λ_0 sarà radice delle tre equazioni

$$\begin{aligned} J &= 0, & \text{cioè} & & i &= 0, \\ J &= 1, & \text{cioè} & & 4i^3 - j^2 &= 0, \\ J &= \infty, & \text{cioè} & & j &= 0, \end{aligned}$$

e se λ_0 è radice r -pla, con $r \leq 6$, di $J = 1$ esso è radice multipla secondo $\left[\frac{r}{3}\right]$ per $i = 0$ e secondo $\left[\frac{r}{2}\right]$ per $j = 0$, indicandosi con $\left[\frac{r}{3}\right]$ e $\left[\frac{r}{2}\right]$ il quoziente per eccesso di r diviso rispettivamente per 3 e per 2.

Se $r > 6$, ciò è ancora vero se i gruppi della g_4^1 hanno l'invariante J di un valore costante $K \neq 1$.

Per dimostrare ciò occorre escludere che, divisi $4i^3$ e j^2 per la massima potenza comune di $\lambda - \lambda_0$ la loro differenza dia una funzione $F(\lambda)$ che si annulli ancora per $\lambda = \lambda_0$, sì che l'equazione $J(\lambda) = 1$ abbia $\lambda = \lambda_0$ come radice multipla di un ordine superiore a quello con cui detta radice compare in una (almeno) delle due equazioni

$$J(\lambda) = 0, \quad J(\lambda) = \infty:$$

a prima vista sembra infatti possibile che $4i^3$ e j^2 siano divisibili solo per $(\lambda - \lambda_0)^6$ mentre sia ancora divisibile per $\lambda - \lambda_0$ la differenza

$$\frac{4i^3}{(\lambda - \lambda_0)^6} - \frac{j^2}{(\lambda - \lambda_0)^6}.$$

Per escludere questo basta osservare che in tale ipotesi sarebbe

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{4i^3}{j^2} = 1.$$

il che è assurdo supponendosi che per i gruppi della g_4^1 l'invariante J abbia il valore costante $K \neq 1$.

Ricordando che se un'equazione ammette una radice in più di quel che indichi il suo grado essa è identicamente soddisfatta, deduciamo dall'osservazione precedente che:

Se l'equazione $J = 1$ ammette anche una sola radice λ_0 di molteplicità r non di-

visibile per 3, la g_4^1 — qualora i suoi gruppi abbiano un medesimo invariante — risulta costituita tutta di gruppi equianarmonici; e analogamente risulta costituita tutta di gruppi armonici se l'equazione predetta ammette anche una sola radice λ_0 di molteplicità r non divisibile per 2.

Infatti se $r_1, r_2, \dots, r_s$ sono le molteplicità delle radici dell'equazione $J(\lambda) = 1$, si ha

$$r_1 + r_2 + \dots + r_s = 12$$

e quindi

$$\left[\frac{r_1}{3} \right] + \left[\frac{r_2}{3} \right] + \dots + \left[\frac{r_s}{3} \right] > 4$$

se qualcuno degli r non è divisibile per 3; e

$$\left[\frac{r_1}{2} \right] + \left[\frac{r_2}{2} \right] + \dots + \left[\frac{r_s}{2} \right] > 6$$

se qualcuno degli r non è divisibile per 2.

Ora, poichè i gruppi della g_4^1 dotati di punto doppio sono segati dalle tangenti (proprie od improprie) della f_4 che passano per O , possiamo riassumere i risultati ottenuti enunciando i tre teoremi per noi fondamentali:

TEOREMA I. — Data una quartica f_4 , se una retta uscente da un punto O ha con f_4 un contatto tripunto e assorbe $r \leq 6$ tangenti per O , il gruppo da essa segato conta come $\left[\frac{r}{3} \right]$ gruppi equianarmonici e $\left[\frac{r}{2} \right]$ gruppi armonici, indicandosi con $\left[\frac{r}{3} \right]$ e $\left[\frac{r}{2} \right]$ il quoziente per eccesso di r diviso per 3 e per 2: nel caso di $r = 6$ tale gruppo conta come 6 fra i gruppi aventi un invariante K prefissato.

TEOREMA II. — Se per i gruppi di una g_4^1 , segata sopra una quartica f_4 dalle rette uscenti da un punto O , l'invariante J ha un valore costante $K \neq 1$, allora le tangenti (proprie od improprie) passanti per O hanno con f_4 un contatto tripunto (almeno), e ciascuna di esse conta — nel gruppo delle 12 tangenti che da ogni punto vanno ad una quartica — un numero di volte multiplo di 2 se $K \neq 0$, multiplo di 3 se $K \neq \infty$, e multiplo di 6 se contemporaneamente $K \neq 0$ e $K \neq \infty$.

TEOREMA III. — Se la g_4^1 segata sopra una quartica dalle rette di un fascio possiede più di 4 gruppi equianarmonici, o più di 6 gruppi armonici o, infine, più di 12 gruppi il cui invariante J abbia un certo valore K (debitamente computandosi le soluzioni multiple) allora la g_4^1 è costituita di gruppi aventi tutti un medesimo invariante (equianarmonici od armonici nei primi due casi).

I teoremi precedenti permettono di determinare e di costruire tutti i tipi di quartiche sulle quali le rette di un fascio, O , seghino una g_4^1 i cui gruppi hanno un birapporto costante: occorre però sapere — corrispondentemente alle varie singolarità che può presentare una quartica — quante tangenti siano assorbite da una retta per O secondo la natura del suo contatto, che nel nostro caso è sempre almeno tripunto.

Diamo qui un elenco di tutti i casi che possono presentarsi nel nostro problema nel quale si suppone che la curva f_4 non abbia parti multiple e non passi doppiamente per O , indicando quale sia, in ciascuno di essi, la molteplicità della tangente: tali molteplicità sono ben note e d'altra parte possono dedursi con facili verifiche analitiche ove si ricordi come le tangenti che da un punto O vanno ad una curva algebrica sono determinate dalle intersezioni di questa con la polare del punto O .

Indichiamo con C il punto di contatto, e consideriamo dapprima i due casi in cui C coincide con O .

1) Se C è un flesso ordinario, e coincide con O , la tangente in C assorbe 3 tangenti.

2) Se C è un flesso del second'ordine (la cui tangente cioè abbia un contatto quadripunto) e coincide con O , la tangente in C assorbe 4 tangenti.

In tutti i casi seguenti C è supposto distinto da O .

3) Se C è un flesso ordinario la retta OC assorbe 2 tangenti.

4) Se C è un flesso del second'ordine la retta OC assorbe 3 tangenti.

5) Se C è un punto doppio a tangenti distinte, e una di queste, a contatto bipunto col relativo ramo, coincide con la OC , la OC assorbe 3 tangenti.

6) Se C è un punto doppio a tangenti distinte e una di queste, a contatto tripunto col relativo ramo, coincide con la OC , la OC assorbe 4 tangenti.

7) Se C è una cuspid ordinaria e OC è la tangente cuspidale, OC assorbe 4 tangenti.

8) Se C è un tacnodo ordinario (due punti doppi infinitamente vicini) e OC è la tangente tacnodale, la OC assorbe 6 tangenti.

9) Se i due rami lineari della quartica che danno il tacnodo precedente vengono a riunirsi in un ramo del second'ordine, la OC assorbe 7 tangenti.

10) Se in C cadono tre punti doppi infinitamente vicini, essendo la quartica costituita di due rami lineari aventi un contatto tripunto fra loro e bipunto con la OC , la OC assorbe 8 tangenti.

11) Se i due rami di cui sopra vengono a coincidere in un unico ramo del second'ordine, la OC assorbe 9 tangenti.

12) Se in C cadono quattro punti doppi infinitamente vicini collocati sopra un ramo lineare tangente alla OC , la OC assorbe 10 tangenti.

13) Se C è un punto triplo le cui tre tangenti principali siano distinte fra loro e dalla OC , la OC assorbe 6 tangenti.

14) Se C è un punto triplo e due delle tre tangenti principali coincidono in una sola corrispondente a una cuspid ordinaria, restando la OC distinta dalle tangenti principali, la OC assorbe 7 tangenti.

15) Se C è un punto triplo e due delle tre tangenti principali coincidono in una sola corrispondente ad un tacnodo (la f_4 risulta composta di una cubica che ha un nodo in C e di una delle tangenti principali a detto nodo), restando la OC distinta dalle tangenti principali, OC assorbe 8 tangenti.

16) Se C è un punto triplo e le tre tangenti principali vengono a coincidere in una sola, distinta dalla OC , dando origine ad un ramo del terz'ordine, la OC assorbe 8 tangenti.

17) Se C è un punto triplo e le tre tangenti principali vengono a coincidere in una sola, distinta dalla OC , dando origine ad un ramo lineare e ad un ramo cuspidale, la OC assorbe 9 tangenti.

18) Se C è un punto triplo a tangenti distinte, e una di queste — senza far parte della f_4 — coincide con la OC , la OC assorbe 7 tangenti.

19) Se C è un punto triplo, e due delle tangenti coincidono in una sola diversa dalla OC , dando origine ad un ramo cuspidale, e la terza coincide con la OC (senza far parte della f_4), la OC assorbe 8 tangenti.

20) Se C è un punto triplo e due delle tangenti principali coincidono nella retta OC , dando origine ad un ramo cuspidale, la OC assorbe 8 tangenti.

21) Se C è un punto triplo e due delle tre tangenti principali coincidono dando origine ad un tacnodo, e se la terza tangente coincide con la retta OC (senza far parte della f_4), la OC assorbe 9 tangenti.

22) Se C è un punto triplo, e se le tre tangenti principali coincidono nella OC dando origine ad un ramo del terz'ordine, la OC assorbe 9 tangenti.

23) Se C è un punto quadruplo, e le quattro rette che vengono a formare la f_4 sono distinte fra loro e dalla OC , la OC assorbe 12 tangenti.

24) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua non è tangente alla OC , questa assorbe 6 tangenti.

25) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua è tangente (con contatto bipunto) alla OC , questa assorbe 7 tangenti.

26) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C un contatto tripunto con la OC , questa assorbe 8 tangenti.

27) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C un punto doppio a tangenti distinte fra loro e dalla OC , la OC assorbe 8 tangenti.

28) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C un punto doppio a tangenti distinte, e una di queste coincide con la OC (senza far parte della cubica) allora la OC assorbe 9 tangenti.

29) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C una cuspid ordinaria e la tangente cuspidale di questa è diversa dalla OC , allora la OC assorbe 9 tangenti.

30) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C una cuspid ordinaria di cui OC sia la tangente cuspidale, allora la OC assorbe 10 tangenti.

31) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C un tacnodo la cui tangente tacnodale sia distinta dalla OC , questa assorbe 10 tangenti.

32) Se la retta OC si stacca dalla quartica e la cubica residua ha in C un punto triplo, e le tre rette che la compongono sono distinte fra loro e dalla OC , questa assorbe 12 tangenti.

§ 4.

Caso del modulo generale.

Ora possiamo passare alla determinazione e alla costruzione delle g_4^1 , segate sopra una quartica dalle rette di un fascio, i cui gruppi abbiano un birapporto costante: costruiremo prima le g_4^1 prive di punti fissi poi (§ 7) quelle dotate di un punto fisso: in questo paragrafo esamineremo il caso in cui il valore costante del birapporto sia un valore generico.

Suppongasi adunque che la quartica $f_4 = 0$ sia segata dalle rette passanti per un punto O , ad essa esterno, secondo quaterne di punti il cui invariante abbia un valore fisso $K \neq 0$ e $\neq \infty$.

In virtù del Teorema II e dell'analisi precedentemente riportata possiamo dire che la $f_4 = 0$ possiede

- a) o due tacnodi le cui tangenti tacnodali passano per O ,
- b) o un tacnodo la cui tangente tacnodale passi per O e un punto triplo a tangenti distinte,
- c) o due punti tripli a tangenti distinte,
- d) o un punto quadruplo.

È evidente come i casi $b)$ e $c)$ non siano possibili, come risulta dalla considerazione della retta che congiunge, nel caso $b)$, il tacnodo al punto triplo e, nel caso $c)$, i due punti tripli fra loro.

Restano quindi come soli casi possibili il caso $a)$ e il caso $d)$.

$a)$ Se la quartica possiede due tacnodi C_1 e C_2 le cui tangenti tacnodali passino per O , essa si compone — evidentemente — di una coppia di coniche tangenti in C_1 e C_2 alle OC_1 e OC_2 , e pertanto è agevole costruire una quartica siffatta. Si dimostra facilmente che sopra una tale quartica le rette per O segano quaterne di punti il cui invariante ha un valore costante. Infatti se K è il valore dell'invariante J per una quaterna segata su f_4 da un certo raggio o passante per O e diverso da OC_1 e OC_2 , la g_4^1 segata dalle rette per O ha 13 gruppi il cui invariante ha il valore $K:6$ si riuniscono in ciascuno dei gruppi segati dai raggi OC_1 , OC_2 , e l'ultimo è dato dal raggio o .

Del resto di ciò si può avere una facile verifica diretta. Si prenda O come punto all'infinito dell'asse y , e $C_1 C_2$ come asse x : la quartica avrà allora l'equazione

$$\{y^2 - \alpha^2(x-a)(x-b)\}\{y^2 - \beta^2(x-a)(x-b)\} = 0$$

essendo $x = a$, e $x = b$ le ascisse di C_1 e C_2 . Con ciò le ordinate dei quattro punti segati da una retta per O , sono

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha \sqrt{(x-a)(x-b)}, \\ y_2 &= -\alpha \sqrt{(x-a)(x-b)}, \\ y_3 &= \beta \sqrt{(x-a)(x-b)}, \\ y_4 &= -\beta \sqrt{(x-a)(x-b)}, \end{aligned}$$

sicchè il birapporto di questi quattro punti ha il valore costante

$$\frac{\beta - \alpha}{\beta + \alpha} : \frac{\beta - \alpha}{\beta + \alpha}.$$

d) Se la quartica possiede un punto quadruplo C , riducendosi così a 4 rette per C , le rette per O segano evidentemente quaterne di punti il cui birapporto ha come valore costante il birapporto delle 4 rette per C . Converrà però ricordare come questa quartica non corrisponda ad un fascio di cubiche di modulo costante (Cfr. § 2).

§ 5.

Caso equianarmonico.

Ci proponiamo ora la determinazione e la costruzione di tutte le quartiche segate dai raggi di un fascio — il cui sostegno O non appartenga alla curva — secondo quaterne tutte equianarmoniche.

A tale oggetto faremo vedere:

a) Presa una cubica arbitraria $\varphi_3(x_1 x_2 x_3) = 0$, non passante per il punto $O = (001)$, la quartica

$$(1) \quad f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0$$

è segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche;

b) Ogni quartica — non passante per O — segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche ha un'equazione che rientra come caso particolare nella (1).

In fine del paragrafo determineremo le singolarità che assume la f_4 al variare della cubica arbitraria φ_3 .

Cominciamo dunque col dimostrare che, supposta φ_3 generica, la quartica

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0$$

è segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche.

Perciò osserviamo anzitutto che la polare del punto $O = (001)$ rispetto la f_4 è la cubica φ_3 ; infatti

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_3} = \frac{\partial^3 \varphi_3}{\partial x_3^3} \varphi_3$$

e — per ipotesi — $\frac{\partial^3 \varphi_3}{\partial x_3^3} \neq 0$ in quanto φ_3 non passa per il punto (001) .

Ciò posto indichiamo con $C_1 \dots C_6$ i 6 punti d'intersezione della cubica $\varphi_3 = 0$ con la conica (polare di O rispetto la φ_3) $\psi_2 = \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3}$: questi punti saranno distinti fra loro supponendosi φ_3 affatto generale. Si vede allora che la quartica f_4 passa per i punti $C_1 \dots C_6$, e che questi risultano flessi le cui tangenti sono le rette $OC_1 \dots OC_6$.

Infatti la retta OC_1 risulta tangente in C_1 alla cubica φ_3 , ed ha pertanto ivi due intersezioni riunite. Si consideri il gruppo G_4 sezione di f_4 con la retta OC_1 : G_4 contiene C_1 , e il gruppo polare di O , rispetto al G_4 , contiene C_1 contato due volte, essendo φ_3 la polare di O rispetto f_4 : si deduce — in base a noti teoremi sui gruppi polari — che il G_4 contiene C_1 come triplo. Osservando che la retta OC_1 , come le analoghe $OC_2 \dots OC_6$, non può assorbire più di due fra le 12 tangenti che da O vanno alla f_4 , si deduce che il punto C_1 (e così gli altri $C_2 \dots C_6$) in cui la retta OC_1 ha tre intersezioni con la f_4 , è precisamente un flesso (ordinario) di cui OC_1 è la tangente di flesso.

Che poi le quaterne segate dalle rette per O siano tutte equianarmoniche, risulta subito dai nostri teoremi, osservando che tali sono le 6 quaterne segate dalle rette $OC_1 \dots OC_6$.

Stabilito così che la quartica

$$(1) \quad f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2$$

è segata secondo quaterne equianarmoniche dalle rette per $O = (001)$ quando $\varphi_3 = 0$ è una cubica generica, si può — in virtù della legge di continuità — concludere che ogni quartica che abbia un'equazione del tipo (1) è effettivamente segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche e ciò qualunque sia la cubica φ_3 .

Dobbiamo ora dimostrare che — reciprocamente — ogni quartica segata dalle rette per $O = (001)$ secondo quaterne equianarmoniche (non aventi però in O un punto fisso) è rappresentata da un'equazione del tipo

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2.$$

Perciò conviene premettere il

LEMMA. — *Se due quaterne di punti*

$$\varphi_4(x_1, x_2) = a_0 x_1^4 + a_1 x_1^3 x_2 + a_2 x_1^2 x_2^2 + a_3 x_1 x_2^3 + a_4 x_2^4 = 0,$$

$$\psi_4(x_1, x_2) = b_0 x_1^4 + b_1 x_1^3 x_2 + b_2 x_1^2 x_2^2 + b_3 x_1 x_2^3 + b_4 x_2^4 = 0$$

sono equianarmoniche e le terne polari di un punto $O = (01)$ che non appartenga a nessuna di esse coincidono, allora anche le quaterne coincidono.

Infatti, essendo le due terne polari rappresentate da

$$a_1 x_1^3 + 2 a_2 x_1^2 x_2 + 3 a_3 x_1 x_2^2 + 4 a_4 x_2^3 = 0,$$

$$b_1 x_1^3 + 2 b_2 x_1^2 x_2 + 3 b_3 x_1 x_2^2 + 4 b_4 x_2^3 = 0,$$

si deduce anzitutto

$$a_1 = \rho b_1, \quad a_2 = \rho b_2, \quad a_3 = \rho b_3, \quad a_4 = \rho b_4$$

dove ρ è un coefficiente di proporzionalità diverso da zero.

Essendo poi le due quaterne equianarmoniche, sarà ³⁾

$$a_2^2 - 3a_1a_2 + 12a_0a_4 = 0,$$

$$b_2^2 - 3b_1b_2 + 12b_0b_4 = 0$$

e da queste due uguaglianze, tenuto conto delle quattro precedenti, risulta

$$a_0 = \rho b_0,$$

col che resta dimostrato che le due quaterne $\varphi_4 = 0$, e $\psi_4 = 0$ coincidono essendo $\varphi_4 \equiv \rho \psi_4$.

Ciò posto sia $f_4 = 0$ l'equazione di una quartica non passante per il punto $O = (001)$ e segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche.

Posto

$$\varphi_3 = \frac{\partial f_4}{\partial x_3}$$

la quartica

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0$$

non passa per O ed è segata dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche: inoltre le terne polari di O rispetto queste quaterne coincidono con le terne polari rispetto le quaterne segate sulla f_4 , essendo date dalle sezioni con la cubica φ_3 . In base al lemma precedente si ha dunque che le quaterne segate sulla f_4' coincidono con quelle segate sulla f_4 , e quindi — risultando le due quartiche identiche — resta dimostrato che la f_4 ha un'equazione del tipo 1).

Rimane così stabilito che — fissato un punto O — esistono ∞^2 quartiche $f_4 = 0$ segate dalle rette per O secondo quaterne equianarmoniche, dipendendo ciascuna dalla cubica polare di O :

Ora sarà utile, quantunque non necessario, esaminare quali singolarità acquisti la quartica f_4 col variare della cubica (sua polare) φ_3 .

Anzitutto si osservi che ove la φ_3 venisse a passare per il punto $O = (001)$, la f_4 assumerebbe in O un punto quadruplo: infatti in tale ipotesi

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_3} = \frac{\partial^3 \varphi_3}{\partial x_3^3} \varphi_3,$$

è identicamente nulla essendo

$$\frac{\partial^3 \varphi_3}{\partial x_3^3} = 0,$$

ed è noto che, condizione necessaria e sufficiente perchè svanisca la polare di un punto O rispetto ad una curva d'ordine n è che il punto O sia n -plo per la curva stessa. D'altra parte che O sia quadruplo per la f_4 può vedersi anche con una verifica analitica diretta.

³⁾ Cfr. F. ENRIQUES e O. CHISINI, *Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni*, vol. I (Bologna, Zanichelli, 1915), p. 29.

Escluso dunque che la cubica φ_3 venga a passare per il punto O , per esaminare cosa accada della quartica f_4 al variare della φ_3 , conviene distinguere i due generi di particolarizzazione che si hanno secondo che varia la posizione di O rispetto la φ_3 , o varia la φ_3 acquistando un punto doppio o altre singolarità.

1) Suppongasi che, variando la posizione relativa della cubica $\varphi_3 = 0$ e del punto O , questo venga a cadere sopra una tangente di flesso della φ_3 , la quale tuttavia resti una cubica generale. In tale ipotesi due punti C_1 e C_2 , intersezioni della cubica φ_3 con la conica ψ_2 — polare di O rispetto alla φ_3 — vengono a coincidere in un unico punto C , e pertanto vengono a coincidere nella OC le due rette OC_1 e OC_2 che erano tangenti di flesso per la quartica f_4 . Quale sarà il comportamento della f_4 nel punto C ? Per determinarlo osserviamo che la retta OC ha un contatto tripunto con la cubica φ_3 (che è la polare di O rispetto la f_4) e quindi ha — pure in C — quattro intersezioni riunite con la f_4 : inoltre la OC assorbe quattro tangenti e quindi, come risulta dall'analisi riprodotta nell'elenco del n° 3, C è un nodo di cui un ramo ha come tangente di flesso la OC .

2) Suppongasi ora che — O restando generico — la cubica φ_3 vari acquistando un punto doppio C : anche in questo caso due punti, C_1 e C_2 , intersezioni di φ_3 con la conica polare ψ_2 , vengono a coincidere nel punto C , e le due rette OC_1 , OC_2 , tangenti di flesso per la f_4 , si riuniscono nella retta OC . Questa retta ha in C due intersezioni riunite con la φ_3 e quindi tre con la f_4 ; d'altra parte essa assorbe 4 tangenti per O : pertanto, dall'esame del quadro dato nel n° 3 si deduce che il punto C è — per f_4 — una cuspide di cui OC è la tangente cuspidale.

3) Suppongasi che — essendo la φ_3 dotata di un nodo C — il punto O cada su una delle tangenti principali in C : in questo caso la retta OC ha con la f_4 quattro intersezioni riunite in C , e assorbe 6 tangenti: si deduce, come nei due casi precedenti, che C è per f_4 un tacnodo di cui OC è la tangente tacnodale.

4) Suppongasi che — restando O in posizione generica — la cubica φ_3 acquisti una cuspide C : in tale ipotesi la retta OC viene ad avere tre intersezioni riunite con la f_4 e assorbe 6 tangenti: si deduce che C è per f_4 un punto triplo le cui tre tangenti sono distinte fra loro e dalla OC .

5) Suppongasi che — la cubica φ_3 essendo dotata di una cuspide C — il punto O venga a cadere sulla tangente cuspidale: in tale ipotesi la retta OC ha con f_4 quattro intersezioni riunite ed assorbe 8 tangenti.

Tenuto conto che questo caso è un caso limite del precedente, si ha anzitutto che C deve essere un punto triplo: dall'esame dell'elenco del paragrafo 3 si ricava poi che:

o C è un punto triplo di cui due delle tangenti coincidono in una sola diversa dalla OC dando origine ad un ramo cuspidale e la terza coincide con la OC (caso 19);
oppure C è un punto triplo e due delle tangenti principali coincidono nella retta OC dando origine ad un ramo cuspidale (caso 20).

Ora è facile riconoscere che effettivamente ha luogo il secondo di questi due casi

potendosi dimostrare l'assurdità del primo. Suppongasi infatti che esso si verifichi: segnando la f_4 con una retta o' passante per O e prossima alla OC , il ramo tangente ad OC è intersecato in due punti $A_1 A_2$ e il ramo cuspidale in altri due $B_1 B_2$ tali che — assunto come infinitesimo unità l'angolo della retta o' con la OC — la distanza $B_1 B_2$ è infinitesima d'ordine $\frac{3}{2}$, mentre la $A_1 A_2$ è infinitesima d'ordine $\frac{1}{2}$ come anche la $A_1 B_2$ e la $B_1 A_2$: pertanto il birapporto

$$(A_1 B_1 A_2 B_2) = \frac{A_1 A_2}{B_1 A_2} : \frac{A_1 B_2}{B_1 B_2} = \frac{A_1 A_2 \cdot B_1 B_2}{B_1 A_2 \cdot A_1 B_2}$$

è infinitesimo, e quindi la g_4^1 segata dalle rette per O non può esser costituita tutta da gruppi equianarmonici per i quali il birapporto ha i due valori

$$-e^{\frac{2\pi i}{3}}, \quad -e^{\frac{4\pi i}{3}}.$$

6) Suppongasi che la φ_3 acquisti un tacnodo C , restando O fuori dalla tangente tacnodale: la retta OC ha tre intersezioni con la f_4 e assorbe 8 tangenti: si deduce che la f_4 ha in C un punto triplo in cui le tre tangenti coincidono in una (diversa dalla OC) dando origine ad un unico ramo del terz'ordine.

7) Suppongasi che, la φ_3 possedendo un tacnodo C , il punto O venga a cadere sulla tangente tacnodale, e quindi sulla cubica φ_3 : come si è già notato, in tale ipotesi la f_4 acquista un punto quadruplo in O , e una delle rette che la compongono è la tangente tacnodale.

8) Suppongasi in fine che la φ_3 abbia un punto triplo C : la OC viene ad avere con la f_4 quattro intersezioni riunite e assorbe 12 tangenti: si deduce che C è per f_4 un punto quadruplo.

§ 6.

Caso armonico.

La determinazione delle quartiche $f_4 = 0$ segate dalle rette di un fascio, il cui sostegno O sia esterno alla quartica, secondo quaterne tutte armoniche, riesce piuttosto complicata poichè vi è non una ma tre famiglie distinte di quartiche siffatte.

Occorre pertanto esaminare e costruire isolatamente i singoli casi particolari possibili, e per procedere nel modo più semplice conviene trattare dapprima le quartiche irriducibili e poi quelle riducibili.

Suppongasi adunque dapprima che la quartica $f_4 = 0$ sia irriducibile: dall'esame istituito nel n° 3 risulta — in base al nostro teorema fondamentale — che le singolarità presentate da una quartica, segata dalle rette per O secondo quaterne armoniche, sono solo

a) flesso del second'ordine la cui tangente passi per O (caso 4);

b) punto doppio a tangenti distinte di cui una, a contatto bipunto col relativo ramo, passi per O (caso 5);

c) tacnodo la cui tangente tacnodale passi per O (caso 8);

d) punto triplo le cui tangenti principali siano distinte fra loro e nessuna di esse passi per O (caso 13);

e) punto triplo le cui tre tangenti principali coincidono in una sola, passante per O , dando origine ad un ramo del terz'ordine (caso 22).

Si esclude infatti anzitutto il caso 11 che assorbe 9 tangenti, cioè l'esistenza di un punto doppio C , con due punti doppi infinitamente vicini su un ramo lineare tangente alla OC , e origine di un ramo del second'ordine per la f_4 , nel modo che segue. È chiaro infatti come la f_4 non può avere un altro punto doppio distinto da OC , perchè in tal caso il ramo del second'ordine che ha l'origine in C si spezzerebbe in due rami lineari; quindi le altre tre tangenti uscenti da O dovrebbero riunirsi in una tangente con contatto quadripunto in un punto F , flesso del second'ordine. Si riconosce allora come la quartica f_4 apparterrebbe al fascio determinato dalla retta CF contata quattro volte, e dalla quaterna di rette $3 OC + OF$, passando per i loro 16 punti comuni. Pertanto f_4 dovrebbe avere in O un punto triplo, contro l'ipotesi.

Si esclude inoltre che la f_4 abbia un punto triplo C , in cui le tre tangenti principali vengano a coincidere in una sola distinta dalla OC , dando origine a un ramo lineare e ad un ramo cuspidale (caso 17), e così pure che abbia un punto triplo C di cui una tangente principale passi per O e le altre due coincidano dando origine ad un tacnodo (caso 21).

A tale oggetto si consideri la quaterna segata da una retta o' , passante per O , e prossima alla OC : si riconosce, con semplici considerazioni di infinitesimi, che tali quaterne — convenientemente ordinate — hanno un birapporto infinitesimo, il che è contraddittorio con l'ipotesi che le quaterne segate dalle rette per O siano tutte armoniche, cioè che il loro birapporto abbia i valori $-1, 2, \frac{1}{2}$.

Indicheremo con $A, B, \dots, E$ un punto della quartica del tipo a), b), $\dots$, e): una quartica irriducibile può avere:

- 1) 4 punti A ,
- 2) 3 punti A e 1 punto B ,
- 3) 2 punti A e 2 punti B ,
- 4) 1 punto A e 3 punti B ,
- 5) 1 punto C e 2 punti A ,
- 6) 1 punto C , 1 punto A , e 1 punto B ,
- 7) 1 punto D e 2 punti A ,
- 8) 1 punto E e 1 punto A .

Ora noi daremo la costruzione delle quartiche corrispondenti ai casi effettivamente possibili e dimostreremo l'impossibilità dei rimanenti.

1) La quartica f_4 possessa 4 flessi del second'ordine $A_1 \dots A_4$ le cui tangenti passino per O .

La retta a , polare di O (rispetto alla f_4) passa per questi quattro punti, che risultano così allineati: pertanto la quartica appartiene al fascio determinato dalla retta a contata quattro volte e dalla quaterna di rette costituita dalle tangenti di flesso nei punti A .

Ne viene per la f_4 un'equazione del tipo

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x c_x d_x e_x$$

dove

$$b_x = 0, \quad c_x = 0, \quad d_x = 0, \quad e_x = 0$$

sono l'equazioni di quattro rette passanti per un punto O , e

$$a_x = 0$$

quella di una quarta retta non passante per O .

Si riconosce facilmente che qualunque quartica del fascio precedente è effettivamente segata dalle rette per O secondo quaterne armoniche: infatti vi sono 4 quaterne (quelle segate dalle rette $b_x = 0, \dots, e_x = 0$ che assorbono 3 tangenti) ciascuna delle quali, in virtù del Teorema I, conta per 2 quaterne armoniche, e quindi, per il Teorema III, tutta la g_4^1 è costituita di quaterne armoniche.

Ciò si può dedurre anche direttamente osservando che la f_4 resta invariata per un'omologia ciclica del quart'ordine che ha O come centro e a come asse, ove si ricordi che — sopra una retta — ogni ciclo di una proiettività ciclica del quart'ordine costituisce una quaterna armonica.

2) Non è possibile che la quartica f_4 possenga 3 flessi del second'ordine A_1, A_2, A_3 , le cui tangenti passino per O , e un nodo B di cui un ramo sia tangente alla OB . Infatti la considerazione della retta polare di O mostra che i punti A_1, A_2, A_3 si trovano sopra una stessa retta a , la quale viene a far parte della conica ψ_2 polare di O , che risulta così costituita dalla retta a contata due volte. Pertanto il punto B , che appartiene alla conica polare, si trova anch'esso sulla retta polare a ; si deduce che la retta OB ha in B 4 intersezioni riunite con la f_4 , e quindi B è un flesso del second'ordine la cui tangente passa per O e non un punto doppio quale si era supposto.

3) La f_4 possenga due flessi del second'ordine A_1, A_2 e due nodi B_1, B_2 , le rette OA_1, OA_2 essendo tangenti di flesso e le OB_1, OB_2 tangenti (a contatto bipunto) di un ramo del nodo. La considerazione della conica polare di O mostra che B_1 e B_2 sono sopra una conica che è tangente in A_1 e A_2 alle rette OA_1 e OA_2 .

Pertanto la quartica più generale di questo tipo si costruisce nel modo seguente. Si assumano ad arbitrio i punti O, A_1, A_2, B_1 e si consideri la conica ψ_2 passante per B_1 e tangente in A_1, A_2 rispettivamente alle rette OA_1, OA_2 .

Sia B_2 un punto qualunque di questa conica ψ_2 . Si costruisca la quartica che ha in A_1 e A_2 come tangenti a contatto quadripunto le due rette OA_1 e OA_2 , che ha in B_1 un punto doppio, di cui un ramo tangente alla OB_1 , e che in fine è tangente in B_2 alla OB_2 . Poichè le condizioni imposte si traducono in 14 equazioni lineari nei coefficienti incogniti della quartica, esiste certo (almeno) una quartica f_4' che le sod-

disfi. Osserviamo che la retta OB_2 viene ad avere 3 intersezioni riunite con la f'_4 : infatti per B_2 passa la cubica e la conica polare di O rispetto la f'_4 . Da ciò risulta che la g'_4 , segata dalle rette per O sopra la f'_4 , è costituita da gruppi armonici avendo 7 gruppi siffatti: quelli segati dalle rette OA_1 , OA_2 , OB_1 , che contano ciascuno per due (Teorema I), e quello segato dalla retta OB_2 che conta almeno una volta. Da ciò si deduce che la retta OB_2 , che conta almeno due volte nel numero delle tangenti alla f_4 uscenti da O , ne conta effettivamente tre, e quindi il punto B_2 risulta un punto doppio di cui un ramo è tangente alla OB_2 : si esclude infatti che B_2 possa essere un flesso del second'ordine, in base all'osservazione fatta precedentemente della non esistenza di una quartica f_4 dotata di tre flessi del second'ordine A_1 , A_2 , A_3 , e di un nodo B .

Si noti che da quanto sopra è detto risulta anche l'unicità della quartica soddisfacente alle condizioni proposte: infatti se f_4 e f'_4 sono due quartiche siffatte esse hanno in comune 18 punti (4 in A_1 , 4 in A_2 , 5 in B_1 , 5 in B_2) e pertanto coincidono.

4) Non può accadere che la quartica f_4 possenga un flesso del second'ordine A e tre punti doppi $B_1 B_2 B_3$. Dedurremo ciò dall'analisi — che istituiremo più avanti — delle quartiche dotate di quattro punti doppi $B_1 \dots B_4$ (e però riducibili in due coniche); per ora continuiamo l'analisi delle f_4 irriducibili.

5) Una quartica f_4 la quale possenga un tacnodo C , la cui tangente tacnodale passi per O , e due flessi del second'ordine A_1 , A_2 , le cui tangenti passino pure per O , appare come caso particolare delle quartiche esaminate in 1).

Infatti la considerazione della retta a , polare di O rispetto la quartica f_4 , mostra che i tre punti C , A_1 , A_2 sono allineati: si deduce così per la f_4 un'equazione del tipo

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x c_x d_x^2$$

che è appunto un caso particolare della

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x c_x d_x e_x.$$

È inutile dire che ogni quartica

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x c_x d_x^2$$

ha effettivamente un tacnodo nel punto C , intersezione delle rette $a_x = 0$ e $d_x = 0$, e che è segata dalle rette per O secondo quaterne tutte armoniche.

6) Non è possibile che la quartica f_4 possenga un tacnodo C un flesso A e un punto doppio B . Ciò si esclude nello stesso modo con cui si è escluso il caso 2).

Si ricordi che la polare di un punto O che si trova sopra la tangente tacnodale di una curva qualsiasi C_n possiede come triplo il tacnodo di C_n , come risulta da una facile verifica analitica: pertanto la cubica polare di O (rispetto la nostra quartica f_4) ha C come triplo, e la conica polare di O ha C come doppio: ma tale conica polare deve passare anche per A ed essere ivi tangente alla OA , quindi essa si riduce alla retta CA contata due volte. Pertanto il punto B viene ad essere allineato con AC , e la retta OB viene ad avere due intersezioni con la conica polare di O e quindi quattro

con la f_4 : si deduce che C non è un nodo ma un flesso del second'ordine la cui tangente passa per O .

7) La quartica f_4 possenga un punto triplo D a tangenti distinte fra loro e dalla OD , e due flessi del second'ordine A_1, A_2 , le cui tangenti passino per O .

Poichè un punto triplo impone solo 6 condizioni e 4 ne impone un flesso del second'ordine di cui sia data anche la tangente, così si possono assumere ad arbitrio i punti O, D, A_1, A_2 , col che resta determinata linearmente una quartica f_1 : infatti se f_4 e f_1 sono due quartiche aventi un punto triplo in D e due flessi del second'ordine nei due punti A_1 e A_2 avendo ivi per tangenti le rette OA_1 e OA_2 , esse hanno 17 punti comuni e quindi coincidono. Scegliendo convenientemente le coordinate si ha per la f_4 un'equazione abbastanza semplice: posto

$$D \equiv (001), \quad A_1 \equiv (010), \quad A_2 \equiv (001), \quad O \equiv (111)$$

si ha

$$f_4 = x_1^3 x_3 + x_1^2 x_2 x_3 + x_1 x_2^2 x_3 + x_2^3 x_3 - x_1^3 x_2 - x_1^2 x_2^2 - x_1 x_2^3 = 0.$$

Sull'equazione della f_4 si può verificare direttamente che le rette per O segano effettivamente quaterne tutte armoniche, ma ciò risulta a priori, in base ai nostri teoremi fondamentali, osservando che la retta OD sega un gruppo che conta come 3 gruppi armonici, e le rette OA_1, OA_2 segano gruppi ciascuno dei quali conta come 2 gruppi armonici.

In virtù dell'unicità della quartica soddisfacente alle precedenti condizioni, si riconosce facilmente che tale quartica rientra come caso particolare in quelle determinate in 3): infatti se nella costruzione ivi indicata si assume B_2 infinitamente vicino al punto B_1 , tale punto — assorbendo 6 delle tangenti uscenti da O , ed essendo intersezione semplice della OB_1 con la conica polare di O rispetto la f_4 — risulta un punto triplo.

8) La f_4 possenga un punto triplo E , le cui tre tangenti principali coincidano nella OE dando origine ad un ramo del terz'ordine, e un flesso del second'ordine A , la cui tangente passi per O .

Si riconosce facilmente che questo caso rientra come caso particolare in quello esaminato in 1).

Infatti la quartica risulta evidentemente appartenere al fascio determinato dalla retta $a = EA$ contata quattro volte e dalla quartica composta della retta OE contata tre volte e della OA : si deduce per la quartica un'equazione del tipo

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x c_x^3,$$

ed è inutile osservare che effettivamente le rette per O segano quaterne armoniche.

Così è esaurita l'analisi e la costruzione delle quartiche irriducibili segate dalle rette di un fascio, il cui sostegno O sia esterno alla curva, secondo quaterne di punti tutte armoniche. Veniamo ora alle quartiche riducibili che supporremo sempre — come più volte si è detto — prive di parti multiple e non passanti per O .

Convorrà osservare anzitutto che se la quartica f_4 contiene una retta r , deve con-

tenerne una seconda r' . Infatti se R è l'intersezione della r con un raggio generico o del fascio O , il punto R' che con R separa armonicamente gli altri due punti della quaterna segata da o , è *unico*, e quindi — non potendo mai coincidere con O — descrive, al variare di o , una retta r' ,

Ciò posto gli unici tipi possibili di quartiche riducibili segate dalle rette per O secondo quaterne armoniche sono:

- 1) Quartica degenerare in una coppia di coniche, K_1 e K_2 ;
- 2) Quartica degenerare in una coppia di rette, r e r' e in una conica K ;
- 3) Quartica degenerare in quattro rette.

1) Cominciamo con l'esaminare il primo tipo di quartiche riducibili. Supponiamo adunque che la quartica f_4 si spezzi in due coniche, K_1 e K_2 . Tenuto conto del come debbono riunirsi le 12 tangenti uscenti da O perchè i gruppi segati dalle rette per esso risultino tutti armonici, si vede facilmente che questo tipo presenta tre casi distinti:

a) Le due coniche K_1 e K_2 sono fra loro bitangenti dando origine a due tacnodi, C_1 e C_2 le cui tangenti tacnodali passano per O . Questo risulta evidentemente un caso particolare delle quartiche segate dalle rette per O secondo quaterne il cui invariante ha un valore fisso K generico, e anche come caso particolare delle quartiche 1) studiate nel principio di questo paragrafo.

Si deduce per la quartica f_4 un'equazione del tipo

$$f_4 = a_x^4 + \lambda b_x^2 c_x^2$$

essendo O il punto comune alle rette $b_x = 0$ e $c_x = 0$, e C_1 e C_2 le intersezioni di queste rette con la $a_x = 0$.

b) Le coniche K_1 e K_2 sono fra loro bitangenti in un punto C_1 e s'intersecano ulteriormente in due punti, B_1 e B_2 , la OC_1 essendo tangente comune, la OB_1 e la OB_2 tangenti rispettivamente alla K_1 e K_2 .

Una quartica siffatta si può ottenere evidentemente prendendo ad arbitrio i quattro punti, O , C_1 , B_1 , B_2 : che essa sia segata dalle rette per O secondo quaterne tutte armoniche risulta dall'esistenza di 7 quaterne siffatte (tre segate dalla retta OC_1 e due da ciascuna delle altre OB_1 e OB_2).

c) Le coniche K_1 e K_2 s'intersecano in quattro punti distinti, B_1 , B_2 , B_3 , B_4 , ciascuna delle rette, OB_1 , OB_2 , OB_3 , OB_4 , essendo tangente ad una delle coniche (OB_1 e OB_2 alla K_1 , OB_3 e OB_4 alla K_2).

Per venire alla costruzione delle quartiche di questo tipo premettiamo il

LEMMA. — Dato un fascio di coniche passanti per due punti assegnati B_2 , B_3 e tangenti in un punto pure assegnato B_1 ad una retta fissa OB_1 , il luogo dei punti B_4 , punti di contatto delle coniche del fascio con le rette per O , è la conica K_1 che passa per B_1 , B_2 , B_3 ed è tangente in B_2 e B_3 alle rette OB_2 , OB_3 .

Per ottenere la dimostrazione del nostro lemma osserviamo che, in generale, dato un fascio di coniche, i cui punti base siano distinti, il punto X di contatto di queste coniche con le rette di un fascio O descrive una cubica passante per O : vi sono in-

fatti due coniche tangenti ad una retta generica per O ed una tangente in O ad una retta del fascio. Ora se due punti base del fascio vengono a trovarsi sopra una retta a passante per O , questa si stacca dalla cubica e il luogo descritto dai punti X è una conica. Dunque nel nostro caso il luogo descritto dal punto B_4 è una conica: si vede subito che questa passa per B_1, B_2, B_3 ; che essa poi sia tangente in B_2 (e così in B_3) alla OB_2 lo si deduce dal fatto che vi è una sola conica del fascio tangente alla OB_2 .

Ciò posto il tipo generale di quartica f_4 , degenerare in una coppia di coniche i cui quattro punti comuni $B_1 \dots B_4$ siano distinti, la quale sia segata dalle rette di un fascio O secondo quaterne tutte armoniche, si ottiene facilmente come segue.

Si assumano ad arbitrio il punto O e i tre punti B_1, B_2, B_3 . Ciò posto si costruisca la conica K_2 che passa per B_1, B_2, B_3 ed è tangente in B_2 e B_3 alle OB_2, OB_3 ; poi si prenda una qualunque conica, K_1 , che passa per B_2, B_3 ed è tangente in B_1 alla OB_1 : questa interseca la K_2 in un quarto punto B_4 e la retta OB_4 risulta, per il lemma stabilito innanzi, tangente alla K_1 .

Pertanto la quartica f_4 composta della $K_1 + K_2$ possiede quattro punti doppi, B_1, B_2, B_3, B_4 , di cui una tangente principale passa per O : si deduce che le rette per O segano su questa quartica quaterne tutte armoniche, contando due volte come tali quelle segate dalle rette $OB_1 \dots OB_4$.

In base a quanto si è ora visto possiamo escludere l'esistenza di una quartica f_4 — segata dalle rette per O secondo quaterne armoniche — dotata di un flesso del second'ordine A , e di tre punti doppi, B_1, B_2, B_3 , essendo OA tangente di flesso e OB_1, OB_2, OB_3 , tangenti principali. [Questo è il tipo 4) delle quartiche irriducibili esaminate nella prima parte di questo paragrafo e di cui ivi avevamo annunciato l'impossibilità].

Perciò occorre notare che presi ad arbitrio i punti O, B_1, B_2, B_3 , esistono 6 quartiche f_4 del tipo precedente, cioè degeneri in due coniche, il cui ultimo punto doppio B_4 giaccia sopra una retta assegnata passante per O : infatti i tre punti, B_1, B_2, B_3 , definiscono 3 coniche K_2 , dipendentemente dalla scelta della coppia di punti B_2 e B_3 , in cui la K_2 è presa tangente alle rette OB_2, OB_3 .

Occorre inoltre ricordare che in una rete di quartiche — quale è quella delle quartiche aventi come doppi i punti B_1, B_2, B_3 e come tangenti principali le OB_1, OB_2, OB_3 — ve ne sono 6 che hanno un contatto tripunto con una retta a generica del piano. Questa nota proposizione può desumersi mediante una facile applicazione del principio di corrispondenza: preso un punto A , della retta a , esistono 4 punti A' in cui è tangente alla a una quartica della rete che passi per A , viceversa ogni punto A' sorge in tal modo da 2 punti A ; pertanto vi sono 6 punti della retta a per cui A e A' coincidono, cioè punti in cui una quartica della rete ha con a un contatto tripunto.

Ora, da quanto è stato sopra osservato risulta che le 6 quartiche aventi con una retta a — passante per O — un contatto tripunto hanno su a un punto doppio per cui a è tangente principale. Resta così escluso che esista una quartica f_4 la quale abbia tre punti doppi, B_1, B_2, B_3 (di cui una tangente principale passi per O) e un flesso del

second'ordine A la cui tangente a passi pure per O . Ma, per rendere affatto rigorosa la deduzione precedente, occorre aggiungere che è assurda l'esistenza di una retta a (diversa dalle OB_1, OB_2, OB_3) su cui esistano infiniti punti di contatto tripunto per una quartica della rete senza che la a ne faccia parte: infatti solo una retta siffatta potrebbe essere la tangente del flesso di second'ordine A .

Mostriamo dunque l'assurdità di una tale ipotesi. Sia $\bar{f}_4$ una quartica (generica) della rete che ha un contatto tripunto con la a in un punto $\bar{A}$: questa quartica è segata dalle rette per O secondo quaterne armoniche (ve ne sono 7 di tali) e quindi il punto $\bar{A}$, non essendo per ipotesi un nodo, deve essere un punto in cui il contatto è effettivamente quadripunto e non tripunto. Ma, come abbiamo già osservato, vi sono 6 quartiche (composte di due coniche K_1 e K_2) che hanno su a un punto doppio: una qualunque di queste dovrebbe avere (come una $\bar{f}_4$ generica) un contatto quadripunto, il che è assurdo poichè in tale caso la conica K_1 — che passa per i tre punti non allineati, B_1, B_2, B_3 — dovrebbe contenere come parte la a , la quale per ipotesi non passa per nessuno di detti punti.

Conviene in fine notare che le *quartiche del tipo a) e b) rientrano come casi particolari nel tipo c)* quando tutti e quattro i punti B_1, B_2, B_3, B_4 , oppure solo due di essi, vengano a coincidere a coppie.

2) Il tipo generale di quartica f_4 degenerare in una coppia di rette r e r' e in una conica K si ottiene assai facilmente.

Si osservi anzitutto che il punto D , comune alle due rette r e r' , deve risultare triplo se si vuole che le rette di un fascio O seghino su questa quartica quaterne armoniche: pertanto la conica K deve passare per detto punto.

Inoltre i due punti B e B' , ulteriori intersezioni della K con le rette r e r' , devono esser punti doppi di cui un ramo abbia come tangente una retta per O : si deduce che le rette OB e OB' sono tangenti alla conica K .

Adunque la quartica più generale di questo tipo si costruisce nel modo seguente: si prenda una conica arbitraria K , e su essa un punto, pure arbitrario, D : siano r e r' due rette (arbitrarie) passanti per D le quali seghino la K in due punti B e B' , indichiamo con O il punto comune alle due tangenti in B e B' . La quartica costituita dalla conica K e dalle rette r e r' è la quartica richiesta: infatti su di essa le rette per O seghino quaterne tutte armoniche, essendovene 7 delle tali (quella segata dalla OD che conta per 3, e quelle segate dalle rette OB e OB' ciascuna delle quali conta per 2).

3) Con facilità ancora maggiore si costruisce il tipo generale di quartica f_4 , degenerare in 4 rette, segata dalla rette per O secondo quaterne armoniche. Basta infatti osservare che tale f_4 non può possedere punti doppi (occorrerebbe che una delle tangenti principali, cioè una delle rette che compongono la f_4 , passasse per O) e quindi le quattro rette passano tutte per un punto F , formando una quaterna armonica di raggi. Viceversa ogni quaterna armonica di raggi di un fascio F costituisce una quartica f_4 segata dalle rette di qualsiasi fascio O secondo quaterne armoniche; ed è inutile no-

tare come questa quartica f_4 appaia quale caso particolare di quelle segate dalle rette di un fascio secondo quaterne il cui invariante abbia un valore costante affatto generico. Bisogna però ricordare che una quartica siffatta non dà origine ad un fascio di cubiche armoniche (§ 3).

§ 7.

Caso in cui il centro del fascio appartenga alla quartica.

Per completare l'analisi delle quartiche segate dalle rette di un fascio secondo quaterne il cui invariante abbia un valore fisso, ci resta da esaminare il caso in cui il punto O , sostegno di detto fascio, appartenga alla quartica f_4 . Come già abbiamo osservato, se il punto O fosse doppio, i gruppi segati dalle rette per O avrebbero tutti $J=1$, e se invece O fosse triplo, J risulterebbe indeterminato. Dovremo dunque supporre che O sia semplice per la quartica f_4 la quale, a sua volta, è supposta — come sempre — priva di parti multiple. Esamineremo prima il caso in cui l'invariante J abbia un valore generico, poi il caso equianarmonico ed infine l'armonico.

1) Suppongasi dunque che la quartica f_4 sia segata dalle rette per un suo punto O secondo quaterne il cui invariante J abbia un valore fisso K diverso da 0 e da ∞ .

Dall'analisi instaurata nel n° 3 risulta che la tangente nel punto semplice O , la quale deve assorbire 6 delle 12 tangenti che da un punto generico vanno alla quartica, si stacca dalla quartica stessa. Le altre 6 tangenti dovendosi pure riunire in una, occorre che la cubica residua abbia un punto triplo. Si ha così che la f_4 si compone di una retta passante per O e di altre tre rette concorrenti in un unico punto: ed è d'altra parte chiaro come una quartica siffatta sia segata dalle rette per O secondo quaterne di cui il birapporto, e quindi l'invariante J , ha un valore costante. Convieni anche osservare come questo tipo di quartiche non rientri come caso particolare in quelli esaminati nel n° 4 in cui si supponeva O esterno alla f_4 .

2) Abbiamo già osservato che se si impone alla quartica

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0,$$

che è la quartica generale segata dalle rette per $O = (001)$ secondo quaterne equianarmoniche, di passare per il punto O , essa viene ad acquistare un punto quadruplo in O : esistono invece quartiche segate dalle rette di un fascio — il cui sostegno sia un punto semplice della curva — le quali quindi non entrano come caso particolare in quelle di cui sopra abbiamo riferito l'equazione. Determiniamole.

A tale oggetto ricordiamo che se un gruppo di punti è equianarmonico ciascun suo punto è punto unito per le due proiettività cicliche del terz'ordine (una inversa dell'altra) che permutano gli altri tre: dunque nel nostro caso possiamo considerare sopra ogni retta o , passante per O , una proiettività ciclica del terz'ordine che lascia fisso O e

permuta le altre tre intersezioni di o con la f_4 . Questa omografia dovrà anche lasciar fissa la terna polare di O rispetto la quaterna, terna che contiene il punto O stesso contato una volta: pertanto tale terna si comporrà del punto O e dell'altro punto unito della suddetta proiettività, contato questo due volte. Si deduce che la cubica polare di O (rispetto la f_4) si compone di una retta a contata due volte e della tangente in O . Preso questo punto O come punto (001) , e assunta la tangente in O come retta $x_1 = 0$, e la retta a come retta $x_2 = 0$, si deduce per la f_4 un'equazione del tipo

$$f_4 = x_3^3 x_1 + \varphi_4(x_1, x_2) = 0$$

essendo φ_4 una forma del quart'ordine nelle x_1, x_2 ; ed è facile riconoscere che una quartica siffatta è segata dalle rette per $O = (001)$ secondo quaterne equianarmoniche.

La f_4 ha in O un flesso del second'ordine.

Si osservi ora che se φ_4 si annulla per $x_1 = 0$, dalla quartica si stacca la retta $x_1 = 0$ e resta una cubica equianarmonica; inoltre se le quattro radici di $\varphi_4 = 0$ sono distinte, la retta a incontra la quartica in 4 flessi le cui tangenti passano per O ; se due di esse coincidono si ha una cuspidale C di cui CO è la tangente cuspidale; se ne coincidono tre si ha un punto triplo T , a tangenti distinte fra loro e dalla OT ; infine se coincidono tutte e quattro si ha un punto triplo T' , le cui tre tangenti principali coincidono nella OT' dando origine ad un ramo del terz'ordine. Osserviamo che la possibilità di queste singolarità si sarebbe potuta desumere a priori in base ai nostri teoremi generali indipendentemente dalla equazione sopra scritta.

3) Ci restano in fine da esaminare le quartiche f_4 segate dalle rette di un fascio, il cui sostegno O sia un punto semplice per la curva, secondo quaterne armoniche.

Si consideri il punto O' , coniugato armonico di O rispetto gli altri due punti di una quaterna segata da una retta o per O : al variare di o , O' descriverà una retta oppure una conica per O : si esclude questo secondo caso osservando che la quartica deve avere in O un flesso, poichè la tangente in O deve assorbire un numero di tangenti multiplo di 3.

Resta così stabilito che la quartica f_4 si compone di una retta a (luogo dei punti O') e di una cubica residua C_3 avente un flesso in O . Essendo armonici i gruppi segati dalle rette per O , si deduce che la retta a è la polare armonica del flesso O .

Viceversa ogni quartica composta di una cubica C_3 , e della polare armonica di un suo flesso O , è segata effettivamente dalle rette per O secondo quaterne tutte armoniche.

Si osservi che la cubica C_3 può comunque degenerare, senza però acquistare un punto doppio in O : in particolare da essa può staccarsi una retta per O , e anche la conica residua può ridursi ad una coppia di rette, col che la quartica f_4 si riduce ad una retta per O e ad una terna di rette passanti per un medesimo punto C , questa terna e la CO formando un gruppo armonico.

Giova in fine notare come il tipo di quartiche ora esaminato non rientri quale caso particolare in nessuno di quelli studiati nel n° 6, in cui supposevasi il punto O esterno alla quartica.

§ 8.

Determinazione dei fasci di cubiche a modulo costante.

Ora che abbiamo determinato e costruito tutti i tipi di quartiche segate dalle rette di un fascio secondo quaterne a birapporto costante, converrà ritornare al problema da cui avevamo preso le mosse, cioè al problema di classificare i fasci di cubiche di ugual modulo i quali corrispondono appunto ai fasci di raggi suddetti.

A tal uopo conviene premettere le seguenti tre *osservazioni*.

1) È noto che, dato un fascio di cubiche (e così di curve di un ordine qualsiasi)

$$\lambda \varphi(x_1, x_2, x_3) + \mu \psi(x_1, x_2, x_3) = 0,$$

i punti doppi delle curve del fascio si ottengono annullando contemporaneamente i minori estratti dalla matrice

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \psi}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi}{\partial x_2} & \frac{\partial \psi}{\partial x_3} \end{vmatrix},$$

cioè intersecando le due curve

$$(1) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} \frac{\partial \psi}{\partial x_3} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \frac{\partial \psi}{\partial x_2} = 0$$

$$(2) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \frac{\partial \psi}{\partial x_1} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \frac{\partial \psi}{\partial x_3} = 0,$$

e togliendo i punti comuni alle due curve

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial \psi}{\partial x_3} = 0.$$

Si riconosce in tal modo che in un fascio di cubiche esistono in generale 12 cubiche dotate di punto doppio: questo numero può però diminuire quando qualcuno dei punti doppi cada in un punto base del fascio, o sia un punto di singolarità più elevata (cuspidale, tacnodo, ...), in modo che la cubica cui tale punto doppio appartiene assorba un certo numero $r > 1$ di cubiche dotate di punto doppio. Precisamente facili sviluppi analitici, i quali costituiscono una verifica diretta, inutile qui a ripetersi, permettono di riconoscere che:

a) Una cubica, C , dotata di cuspidale fuori dei punti base, conta come 2 cubiche dotate di punto doppio;

b) ove la cuspidale di C cada in un punto base, purchè la tangente cuspidale resti distinta dalla tangente fissa che ivi hanno le curve del fascio, la C conta come 3 cubiche dotate di punto doppio;

c) se invece la tangente cuspidale riesce tangente fissa, la C conta 4 volte.

d) Una cubica, C , dotata di tacnodo, fuori dei punti base, assorbe 3 cubiche dotate di punto doppio;

e) se il tacnodo di C cade in un punto base, restando la tangente tacnodale diversa dalla tangente fissa che ivi hanno le cubiche del fascio, la C conta 4 volte nel numero delle cubiche con nodo;

f) se per di più la tangente tacnodale coincide con la tangente fissa, la C conta 6 volte.

g) Una cubica, C , dotata di un punto triplo fuori dei punti base, conta 4 volte nel gruppo delle cubiche nodate;

h) se il punto triplo cade in un punto base, la C conta 6 volte; conta di più ove una delle tre rette che la formano risulti tangente fissa.

i) Una cubica, C , la quale contenga come parte una retta contata due volte, assorbe 6 cubiche dotate di nodo.

2) Sia data una quartica f_4 , quartica di diramazione del piano doppio definito da una rete di cubiche C passanti per 7 punti base: una retta r sega la quartica f_4 in quattro punti che corrispondono ai quattro punti doppi della g_2^1 che le cubiche della rete suddetta segano sulla cubica C , corrispondente alla retta r . Pertanto alle rette di un fascio, il cui sostegno O appartenga semplicemente alla quartica f_4 , corrispondono le cubiche di un fascio le quali hanno fra loro un contatto nel punto O' in cui coincidono i due omologhi di O . In particolare alla retta tangente alla quartica nel punto O (supposta questa tangente a contatto bipunto) corrisponde una cubica avente in O' un punto doppio. Ciò si dimostra osservando che, sopra una cubica C , ogni g_2^1 è segata dalle rette di un fascio il cui sostegno U appartiene alla cubica stessa: se due coincidenze della g_2^1 vengono infinitamente vicine esse cadono in un punto doppio della curva il quale assorbe precisamente due delle tangenti uscenti da U .

Se invece la tangente r viene ad avere nel punto di contatto O tre intersezioni con la quartica, ad essa corrisponde una cubica avente una cuspidale nel punto O' omologo di O , cuspidale che assorbe precisamente tre coincidenze della g_2^1 suddetta. In fine se la r ha un contatto quadripunto con la quartica, la cubica ad essa corrispondente viene ad avere in O' un tacnodo il quale assorbe tutte le quattro coincidenze della g_2^1 ; si esclude infatti che la r possa rappresentare una cubica con punto triplo poichè in tal caso [osservazione precedente, capoverso g)] essa conterebbe quattro volte fra le tangenti alla quartica f_4 condotte da un punto generico della r stessa.

Sia ora O un punto doppio della quartica e sia a tangenti distinte: le rette per O corrispondono a cubiche, di un fascio, dotate di un punto doppio O' , e le tangenti principali (avendo tre intersezioni con la quartica) corrispondono alle due cubiche cuspidate appartenenti al fascio suddetto. Si osservi che il punto O' , in cui cadono quattro intersezioni delle cubiche del fascio, deve essere uno dei sette punti base della rete che definisce il piano doppio.

Se invece il punto O diviene una cuspidale di f_4 , allora la cubica C_r , omologa della tangente cuspidale r , possiede ancora una cuspidale in un punto base della rete: poichè la r assorbe quattro delle tangenti alla f_4 uscenti da un suo punto P , la C_r dovrà contare quattro volte nel numero delle cubiche dotate di nodo appartenenti al

fascio omologo di P , e pertanto la tangente cuspidale di C_r dovrà essere una tangente fissa per detto fascio. (Cfr. Osservazione 1^a).

Vediamo ora cosa corrisponda ad una retta r che sia tangente tacnodale alla quartica f_4 in un punto O . Siccome la r assorbe sei delle tangenti alla f_4 uscenti da un suo punto P , così la cubica C_r , omologa di r , potrà essere:

o una cubica dotata di tacnodo, la cui tangente tacnodale sia fissa per le cubiche del fascio corrispondente ad un punto, P , di r ;

o una cubica dotata di punto triplo (a tangenti distinte) posto in un punto base del fascio predetto;

o, in fine, una cubica dotata di una retta doppia.

Ciò si deduce in base ai risultati riferiti nell'Osservazione 1); vedremo poi come questi tre tipi differenti di C_r diano effettivamente origine ad una retta r , tangente tacnodale di f_4 .

NOTA. — Il risultato precedente può a prima vista meravigliare, dovendosi supporre a priori che ad un unico tipo di retta r corrisponda un unico tipo di cubica C_r . Ma la cosa riesce chiarita da considerazioni di limite cui brevemente accenniamo.

Si consideri dapprima il tacnodo O come limite di due punti doppi della quartica, O_1 e O_2 ; la tangente tacnodale r apparirà come la congiungente due punti doppi infinitamente vicini.

Alla retta r corrisponderà una cubica dotata di due punti doppi O'_1 e O'_2 : quando O_1 e O_2 diventano infinitamente vicini, anche O'_1 e O'_2 diventeranno infinitamente vicini, oppure andranno su una curva fondamentale per la trasformazione $[1, 2]$ che definisce il piano doppio. Nel primo caso la C_r viene ad avere un tacnodo la cui tangente tacnodale $O'_1 O'_2$, contenendo due punti base della rete, è tangente fissa per le cubiche della rete; nel secondo caso la C_r viene a contenere la $O'_1 O'_2$ come retta doppia.

Si consideri invece il tacnodo O come limite di una cuspidale: alla retta r (supposta ancora tangente cuspidale) corrisponde una cubica C_r dotata di cuspidale, e tale che la tangente cuspidale è tangente fissa per il fascio di cubiche corrispondente ad un punto P di r .

Ciò posto consideriamo una cubica C variabile al variare di certi parametri $a, b, \dots, e$:

$$ay^3 + bx^3 + cx^2y + dxy^2 + ey^3 = 0$$

la quale abbia una cuspidale nel punto $O = (0, 0)$ con tangente cuspidale fissa $y = 0$. Se la quarta coincidenza della g_2^1 segata sulla C dalle parallele all'asse y viene a cadere nella cuspidale, allora si ha $a = 0$, oppure $b = 0$; nel primo caso la cubica si riduce a tre rette passanti per O e comunque disposte, nel secondo caso invece si spezza nella retta $y = 0$ e in una conica ivi tangente alla retta stessa.

Pertanto quando la cuspidale di f_4 diviene un tacnodo, la cubica C_r , omologa alla tangente cuspidale r , si ridurrà ad una terna di rette passanti per un punto base della rete, ma comunque disposte, oppure ad una cubica degenerare in una retta, tangente fissa per la rete, ed in una conica a questa stessa retta tangente.

3) Abbiamo già osservato che i fasci di rette il cui sostegno O giaccia sulla quartica f_4 rappresentano fasci di cubiche (appartenenti alla nostra rete di grado 2 che definisce il piano doppio) i cui ulteriori due punti base riescono infinitamente vicini. Da ciò segue che, se il fascio di cubiche a modulo costante non ha tutti i nove punti base infinitamente vicini, si può sempre determinare la rete di cubiche definitrice del piano doppio in modo che il detto fascio corrisponda ad un fascio di rette il cui sostegno O risulti esterno alla quartica di diramazione.

Convorrà quindi esaminare anzitutto quando un fascio di cubiche, i cui nove punti base siano tutti infinitamente vicini, risulti costituito di cubiche a modulo costante (diverso da 1).

Siano adunque f e φ due cubiche aventi in un punto P un contatto 9-punto: sia

$$\psi = f + \lambda_0 \varphi$$

la cubica del fascio che ha in P un punto doppio che sarà una cuspide, o singolarità superiore, avendo ψ un modulo diverso da 1. Siccome ψ ed f devono avere 9 intersezioni riunite in P , ma non una parte comune, si deduce che la ψ ha in P un punto triplo, e precisamente si compone di tre rette coincidenti in una che risulta tangente di flesso per la f .

Assumendo P come punto all'infinito dell'asse y , la polare armonica di P (rispetto ad f) come asse x , e la tangente in P come retta all'infinito, le cubiche del fascio risultano definite dall'equazione

$$y^2 + f_3(x) + \lambda = 0$$

dove $f_3(x)$ è un polinomio di terzo grado in x , e λ un parametro.

Per tal modo si vede che le cubiche del fascio hanno lo stesso birapporto che le quaterne di punti costituite dal punto all'infinito dell'asse x e della terna variabile $f_3(x) + \lambda = 0$.

Queste quaterne formano una g_4^1 i cui gruppi hanno per ipotesi un modulo costante, quindi vi è un gruppo che possiede un punto triplo (distinto da $x = \infty$): assunto questo punto come punto $x = 0$, la detta g_4^1 ha l'equazione

$$x^3 + \mu = 0,$$

ed è quindi costituita di tutti gruppi equianarmonici.

Concludendo: *l'unico fascio di cubiche a modulo costante i cui nove punti base siano infinitamente vicini è il fascio*

$$y^2 + x^3 + \lambda = 0$$

costituito tutto di cubiche equianarmoniche: esso si ottiene combinando linearmente una cubica equianarmonica e una sua tangente di flesso contata tre volte.

Ciò posto veniamo alla determinazione dei fasci di cubiche a modulo costante, e cominciamo dai

I. *Fasci di cubiche il cui modulo costante abbia un valore generico.* — Per quanto abbiamo visto (Osservazione 3) questo fascio può essere supposto rappresentato da un

fascio di rette il cui sostegno O sia esterno alla quartica f_4 . Adunque ($n^\circ 4$) ad ogni fascio di cubiche a modulo costante (di valore generico) corrisponde, come quartica f_4 , una quartica dotata di due tacnodi T_1 e T_2 , cioè costituita da una coppia di coniche K_1 e K_2 fra loro bitangenti; le cubiche del fascio riescono rappresentate dalle rette passanti per il punto O , intersezione delle tangenti comuni a K_1 e K_2 nei punti T_1 e T_2 . Ma esistono due famiglie di fasci di cubiche corrispondenti a quest'unico tipo di quartica f_4 ; abbiamo infatti notato (Osservazione 2) che alla tangente tacnodale di una quartica di diramazione può corrispondere:

1° o una cubica dotata di tacnodo, la cui tangente tacnodale sia tangente fissa per tutte le curve del fascio;

2° o una cubica dotata di un punto triplo, posto in un punto base del fascio, le cui tre tangenti principali sian distinte fra loro e dalla tangente fissa (che ivi hanno le curve del fascio);

3° o una cubica contenente come parte una retta contata due volte.

Ora si riconosce facilmente che se il nostro fascio deve contenere due cubiche di uno dei tre tipi precedenti, queste saranno o entrambe del tipo 1°, oppure una del tipo 2° e l'altra del tipo 3°: infatti, nelle altre ipotesi, il fascio sarebbe costituito di cubiche aventi tutte un punto doppio o — in particolare — una parte in comune.

Si conclude pertanto che:

esistono due famiglie di fasci di cubiche il cui modulo ha un valore generico costante; un fascio della prima famiglia è caratterizzato dal possedere due cubiche tacnodate le cui tangenti tacnodali sono tangenti fisse per il fascio; invece un fascio dell'altra famiglia è caratterizzato dal possedere una cubica dotata di punto triplo in un punto base del fascio e una seconda cubica contenente una retta doppia (non passante per detto punto triplo).

Un fascio della prima famiglia si costruisce prendendo due coniche bitangenti K_1 e K_2 e le loro tangenti comuni t_1 e t_2 : il fascio è

$$\lambda(K_1 + t_1) + \mu(K_2 + t_2);$$

un fascio della seconda famiglia si costruisce combinando linearmente una cubica $2a + b$, degenerare in una retta a contata due volte e in una retta b , con una seconda cubica $c + d + e$, riducibile in tre rette c, d, e , passanti per un medesimo punto di b : il fascio è

$$\lambda(2a + b) + \mu(c + d + e).$$

Resta per tal modo confermato che le due famiglie suddette contengono ciascuna ∞^8 fasci, così come sono ∞^8 le quartiche f_4 cui tali fasci corrispondono. Una facile verifica analitica mostra che effettivamente queste due diverse famiglie di fasci di cubiche corrispondono ad un unico tipo di quartica f_4 , cioè ad una quartica, dotata di due tacnodi, costituita da due coniche bitangenti. Per riconoscere ciò occorre prendere come rete che definisce il piano doppio:

nel primo caso, la rete delle cubiche passanti per il punto (t_1, t_2) , aventi un contatto tripunto con K_1 nel punto di tangenza (K_1, t_2) e parimente un contatto tripunto con K_2 nel punto di tangenza (K_2, t_1) ;

nel secondo caso, la rete di cubiche passanti per il punto (ae) , tangenti alle c, d , nei punti (ac) , (ad) e tangenti alla b nel punto $(bc) = (bd) = (be)$.

II. *Fasce di cubiche equianarmoniche.* — Abbiamo visto che non esiste un tipo generale di quartica segata dalle rette di un fascio secondo quaterne equianarmoniche: tuttavia esiste un tipo generale di fasci di cubiche equianarmoniche, tipo che comprende come casi particolari tutti gli altri, anche il fascio di cubiche equianarmoniche i cui nove punti base siano infinitamente vicini.

Per dimostrare ciò si consideri la quartica

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0$$

che è segata dalle rette per $O = (001)$ secondo quaterne tutte equianarmoniche (Cfr. n° 5) e la si faccia variare in guisa da acquistare un punto doppio, P , il che accade, per esempio, ove la cubica $\varphi_3 = 0$ acquisti essa stessa un punto doppio P , risultando allora P una cuspidale per f_4 di cui OP è la tangente cuspidale. Le rette del fascio O rappresentano ancora cubiche tutte equianarmoniche, e la retta OP rappresenta una cubica dotata di punto doppio in un punto B , base della rete che definisce il piano doppio (precisamente B è una cuspidale la cui tangente cuspidale è fissa per le curve del fascio). Pertanto il fascio $|C_0|$ delle cubiche che corrispondono alle rette per O , ha due, fra i nove, punti base infinitamente vicini i quali cadono nel punto B . Ora si prendano gli altri 7 punti base per definire una rete di grado 2: otterremo un nuovo piano doppio, la cui quartica di diramazione, f'_4 , sarà segata dalle rette corrispondenti alle cubiche di $|C_0|$ secondo quaterne equianarmoniche, e queste rette passeranno tutte per il punto omologo di B , punto che cade sulla quartica f'_4 .

Vediamo così che, mentre la quartica f'_4 non rientra come caso particolare nelle quartiche

$$\frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0,$$

il fascio di cubiche equianarmoniche a cui essa corrisponde appare come caso particolare di quello relativo ad una

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0.$$

Sicchè tutti i fasci di cubiche equianarmoniche i quali diano origine a quartiche che rientrano, come casi particolari, nel tipo della f'_4 , appaiono essi stessi come casi particolari del fascio di cubiche corrispondenti alla quartica

$$f_4 = \frac{\partial^2 \varphi_3}{\partial x_3^2} \varphi_3 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \right)^2 = 0$$

dove $\varphi_3 = 0$ è una cubica affatto generale. Ora tale quartica è dotata di 6 flessi le cui tangenti passano per il punto $O = (001)$ che rappresenta il fascio di cubiche equianarmoniche; le tangenti di flesso corrispondono a cubiche dotate di una cuspidale fuori dei punti base. Pertanto (Cfr. n° 5, 6) possiamo concludere affermando che:

Il fascio più generale di cubiche equianarmoniche è caratterizzato dal possedere 6 cubiche dotate di cuspidi (fuori dei punti base); ogni altro fascio appare come limite di questo quando due, o più, cubiche cuspidate risultano fra loro infinitamente vicine. Questi fasci sono ∞^1 come le quartiche f_4 cui corrispondono.

La costruzione diretta dei fasci di cubiche equianarmoniche risulterebbe molto complicata, ma quanto abbiamo detto ne dà una costruzione indiretta attraverso la quartica f_4 e il relativo piano doppio; la considerazione di questa quartica, tenuto conto dei risultati dell'Osservazione 1) di questo paragrafo, permette anche di riconoscere facilmente i caratteri dei vari fasci particolari. Qui ci limiteremo a notare che, come risulta dall'esame della f_4 , acciocchè il fascio sia costituito da cubiche tutte equianarmoniche basta che esso possenga 5 cubiche cuspidate; l'esistenza di una sesta cubica cuspidata ne viene come conseguenza.

NOTA I. — Ricordiamo che, data una cubica equianarmonica, esistono delle omologie e omografie cicliche del terz'ordine, quest'ultime coi punti uniti sopra la cubica, le quali la lasciano invariata: anzi ciascuna di questa due proprietà caratterizza le cubiche equianarmoniche.

Ora si può chiedere se, dato un fascio di cubiche equianarmoniche, esiste qualche omologia od omografia della specie suddetta, la quale lasci invariate tutte le cubiche del fascio. Alla quale domanda la risposta è negativa: i fasci di cubiche le quali siano invarianti per una medesima omologia ciclica del terz'ordine o per una omografia pure ciclica del terz'ordine (i cui punti uniti giacciono sulla curva stessa) sono fasci di cubiche equianarmoniche particolari. E la loro costruzione si ottiene immediatamente come segue.

Le cubiche del fascio $\lambda f + \mu \varphi$ siano invarianti per un'omologia ω , ciclica del terz'ordine, di centro O e asse a . Allora, come è ben noto, le intersezioni della a con una cubica del fascio sono flessi per questa e le tangenti di flesso passano per O . Il fascio è dunque ottenuto combinando linearmente la retta a contata tre volte e una terna di rette per O . Pertanto, relativamente ad una medesima omologia ω , esistono ∞^3 fasci di cubiche invarianti costituiti dalle cubiche del tipo

$$\lambda_0 y^3 + (\lambda_1 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_3 x + \lambda_4) = 0,$$

sicchè i fasci di tal natura appaiono essere in tutto ∞^7 .

Suppongasì, invece, che ciascuna cubica del fascio $\lambda f + \mu \varphi$ sia invariante per un'omografia ω , ciclica del terz'ordine, i cui tre punti uniti A, B, C , giacciono sulla cubica stessa. Questi tre punti uniti saranno punti base del fascio, e ivi la tangente di ciascuna cubica, dovendo ristar fissa per la ω , coinciderà con una delle rette unite che vi passano, e sarà tangente comune per tutte le curve del fascio: resteranno così, fuori dei punti A, B, C , altri tre punti base del fascio, i quali costituiranno un ciclo della omografia ω . Si riconosce poi facilmente che presi i tre punti P, Q, R di un ciclo arbitrario della ω , le cubiche passanti per essi, per A, B, C , e tangenti in questi ultimi alle rette AB, BC, CA formano effettivamente un fascio, cui appartengono tre cubiche spezzate in una retta e in una conica: una di queste consta della retta CA e della conica pas-

sante per A, B, P, Q, R , l'altra della retta AB e della conica $BCPQR$, e l'ultima della retta BC e della conica $CAPQR$.

Queste tre cubiche risultando invarianti per la ω , tutte le cubiche del fascio restano fisse per la ω stessa, e sono quindi equianarmoniche. Tale fascio fu incontrato da S. KANTOR esaminando le proiettività che lasciano fermo un fascio di cubiche ⁴⁾; erroneamente poi egli aggiunge che sono anche composti di cubiche equianarmoniche i fasci i cui nove punti base costituiscano tre cicli di una proiettività ciclica del terz'ordine, fasci nei quali il precedente figura come caso particolare ⁵⁾.

Aggiungasi che, ove il triangolo ABC sia assunto come triangolo fondamentale delle coordinate, l'equazione di una qualsiasi cubica invariante per la ω è della forma

$$\lambda_0 x_2 x_3^2 + \lambda_1 x_3 x_1^2 + \lambda_2 x_1 x_2^2 = 0,$$

sicchè appare che le suddette cubiche equianarmoniche formano una rete, e ciascuno degli ∞^2 fasci di questa risulta determinato dalla condizione di avere come punti base i tre punti P, Q, R di un ciclo (arbitrario) della ω .

Pertanto i fasci di cubiche equianarmoniche che restino invariate per una proiettività ω , ciclica del terz'ordine, risultano ∞^3 , essendo ∞^6 il numero delle suddette proiettività.

Si conclude che i fasci di cubiche invarianti per omologie od omografie del terz'ordine rientrano come casi particolari entro la famiglia degli ∞^{11} fasci di cubiche equianarmoniche che abbiamo determinato.

III. *Fasci di cubiche armoniche.* — Per quanto abbiamo notato all'Osservazione 3) i fasci di cubiche armoniche posson essere rappresentati sempre da fasci di rette il cui sostegno è esterno alla quartica di diramazione f_4 . Adunque l'analisi fatta nel n° 6 delle quartiche segate dalle rette di un fascio secondo quaterne equianarmoniche, tenuto conto dell'osservazione 2) di questo paragrafo, ci permette di concludere:

Esistono tre famiglie di fasci di cubiche tutte armoniche le quali sono così caratterizzate:

i fasci della prima famiglia contengono quattro cubiche dotate di tacnodo (fuori dei punti base);

i fasci della seconda famiglia contengono due cubiche dotate di tacnodo (fuori dei punti base) e due cubiche dotate di cuspidi nei punti base (per modo che la tangente cuspidale non sia tangente fissa per le cubiche del fascio);

i fasci della terza famiglia contengono quattro cubiche con cuspidi (la cui tangente cuspidale non è tangente fissa per le curve del fascio).

⁴⁾ l. c. ¹⁾, pp. 6, 9.

⁵⁾ Per mettere in luce l'errore di KANTOR basta costruire un fascio di cubiche passanti per i tre cicli di una proiettività ciclica del terz'ordine e non costituito da cubiche equianarmoniche: tale è il fascio definito da una cubica con nodo, e da una terna di rette costituenti un ciclo della proiettività del terz'ordine che lascia ferma la cubica suddetta.

I fasci di ciascuna famiglia sono ∞^2 , come le quartiche cui corrispondono; ogni fascio di cubiche armoniche rientra come caso particolare in una delle famiglie precedenti ove risultino infinitamente vicine alcune delle quattro cubiche singolari nominate. La costruzione diretta di tali fasci richiederebbe laboriosi sviluppi di calcolo, ma le considerazioni svolte ce ne danno, come per i fasci di cubiche equianarmoniche, una costruzione indiretta attraverso la quartica f_4 e il relativo piano doppio.

NOTA II. — Ricordiamo che, data una cubica armonica, esistono delle omografie cicliche del quart'ordine le quali la lasciano invariata: una tale omografia ha come punto unito un flesso F della cubica e come rette unite la tangente di flesso, la polare armonica di F , e una delle altre tre tangenti uscenti da F stesso, il cui punto di contatto risulta essere un secondo punto unito.

È noto inoltre come la suddetta proprietà caratterizzi le cubiche armoniche. Ora, analogamente a quanto accade per le cubiche equianarmoniche, si domanda se esiste qualche omografia ciclica del quart'ordine la quale lasci ferma ciascuna cubica di un fascio generico di cubiche armoniche. Anche qui la risposta è negativa: i fasci di *cubiche armoniche, le quali siano invarianti per una medesima omografia ciclica del quart'ordine sono fasci particolari*. E la loro costruzione si ottiene come segue.

Sia $\lambda f + \mu p$ un fascio di cubiche tutte trasformate in sè da una proiettività ω , ciclica del quart'ordine.

Per quanto sopra abbiamo ricordato, se F, G, H sono i tre punti uniti della ω , uno di essi per es. F , sarà un flesso comune a tutte le cubiche, e la retta opposta, GH , sarà la relativa polare armonica.

Parimenti una delle rette FG e FH , per es. la FH , sarà tangente di flesso per tutte le cubiche, le quali risulteranno pure tangenti in G alla retta FG . Preso F come punto all'infinito dell'asse y , G come punto (∞) e GH come asse x , le cubiche del fascio, essendo per ipotesi armoniche, avranno un'equazione del tipo

$$\lambda_0 y^2 + \lambda_1 x^3 + \lambda_2 x = 0.$$

Pertanto esiste una rete di cubiche armoniche invarianti per l'omografia ω , ciclica del quart'ordine; questa rete contiene ∞^2 fasci, ciascuno dei quali è determinato dai quattro punti base, fuori di F e G , i quali costituiscono un ciclo della ω .

Dipendendo la ω da sei parametri arbitrari (le coordinate dei punti F, G, H) i fasci di cubiche armoniche le quali restano invariate per un'omografia ciclica del quart'ordine sono ∞^8 ⁶⁾.

Si riconosce facilmente che uno di questi fasci contiene tre cubiche singolari: una

⁶⁾ Di questo tipo sembra fossero i fasci di cubiche armoniche, che il CAPORALI [Rendiconti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, anno XXII (1883), p. 314] nella sua relazione sulla citata memoria di KANTOR dice esser stati scoperti dal KANTOR stesso. Ma di ciò non ho trovato traccia nell'esame dei fasci di cubiche invarianti per proiettività cicliche che KANTOR svolge nella sua memoria, pubblicata cinque anni più tardi.

degenerare in tre rette per il punto base F , una seconda dotata di una cuspidale in G , con tangente cuspidale GH , una terza composta della retta FH ed una conica ad essa tangente in H . Questo fascio appare dunque come un fascio particolare della seconda famiglia ove una cubica dotata di cuspidale e una di tacnodo divengano infinitamente vicine, dando origine alla cubica con punto triplo in F .

Bologna, gennaio 1916.

OSCAR CHISINI.