R. J.	Catalogue	α (1920)	δ (1920)	Epoque 1910+	Angle	Distance	Grandeurs	n
198	Anonyma	21 ^h 26 ^m 16 ^s	+14° 53'	0.836	35°6	3"00	9 ^m 5 9 ^m 8	1
199	Anonyma	21 26 58	+ 8 7	0.836	183.0	4.52	9.4 9.5	1
200	Anonyma	21 30 36	+14 54	0.836	317.0	2.42	9.1 9.1	1
201	Anonyma	21 42 53	+10 6	0.833	40.4	2.71	9.3 9.3	1
202	AG Lpz II 10934	21 42 54	+ 7 0	0.836	178.6	3.41	9.0 9.4	1
203	Anonyma	21 51 53	+31 55	0.825	61.0	2.20	10.0 10.5	1
204	BD +10°4698	22 5 4	+10 24	0.833	340.0	4.95	9.4 11.5	1
205	Anonyma	22 14 14	+16 34	0.833	293.6	2.12	9.4 12.0	1
206	BD +14°4794	22 21 21	+14 46	0.836	29.4	2.80	8.9 11.6	1
207	AG Berl A 9279	22 37 32	+17 30	0.836	186.2	3.08	8.4 13.0	1
208	Anonyma	22 38 59	+11 19	0.814	70.2	3.43	9.5 9.6	1
209	AG Berl A 9296	22 39 53	+17 25	0.836	44.9	4.47	8.8 12.5	1
210	Anonyma	22 46 33	+18 40	0.836	322.4	3.83	9.5 10.5	1
211	BD +23°4668	23 0 23	+24 13	0.806	148.8	1.91	9.1 9.3	2
212	Anonyma	23 3 27	+19 43	0.829	343.0	3.83	9.6 9.6	1
213	Anonyma	23 48 23	+28 26	0.814	166.0	4.99	9.5 9.7	1
214	BD +15°4901	23 49 52	+15 32	0.833	109.4	2.33	9.0 9.5	1
215	BD +16°5029	23 57 32	+16 32	0.833	36.0	1.90	9.1 12.0	1

Observatoire d'Hem, 1910 Nov. 1.

Robert Jonckheere.

Bemerkung zur Frage der Veränderlichkeit von 60 B. Canum venat.

Dieser Stern wurde von Šafařík wegen seiner intensiv roten Färbung zeitweise beobachtet. Die Beobachtungsreihe umfaßt den Zeitraum vom Jahre 1886 bis 1894, und obwohl die Beobachtungen nicht systematisch angestellt wurden, veraten sie eine unregelmäßige geringe Lichtschwankung des genannten Sternes. Ich habe die Beobachtungen im Systeme der Potsdamer Durchmusterung reduziert und bekam folgendes Resultat: 1886 war ein Maximum 4^m9 Ende April, 1887 wird der Stern durchschnittlich zu 5^m2 $\pm$ 0^m1 geschätzt.

Observatorium Nižbor, 1910 Sept. 1.

1889 war der Stern im Juni sehr hell (4^m8), 1892 im Februar ziemlich schwach (5^m6), endlich wurde 1894 im Frühjahr die Helligkeit zu 5^m2 und im Juli zu 5^m6 geschätzt. Die Farbe wird als 8° der Schmidtschen Skala bezeichnet, was den Unterschied zwischen der visuellen und der photographischen Größenbestimmung erklärt.

Nach dem Gange der Beobachtungen scheint der Lichtwechsel unregelmäßig zu verlaufen und zeitweise stationär zu werden.

Ladislav Pračka.

Sul moto proprio di BD +30°89.

Continuando ad osservare l'asteroide 1910 KU Interamnia il 12 e 13 Novembre colle tre stelle:

*1 = BD +30°81 9^m0 = AG Lei 191, Cbr E. 350

*2 = BD +30°89 9.0 = AG Lei 203, Cbr E. 372

*3 = BD +30°91 3.3 = δ Andromedae (B. J. No. 20)

mentre trovai che le differenze di coordinate osservate la sera del 13 fra la fondamentale *3 e la *1 bene mi corrispondevano con quelle date dai cataloghi AG, non mi corrisposero quelle fra *2 e *1 per la sera del 12. Ne veniva in conseguenza il sospetto che *2 fosse dotata di

Arcetri, 1910 Novembre 22.

m. pr. siccome infatti trovai nel Catalogo di Parigi per la *790 ($-0^{\circ}0056 - 0^{\circ}151$). Se non che questo moto non convenendo alle mie osservazioni feci ricorso al Catalogo fotografico di Oxford. E potei così avere quattro differenze, Leiden, Cambridge E., Oxford, Arcetri che poste in relazione colle rispettive Δ Ep. mi portarono al risultato soddisfacente che segue:

Moto proprio di BD +30°89

$-0^{\circ}020 \pm 0^{\circ}001 - 0^{\circ}02 \pm 0^{\circ}02$.

Avvertasi che tanto qui quanto in A. N. 4453 per la stella BD +33°99 gli errori dati sono errori medi.

A. Abetti.

Saturne. Le 16 Novembre 1910 durant l'éclipse de Lune ayant tourné l'équatorial de 35 cm sur Saturne, je remarquai aussitôt à l'extrémité Est de l'anneau extérieur une projection nébuleuse s'étendant sur le ciel. C'est principalement avec les plus faibles grossissements de 100 et 200 fois que cette nébulosité était visible se dégradant progressivement du bord extérieur de l'anneau A. Ce phénomène fut encore observé mais avec plus de difficulté le 20 et 24 Novembre.

Observatoire d'Hem, 5 Novembre 1910.

Robert Jonckheere.