Beob.-Zeit	Gr.	Min.	Ph.	Beob.-Zeit	Gr.	Min.	Ph.
t	5 ^m 1	t	0 ^d 000	$t + 30^d$	4 ^m 4	$t + 29^d$ 387	0 ^d 613
$t + 5^d$	5.0	$t + 4^d$ 898	0.102	35	4.7	34.284	0.716
10	4.8	9.796	0.204	40	5.0	39.182	0.818
15	4.5	14.693	0.307	45	5.1	44.080	0.920
20	4.3	19.591	0.409	50	5.0	48.978	0.042
25	4.2	24.489	0.511

Wie aus obenstehender graphischer Darstellung hervorgeht, schließen sich die Beobachtungen der kurzen Periode völlig an, genügen also gleichzeitig den Perioden 46^d4 und 0^d97955. Bedingung ist dabei freilich, daß stets zu nahezu

Sonneberg, S.-M., 1913 Sept. 2.

gleicher Stunde beobachtet wird, aber gerade dies scheint mir bei zirkumpolaren langperiodischen Sternen sehr wahrscheinlich. Auf diese Weise dürften wohl auch die *Yendell*-schen Perioden entstanden sein. Zur Bekräftigung dieser Annahme mag folgendes dienen. Mit Hilfe der oben angeführten Beziehung zwischen beiden Perioden läßt sich die kurze aus der langen berechnen. Mit Annahme einer Periode von 362^d für V Cephei ergaben sich folgende Werte. Die von Herrn *Yendell* aus seinen Beobachtungen gefolgerten setze ich zum Vergleich daneben.

	berechnet	<i>Yendell</i> beob.	R-B
R Lyrae	0 ^d 97845	0 ^d 97955	-0 ^d 00110
V Cephei	0.99724	0.99751	-0.00027

Wie ersichtlich, ist die Übereinstimmung geradezu überraschend. Man kann nur noch im Zweifel sein, ob die lange oder die kurze Periode den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Dies kann einwandfrei nur durch Beobachtungen entschieden werden, und zwar müßten stets in der gleichen Nacht mehrere Schätzungen vorgenommen werden mit einigen Stunden Zwischenzeit. V Cephei habe ich bereits selbst seit einigen Wochen in dieser Weise überwacht, jedoch ohne irgendwelche Schwankungen innerhalb einer kurzen Periode feststellen zu können. Wegen R Lyrae verweise ich auf die Mitteilung des Herrn *A. Wissotsky* in A. N. 4676. Auch ist die rote Farbe (6^o5 der *Osthoff*-schen Skala) bemerkenswert. Man wird sich also doch bei beiden Sternen für die lange Periode entscheiden müssen.

Cuno Hoffmeister.

Über den *Schwarzschild*-schen Libellensextanten. Von *J. Möller*.

Der Wunsch, von Freiballon und Luftschiff aus Gestirnhöhen messen zu können, hat zur Konstruktion der Libellen-Quadranten und -Sextanten geführt, da in der Luft, wenigstens über dem Lande, keine feste Kimm wahrnehmbar ist, von der aus, wie auf See, der Gestirnsabstand gemessen werden könnte. Meines Wissens sind von der Firma Butenschön die ersten brauchbaren Ballonsextanten nach dem Libellenprinzip konstruiert und in den Handel gebracht worden. Bei den Butenschönschen Instrumenten ist eine Libelle in der Art an der Alhidade befestigt, daß das Bild der Libellenblase durch eine Öffnung im Fernrohrtubus auf einen gegen die Fernrohrachse geneigten im Innern des Fernrohrs befindlichen Spiegel gelangen und von hier aus in das Okular reflektiert werden kann. Der Stern wird durch das Fernrohr anvisiert und die Alhidade so lange gedreht, bis das Bild der Blasenmitte gleichzeitig mit dem Stern in der Mitte des Gesichtsfeldes erscheint. Das ist immer nur dann der Fall, wenn die Libelle genau horizontal steht. Die Beobachtung erfordert eine gewisse Übung, da es manchmal, besonders auf schwankendem Boden, nicht leicht ist, Blasenmitte, Stern und Mittelfaden des Fernrohrs zur Koinzidenz zu bringen. Besonders erschwert wird die Beobachtung noch durch den Umstand, daß bei kleinen Bewegungen Blase und Gestirn aus der Mitte des Gesichtsfeldes nach verschiedenen Seiten hinauswandern. Immerhin ist das sehr leichtgebaute Butenschönsche Instrument für Freiballone recht brauchbar.

Praktischer, wenigstens für größere Luft- und auch für Seeschiffe, scheint mir der Libellensextant von Prof. *Schwarzschild* zu sein. Bei diesem befindet sich die Libelle nicht an der Alhidade, sondern an dem festen Gestell des Sextanten, und zwar so weit vom Fernrohr entfernt, daß das Bild der Libellenblase durch ein total reflektierendes Prisma in das Objektiv des Fernrohrs geworfen wird. Das Fernrohr wird bei der Beobachtung nicht zum Stern hin gerichtet, sondern stets horizontal gehalten, und der Stern, wie bei den gewöhnlichen Sextanten, durch doppelte Reflexion an großem und kleinem Spiegel, also durch Drehung der Alhidade, in das Gesichtsfeld gebracht. Durch diese Anordnung erreicht man den Vorteil, daß bei kleinen Drehungen des Instruments in der Sextantenebene Blase und Gestirn nach derselben Seite aus der Mitte des Gesichtsfeldes hinauswandern. Wenn man den Abstand des Prismas von der Libelle gerade so groß wählt wie den Krümmungsradius der Libelle, so wandern Libelle und Gestirn auch um gleiche Beträge aus der Mitte des Gesichtsfeldes hinaus, wie eine einfache geometrische Betrachtung zeigt. Man braucht daher bei dieser Anordnung nicht dafür Sorge zu tragen, daß die Koinzidenz zwischen Blasenmitte und Gestirn auch in der Mitte des Gesichtsfeldes erfolgt, sondern kann die Aufmerksamkeit allein auf diese Koinzidenz richten. Das ist ein ganz erheblicher Vorteil, der die Bequemlichkeit und Genauigkeit der Beobachtung ganz wesentlich erhöht. Um nun den Abstand des Prismas von der Libelle nicht so groß wählen zu müssen, bringt

Schwarzschild vor dem Prisma eine verkleinernde Konkavlinse an. Wird durch diese z. B. eine fünffache Verkleinerung erreicht, so ist der Abstand vom Prisma zur Libelle auch nur gleich dem fünften Teile des Krümmungsradius der Libelle zu wählen. Eine genaue Beschreibung des Instrumentes ist von *Schwarzschild* in der Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt 1913 S. 177 und von mir in den Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie (Oktoberheft 1913) gegeben worden. Meine Beobachtungen mit diesem Sextanten vom festen Boden aus geben als durchschnittlichen Fehler von 12 Beobachtungen eines Satzes $2'$, als wahrscheinlichen einer Einzelbeobachtung $\pm 2'$ und als wahrscheinlichen Fehler des Mittels aus 12 Beobachtungen ± 0.5 . Bei Beobachtungen vom Zeppelinluftschiff »Hansa« aus ergab sich eine fast ebenso große Genauigkeit, wenn man von der nur sehr wenig schwankenden Passagiergondel

Elsfleth, 1913 September.

aus beobachtete. Leider hatte ich, als ich bei einer zweiten Luftschiffahrt mich auf die Plattform, die sich oben auf dem Luftschiff befindet, begab, um andere Untersuchungen anzustellen, den Sextanten nicht bei mir. Doch waren dort oben die Erschütterungen durch die Motoren so gering, daß ich annehmen möchte, man könnte dort oben fast eben so sicher beobachten wie vom festen Boden aus.

Weitere Beobachtungen, die ich auf einem Segelschiff bei stürmischem und ruhigem Wetter auf der Ostsee anstellte, zeigten, daß das Instrument bei sehr starken Schwankungen allerdings versagt. Es wird auf großen Seeschiffen aber, besonders bei nicht zu stark bewegter See, wahrscheinlich recht gut zu Gestirnsbeobachtungen benutzt werden können, wenn die Kimm durch Nebel verdeckt ist.

Die guten Ergebnisse, die ich mit *Schwarzschild's* Libellen-sextanten erzielt habe, empfehlen ihn auch für Forschungsreisen.

Dr. J. Möller.

Neuer Komet 1913f (*Delavan*).

Am 18. Dezember abends ging bei der Zentralstelle von Prof. *Pickering* folgendes Telegramm ein: »*Hussey* cables comet *Delavan* observed by *Hussey* 1913 December 17 $14^h 26^m 35^s$ Gr. m. t. $\alpha = 3^h 3^m 19^s 2$ $\delta = -7^\circ 25' 24''$ visible in large telescope«. Die Mitglieder der Zentralstelle wurden sofort telegraphisch benachrichtigt und am späten Abend des 18. Dez. teilte Prof. *Schorr* telephonisch folgende in Bergedorf von Dr. *Graff* erhaltene Beobachtung mit: »Dez. 18 $7^h 24^m 18^s$ m. Z. Gr. $\alpha = 3^h 2^m 41^s 09$ (9.029n) $\delta = -7^\circ 21' 28.8$ (0.885). Gr. 11^m, Kern 0.5, kein Schweif«.

Beobachtungen.

1913	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	α app.	$\log p \cdot \Delta$	δ app.	$\log p \cdot \Delta$	Red. ad l. app.	•
Auf der Hamburger Sternwarte in Bergedorf von Observator Dr. K. <i>Graff</i> .									
Dez. 18	$7^h 24^m 18^s$ m. Z. Grw.	$-0^m 7^s 19$	$+13' 6.7$	$-3^h 2^m 41^s 09$	9.029n	$-7^\circ 21' 28.8$	0.885	$+4^s 10$	$+19.1$ 1
Auf der Sternwarte Utrecht von Observator J. <i>Van der Bilt</i> .									
Dez. 19	11 2 27 m. Z. Utr.	$+1 30.80$	$-3 14.0$	10.5 3	1 40.85	9.232	$-7 14 57.6$	0.874	$+4.10$ $+19.2$ 2
Vergleichsterne 1913.0: *1 $3^h 2^m 44^s 18$ $-7^\circ 34' 54.6$ Ott 708, *2 $3^h 0^m 5^s 95$ $-7^\circ 12' 2.8$ Ott 696.									
Dez. 18	$12^h 3^m 59^s$ Cordoba	α app.	$= 3^h 2^m 20^s 4$	δ app.	$= -7^\circ 19' 14''$	<i>Glancy. Perrine.</i>			
19	7 34 12 Bamberg	3	1 49.07	$-7 15 55$	Gr. 11 ^m 0.	Klein, rund, Verd. z. Mitte. <i>Hartwig.</i>			
19	8 43 24 Heidelberg	3	1 46.40	$-7 15 32$	11.0.	<i>Mündler. Wolf.</i>			
19	8 57 30 Alger	3	1 44.73	$-7 15 25$	10.0.	<i>Gonnessiat.</i>			
20	7 18 0 Alger	3	0 56.27	$-7 9 54$	10.5.	<i>Renaux.</i>			

Elemente und Ephemeride.

Aus den Beobachtungen Dez. 17 La Plata, Dez. 18 Bergedorf und Dez. 19 Bamberg haben sich die folgenden parabolischen Elemente ergeben:

$$\begin{aligned} T &= 1914 \text{ März } 2.3211 \text{ m. Z. Berlin} \\ \omega &= 7^\circ 40.1 \\ \Omega &= 126 32.6 \\ i &= 13 4.6 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 1913.0$$

$$\log q = 0.04526$$

$$\begin{aligned} x &= [9.99270] r \cdot \sin(v + 224^\circ 56.1) \\ y &= [9.98431] r \cdot \sin(v + 137 50.2) \\ z &= [9.50592] r \cdot \sin(v + 101 49.7) \end{aligned}$$

12^h m. Z. Berlin.

1913	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	Gr.
Dez. 17	$3^h 3^m 25^s$	$-7^\circ 26.1$	0.2086	9.8984	11 ^m 0
18	2 31	7 20.8			
19	1 39	7 14.8			
20	3 0 48	-7 8.3			

1913-14	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	Gr.
Dez. 21	$2^h 59^m 59^s$	$-7^\circ 1.3$	0.1970	9.8879	10 ^m 9
22	59 13	6 53.6			
23	58 29	6 45.4			
24	57 47	6 36.6			
25	57 7	6 27.2	0.1853	9.8780	10.8
26	56 30	6 17.2			
27	55 55	6 6.7			
28	55 23	5 55.5			
29	54 54	5 43.7	0.1736	9.8685	10.7
30	54 28	5 31.5			
31	54 5	5 18.4			
Jan. 1	53 44	5 4.9			
2	53 27	4 50.8	0.1619	9.8594	10.6
3	53 12	4 36.1			
4	53 1	4 20.9			
5	52 53	4 5.1			
6	2 52 48	-3 48.7	0.1502	9.8504	10.5
Kiel 1913 Dez. 21.					
H. Kobold.					

Inhalt zu Nr. 4703. A. *Hnatek*. Beobachtung von Radialgeschwindigkeiten. 389. — Mitteilungen über Veränderliche. 391. — C. *Hoffmeister*. Über einen möglichen Trugschluß bezüglich der Perioden gewisser veränderlicher Sterne. 399. — J. *Möller*. Über den *Schwarzschild'schen* Libellensextanten. 401. — Neuer Komet 1913f (*Delavan*). 403.