Hierbei sind $\% \text{ C}$, $\% \text{ N}$, $\% \text{ H}$, $\% \text{ S}$ bereits durch Analyse ermittelt. O_1 bedeutet die zur vollständigen Oxydation notwendige noch zuzuführende Sauerstoffmenge, die sich also aus dem Verbrauch aus $\frac{n}{10} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lösung ergibt. E ist die Einwage.

Die Anregung zu vorstehender Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten Chef, Herrn Hofrat Dr. G. Vortmann, dem ich dafür sowie für die Unterstützung durch wertvolle Ratschläge auch an dieser Stelle meinen ergebenen Dank ausspreche.

Wien, Technische Hochschule. Laboratorium für analytische Chemie.

Bericht über die Fortschritte der analytischen Chemie.

I. Allgemeine analytische Methoden, analytische Operationen, Apparate und Reagenzien.

Literatur. Das Praktikum der quantitativen anorganischen Analyse von A. Stock und A. Stähler¹⁾, dessen erste Auflage in dieser Ztschrft. **49**, 118 besprochen wurde, liegt nun in zweiter veränderter Auflage vor. Die zweckmäßige Gesamtanordnung ist beibehalten. Es ist den Verfassern gelungen, auf recht kleinem Raum sowohl die allgemeinen Grundlagen der quantitativen Analyse, als auch die bei den einzelnen Beispielen gegebenen Arbeitsvorschriften in hervorragend klarer und überall genügender Ausführlichkeit darzubieten. Die Auswahl des Stoffes ist eine glückliche und alle Arten quantitativer Methoden umfassende, so dass das Werkchen als Wegweiser zur Einführung in die praktische Ausführung quantitativer Analysen durchaus empfohlen werden kann. Entsprechend seiner Entstehung aus den Bedürfnissen des Unterrichts an grossen Instituten mit vielen Studierenden ist das Büchlein speziell für diese Verhältnisse zugeschnitten und enthält in dieser Hinsicht eine Reihe praktisch erprobter Angaben über Abgabe bestimmter Substanzmengen und Kontrolle der Richtigkeit der Analysen. Es ist ein mit diesem System verbundener unvermeidlicher Übelstand, dass dem Studierenden meist fertige Lösungen verabfolgt werden müssen und er die zu untersuchenden Substanzen nicht selbst abwägt, auflöst bezw. aufschliesst.

Die Chemie und chemische Technologie radioaktiver Stoffe hat Ferdinand Henrich²⁾ in einem besonders für die Bedürfnisse des Chemikers zugeschnittenen Buche dargestellt und damit eine

¹⁾ Verlag von Julius Springer, Berlin 1918. — ²⁾ Verlag von Julius Springer, Berlin 1918.

häufig empfundene Lücke in unserer Literatur ausgefüllt. Auf im ganzen 350 Seiten sind in sehr klarer Behandlung zunächst die experimentellen Erscheinungen und die aus ihnen sich ergebenden theoretischen Folgerungen besprochen. Dann folgt, im Anschluss an die Theorie der Ionisation, eine eingehende Beschreibung der Methoden der Messung und Berechnung der Radioaktivität. Diese Abschnitte, in denen auch vielerlei persönliche Erfahrungen des Verfassers mitgeteilt sind, geben dem Buch gerade für den mit praktischen Bestimmungen der Radioaktivität beschäftigten Chemiker seinen besonderen Wert. Weiterhin wird dann noch die Chemie der einzelnen Zerfallsreihen unter Berücksichtigung auch der neuesten Forschungen dargestellt und zum Schluss noch die Technologie der Radioelemente erörtert.

Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwicklung hat Leo Graetz¹⁾ in 6 Vorträgen in seiner bekannten klaren und im besten Sinne populären Art besprochen und sich damit sicherlich den Dank vieler Fachgenossen erworben, die den Wunsch haben, auch ohne eingehende mathematische Kenntnisse zu besitzen, sich über die für die ganze Weiterentwicklung der Chemie grundlegenden neueren Arbeiten zu unterrichten. In den einzelnen Vorträgen werden die sich aus der Gasttheorie, aus den elektrolytischen Vorgängen, aus den Erscheinungen an radioaktiven Körpern, aus der Untersuchung von Kristallen mit Hilfe von Röntgenstrahlen und aus den neuen Forschungen über die Erzeuger der Linienspektren für die Atomtheorie sich ergebenden Folgerungen dargestellt und so ein anschauliches Bild davon gegeben, wie es durch das Zusammenwirken der auf den verschiedensten Gebieten arbeitenden Forscher schliesslich gelungen ist, unsere Kenntnisse über den Aufbau der Materie ganz wesentlich zu vertiefen.

Aus der Sammlung aus Natur und Geisteswelt²⁾ sind zwei in zweiter Auflage vorliegende Bändchen anzuzeigen:

Die Einführung in die organische Chemie von B. Bavink und eine kurze Darstellung der Photochemie von G. Kümmel. Beide Verfasser sind mit Erfolg bestrebt gewesen, ihre als erste Einführung auch für Nichtchemiker bereits bewährten Schriften unter Heranziehung aller neueren Ergebnisse der Forschung noch weiter zu verbessern.

Auch die in der Sammlung Göschen erschienene Schrift von Hugo Kauffmann über «Allgemeine und Physikalische Chemie. Erster Teil»³⁾ liegt in zweiter Auflage vor. Entsprechend dem ganzen Charakter dieser Sammlung ist sie mehr für ein wirkliches Studium bestimmt, und es ist dem Verfasser gelungen, auf engem Raume den Stoff so darzustellen, dass das kleine Buch sowohl zur ersten Einführung, wie zum Wiederholen von vielen Studierenden gern benutzt werden wird.

¹⁾ Verlag von J. Engelhorns Nachf., Stuttgart 1918. — ²⁾ B. G. Teubners Verlag, Leipzig und Berlin 1918. — ³⁾ G. J. Göschen, Berlin und Leipzig 1917.

Als Sonderausgabe der Chemisch-technischen Vorträge ist eine Monographie von H. Simonis¹⁾ über die Chromone erschienen, auf die wir an dieser Stelle nur hinweisen können.

Die Kontrolle und Herstellung von Saccharin hat Oskar Beyer²⁾ in einem kleinen Buche dargestellt, das einerseits als Wegweiser für Zollaboratorien, Apotheker und Chemiker dienen, andererseits aber auch «den gebildeten Laien in die Lage versetzen soll, eine Substanzkontrolle praktisch auszuführen». Ob dieser letztere Zweck überhaupt durch eine derartige Schrift erreicht werden kann, erscheint nicht ganz sicher, besser wäre es vielleicht gewesen, wenn der Verfasser sich lediglich auf den erstgenannten Zweck beschränkt hätte, da er dann manches für den Chemiker Selbstverständliche hätte weglassen können und dadurch Raum für eine an verschiedenen Stellen wünschenswerte grössere Vertiefung gewonnen hätte. Immerhin wird die kleine Schrift auch so in vielen Fällen von Nutzen sein können.

Die Grundwasserverhältnisse der Stadt Lübeck und ihrer Umgebung hat der inzwischen verstorbene Paul Friedrich³⁾ unter Heranziehung aller vorhandenen Einzeluntersuchungen zusammenfassend dargestellt und damit einen auch über den Kreis der eigentlichen Interessenten hinaus wertvollen Beitrag zur Erforschung der Grundwasserverhältnisse überhaupt und besonders der in der norddeutschen Tiefebene geliefert.

L. Fresenius.

Membranfilter. Unter diesem Namen beschreiben R. Zsigmondy und W. Bachmann⁴⁾ eine neue Art von feinporigen Filtern. Dieselben bestehen aus Membranen, welche durch Eintrocknen von nicht ganz einfach zusammengesetzten Lösungen gewisser Kolloide unter Einhaltung ganz bestimmter Bedingungen erhalten werden und die entweder pergamentartige Beschaffenheit oder auch das Aussehen des Glanzpapiers oder des weissen Glacéhandschuhleders haben und so widerstandsfähig sind, dass sie jede festhaftende Stütze entbehrlich machen. Sie können willkürlich in verschiedener Dicke (von mehreren Hundertstel bis $\frac{1}{10}$ mm und mehr) und Porenweite hergestellt werden und sind deshalb geeignet, sowohl die eigentlichen Ultrafilter zu ersetzen, als auch überhaupt sehr fein suspendierte Stoffe zurückzuhalten⁵⁾. Man kann sogar, wie die Verfasser zeigen, aus Mischungen verschiedener Sole von verschiedenem Dispersitätsgrad, durch aufeinander folgende Anwendung verschieden feinporiger Membranfilter die einzelnen Stoffe getrennt abscheiden, z. B. Berlinerblau und Benzopurpurin.

Die Membranfilter haben also die gleiche Verwendbarkeit wie die bisher als Ultrafilter in Vorschlag gebrachten Gallertfilter⁶⁾, sind aber

¹⁾ F. Enkes Verlag, Stuttgart 1917. — ²⁾ Verlag von Rascher & Co., Zürich 1918. — ³⁾ Verlag von Gebrüder Borchers, G. m. b. H., Lübeck 1918.

⁴⁾ Ztschrift. f. anorg. Chem. **103**, 119 (1918). Nach eingesandtem Sonderabdruck.

⁵⁾ Die Anfertigung und den Vertrieb dieser Membranfilter hat die Firma E. de Haën, chemische Fabrik List in Seelze bei Hannover übernommen.

⁶⁾ Vergl. diese Ztschrift. **46**, 589, 779; **48**, 109; **51**, 484.