

Уральская обл., Тургайская, Сырь-даръянская, Закаспийская.

По Ледебуре (л. с.) видъ этотъ встрѣчается лишь на Кавказѣ, два же слѣдующіе отъ него отличаются и встрѣчаются за Каспіемъ.

3122. *Suchtelenia acanthocarpa* Karel. in Bull. de Moscou 1841, p. 16. — Led. Fl. ross. III. p. 167.

S. calycina *acanthocarpa* O. Kuntze Pl. or. ross. p. 218.

Тургайская обл., Закаспийская обл.

3123. *Suchtelenia uniserialis* Led. Fl. ross. III. p. 169.

Сѣв. Туркменія (Лессингъ, Карелинъ).

566. *Trichodesma* R. Br.

3124. *Trichodesma incanum* (Bge) DC. Prodr. X. 174. — 1846.— Boiss. Fl. or. IV. p. 282. — Липскій Мат. фл. Ср. Аз. III. № 414.

Friedrichsthalia incana Bge Delect. sem. h. Dorpat. 1843. p. VII.

Trichodesma molle DC. Prodr. X. p. 174. — Boiss. Fl. or. IV. p. 281. — Franchet, Pl. d. Turk., Mission Capus, p. 219.

Туз. назв.; Кокъ-гуль (Краузъ въ Аблыкѣ); Чагуты кампера (О. Федченко, Маріанъ); Гоши гургъ (таджикское, О. Федченко, Варзаниноръ).

Сырь-даръянская обл., Самаркандская, Закаспийская. Бухара. Западный Тянь-шань: въ Чимганѣ и окрестныхъ горахъ. Памироалай. Конетъ-дагъ.

567. *Trachelanthus* Kunze.

3125. *Trachelanthus hissaricus* Lipsky, Липскій, Мат. фл. Ср. Аз. № 205.

Памироалай: по обоимъ склонамъ Гиссарского хребта.

3126. *Trachelanthus Korolkowi* Lipsky, Липскій, Мат. фл. Ср. Аз. № 204.

Западный Тянь-шань: въ долинѣ р. Пскемъ.

3127. *Trachelanthus seravschanicus* B. Fedtsch. n. sp.

Perennis. Caulis erecti usque fere metralis, glaberrimi. Folia (radicalia desunt) caulina numerosa, inferiora versus apicem attenuata, cetera sessilia, basi fere amplexicaulia, glabra, subtus tuber-

culis calcareis parce obsita, oblonga vel oblongolanceolata, margine breviter serrulata. Inflorescentia paniculata, panicula laxiuscula, ramis brevibus paucifloris; pedicelli graciles calyces superantes. Calycis laciniae lanceolatolineares margine setulosae, acutae; corollae ignotae; nuculae convexae, quam in speciebus affinibus minores, margine incrassato, dense breviter echinatoglochidiato, disco brevius glochidiato.

Отъ близкаго Т. Королкови Lipsky отличается сразу уже по плодовидно газубреннымъ краямъ листьевъ.

Памироалай, Зеравшанъ: Шутъ (Кашка-дарья), 7000', зона хвойныхъ деревьевъ (Juniperus), VII. 1893 (В. Комаровъ!).

568. *Solenanthus* Led.

3128. *Solenanthus Kuschakewiczi* Lipsky Mat. фл. Ср. Аз. № 195 и 397.

Kuschakewiczia turkestanica Regel et Smirnow in Acta H. Petrop. V. p. 626, № 69.

Сыръ-дарьинская обл., Самаркандская. Бухара, Тянь-шань, Памироалай.

3129. *Solenanthus circinnatus* Led. Fl. alt. I. 193. — Led. Fl. ross. III. 170. — Boiss. Fl. or. IV. p. 270.

Семипалатинская обл., Семирѣченская. Тарбагатай, Тянь-шань, Памироалай.

3130. *Solenanthus tenuiflorus* Schrenk in Bull. phys.-math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 194. — Led. Fl. ross. III. 170. — Липскій, Мат. фл. Ср. Аз. II. № 196.

Акмолинская обл.: Улутау (Шренкъ).

Единственнымъ достовѣрнымъ мѣстонахожденіемъ этого вида является высказанное (у Липскаго, л. с., оно ошибочно отнесено къ Семипалатинской области). Указаніе Франше по матеріалу Капю для ущелья Чукалыкъ не достовѣрно.

3131. *Solenanthus petiolaris* DC. Prodr. X. 164. — Boiss. Fl. or. IV. p. 270. — Липскій, Мат. фл. Ср. Аз. II. № 197.

S. tenuiflorus, Регель, Опис. нов. видовъ № 138 въ Пут. въ Турк. А. П. Федченко, вып. 18, стр. 59. — 1881. — О. Федченко, Списокъ растеній собр. въ 1869—1871 г., № 949.