1908	Greenw. M. T.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p \cdot \Delta$	δ app.	$\log p \cdot \Delta$	Red. ad l. app.	*
Oct. 12	16 ^h 10 ^m 36 ^s	-0 ^m 25 ^s 32	-4' 32".2	14,7	19 ^h 37 ^m 37 ^s 39	9.867	+54° 53' 17"	0.339	+0.67 +22.8	19
13	15 35 53	-0 27.98	+1 6.9	15,7	19 33 32.17	9.834	+53 11 32.1	0.247	+0.63 +22.6	20
14	15 2 49	-0 18.59	+3 15.2	13,8	19 29 48.70	9.797	+51 28 48.2	0.154	+0.58 +22.2	21
15	16 32 11	+0 39.87	+1 51.8	16,7	19 26 7.96	9.826	+49 36 34.6	0.563	+0.58 +22.0	23
16	15 31 39	-0 45.99	+7 39.7	16,7	19 23 6.95	9.796	+47 55 4.1	0.427	+0.58 +21.7	24
17	15 18 4	-0 5.10	+2 55.8	19,9	19 20 16.08	9.778	+46 9 56.6	0.432	+0.56 +21.3	25
19	16 29 44	-1 5.53	+4 14.2	15,7	19 15 8.36	9.770	+42 33 20.6	0.669	+0.54 +20.4	26
20	15 33 19	+0 23.03	-0 24.8	18,7	19 13 2.13	9.755	+40 52 41.9	0.584	+0.52 +19.9	27
21	16 18 13	+0 18.79	+6 8.1	22,7	19 10 59.39	9.747	+39 5 45.3	0.689	+0.52 +19.4	28
22	15 44 51	-0 1.55	-6 41.0	18,7	19 9 11.79	9.738	+37 25 17.9	0.654	+0.52 +19.0	29
27	14 24 41	-0 20.43	+1 44.3	15,4	19 2 10.47	9.680	+29 20 13.5	0.629	+0.52 +16.7	31
30	14 45 48	-0 21.24	-1 52.0	15,7	18 59 10.05	9.677	+24 46 27.7	0.701	+0.54 +15.2	32
31	12 3 13	-1 7.08	-0 17.2	10,7	18 58 25.28	9.513	+23 29 27.2	0.547	+0.55 +14.8	33
Nov. 17	11 33 53	+0 17.82	+2 14.8	19,9	18 51 24.21	9.550	+ 3 55 1.4	0.750	+0.59 + 7.5	34
Dec. 1	11 15 25	-0 27.32	-5 46.1	12,5	18 50 19.83	9.595	- 6 51 30.2	0.792	+0.65 + 3.8	35

Right ascensions marked * were measured with the micrometer; all others by transits.

Mean places of comparison stars for the beginning of the year.

*	α	δ	Authority	*	α	δ	Authority
1	6 ^h 46 ^m 22 ^s 49	-11° 49' 49".3	BD -11° 16' 59, cp. with 2	19	19 ^h 38 ^m 2 ^s 04	+54° 57' 11".1	AG Cbr M. 6142
2	6 44 12.59	-11 44 53.6	AG Cbr M.	20	19 33 59.52	+53 10 2.6	" 6105
3	6 41 46.75	-10 11 53.9	BD -10° 16' 83, cp. with 4	21	19 30 6.71	+51 25 10.8	BD +51° 26' 13, cp. with 22
4	6 39 8.84	-10 13 28.9	AG Cbr M.	22	19 27 23.25	+51 32 0.4	1/2 (AG Cbr M. 6043 + Newcomb F. C. 1260)
5	6 38 8.49	- 8 33 8.6	BD -8° 15' 29, cp. with 6	23	19 25 27.51	+49 34 20.8	AG Bo 13032
6	6 35 37.72	- 8 24 36.1	AG Ott 2085	24	19 23 52.36	+47 47 2.7	" 12988
7	6 14 51.84	+ 4 40 43.4	AG Alb 2119	25	19 20 20.62	+46 6 39.5	" 12922
8	6 12 45.44	+ 6 28 26.3	Micr. comp. with 9	26	19 16 13.35	+42 28 46.0	" 12852
9	6 11 1.02	+ 6 34 0.1	AG Lpz II 2752	27	19 12 38.58	+40 52 46.8	" 12774
10	21 35 20.51	+73 15 14.6	Micr. comp. with 11	28	19 10 40.08	+38 59 17.8	AG Lu 8237
11	21 30 37.36	+73 15 17.1	AG Do	29	19 9 12.82	+37 31 39.9	BD +37° 33' 72, cp. with 30
12	21 19 18	+72 21	BD +72° 9' 83	30	19 10 25.90	+37 37 16.4	AG Lu 8232
13	20 56 49.49	+70 4 52.9	AG Chri 3266	31	19 2 30.38	+29 18 12.5	AG Cbr E. 9580
14	20 41 41.45	+68 50 11.1	BD +68° 11' 43, cp. with 15	32	18 59 30.75	+24 48 4.5	AG Berl B 6811
15	20 47 32.02	+68 47 48.3	AG Chri 3238	33	18 59 31.81	+23 29 29.6	" 6810
16	20 20 58.81	+66 2 40.8	Micr. comp. with 17	34	18 51 5.80	+ 3 52 39.1	AG Alb 6422
17	20 21 6.72	+65 54 50.2	Chri 28, A. N. 4285	35	18 50 46.50	- 6 45 47.9	AG Ott 6449
18	20 14 24.36	+64 31 35.7	AG Hels 11245				

The positions of the stars from AG Do and AG Cbr M. (southern zone) were furnished through the courtesy of the directors of the observatories.

Ausbrüche der Sonnentätigkeit, beobachtet und gemessen an Sonnenflecken.

Von Wilhelm Krebs.

In A. N. 4270 sind Ausbrucherscheinungen an der Sonnenoberfläche, durch welche Fleckenmassen schlierenförmig emporgetrieben und über andere Fleckenpartien gelagert wurden, von mir beschrieben. Die Überlagerung wurde damals zwei Schlieren zu teil. Es erscheint von Wert hier nachzutragen, daß sie nahezu parallel bei beiden Schlieren und im wesentlichen von Westen nach Osten erfolgte. Dieser Richtung der Überlagerung entsprach bei der größeren Winkelgeschwindigkeit der höheren Schichten ein Zurückbleiben

der von unten aufgestiegenen Massen. Durch dieses Zurückbleiben wird der Schluß auf Ausbruch dieser Schlieren noch erhärtet.

Das Zurückbleiben nach Osten steht in einem sehr einfachen Verhältnis zur Höhenänderung; dieses Verhältnis ist schon zur Korrektur der von mir in Nr. 4267 der A. N. veröffentlichten Berechnung der Tiefen-Unterschiede von Sonnenflecken verwendet. Im folgenden ist es noch etwas genauer formuliert.

Nennen wir u den der Zwischenzeit der Beobachtungen entsprechenden Rotationswinkel der Sonne, H die als momentan erfolgt angesehene Höhenänderung und S den beobachteten Betrag des Zurückbleibens, so ist $S = H \operatorname{tg} u$, wobei u aus der beobachteten Bewegung des Fleckens zu bestimmen ist. Als lineare Einheit ist im folgenden 1 Megameter = 1000 km angenommen. Die so erzielte Genauigkeit genügt für diese ersten Versuche auf einfachem planimetrischem Wege sich Rechenschaft zu geben über Höhen- und Tiefen-Unterschiede auf der Sonne.

Als Zwischenzeit t ist die Zeitstrecke angenommen bis zu der nächstvorhergehenden Aufnahme, von der aus gemessen wurde. Die so erhaltenen Beträge geben deshalb nur ein Minimum der Höhenänderung H an, wenn jene Ausgangsphase von den ausgemessenen Gebilden noch nichts erkennen ließ. Das gilt für die 1908 Aug. 7 beobachteten beiden Schlieren. Von ihnen war zuletzt $12\frac{1}{2}$ Stunden vor dieser Aufnahme nichts zu sehen gewesen.

Die Messungen der relativen Bewegung ergaben

für I, nördliche Schliere 52 Megameter
für II, südliche Schliere 90 »

Die Reduktion dieser durch die Perspektive beeinträchtigten Werte auf senkrechte Lage zur Gesichtslinie ergab $S = 65$ Meg., bzw. $S = 112$ Meg. und damit für $u = 7^\circ 15'$ folgende Werte der Höhenänderung:

I 506 Meg. II 872 Meg.

Diese Zahlen erscheinen reichlich groß, besonders da sie, wie erwähnt, als Mindestwerte aufzufassen sind. Aber sie erheben sich nicht über die Größenordnung der größten bisher gemessenen Protuberanzen-Ausbrüche am Sonnenrande, an denen ja auch nur Mindestwerte der auf die optische Ebene projizierten, über den Sonnenrand hinausragenden Strecken zur Messung gelangt sind.

1909 Mai 13–14 gelang es, an einer ebenfalls schon auf die Westseite vom Mittelmeridian gelangten Sonnenfleckengruppe Schlieren zu verfolgen, deren eine, die westlichste, am 14. sich ebenfalls über den Hauptteil der Gruppe legte. Die Verlagerung der Schlieren nach Osten wurde gemessen = 17.5 Meg., red. wegen Neigung zur Gesichtslinie = 22 Meg.

Die Berechnung ergab mit $u = 15^\circ 14'$ als Höhenänderung 82 Meg.

Dieselbe Stelle der Sonnenoberfläche gelangte am 4. Juni wieder auf den Mittelmeridian der der Erde zu-

gekehrten Sonnenseite, ohne daß sie zunächst ein Fleckensignal erkennen ließ. Zuerst gelangte 1909 Juni 4 $7^h 35^m$ M. E. Z. in Großflottbek eine neugebildete Gruppe zur Aufnahme. Ihre größte, von Westen nach Osten gehende Ausdehnung konnte auf mehr als 60 Meg. geschätzt werden. Sie war aber in starker Zunahme begriffen. Während der große Kopffleck im Westen nur unbedeutende Veränderungen zeigte, waren die übrigen, an seiner östlichen Rückseite sich anschließenden Teile der Gruppe von Tag zu Tag kaum wieder zu erkennen. Bei diesen bedeutenden Umgestaltungen ergaben sich Formen, die sichtlich auf Schlieren- und Wirbelbildung hinaus kamen. Die wesentlichste Änderung ereignete sich im Laufe von 1909 Juni 7, als die Gruppe ungefähr auf den Meridian 45° westlich vom Mittelmeridian angelangt war. Juni 6 um $18^h 30^m$ M. E. Z. ließ jener Schweifteil ungefähr in seiner Mitte eine Knickung erkennen. Östlich dieser Mitte war die bis dahin östliche Richtung in eine südöstliche umgeändert. Juni 7 $0^h 20^m$ M. E. Z. lagen die Hauptfleckens dieses Schweifes in nahe der gleichen heliographischen Länge mit der Knickung. Um 6^h abends waren sie ihr auf $\frac{1}{3}$ des Weges bis zum Kopffleck nach westlicher Richtung vorangeilt.

Aus diesen Wahrnehmungen ging hervor, daß der östliche Endteil der Sonnenfleckengruppe einem erheblich höheren Niveau angehörte als ihr westlicher Teil und besonders der Kopffleck. Damit stand in Übereinstimmung das vorherige rasche scheinbare Wachstum der Gruppe nach Osten hin. Es war offenbar veranlaßt durch ein Zurückbleiben der in lebhafter Umformung begriffenen Massen infolge raschen Aufsteigens zu größeren Höhen, also durch eine echte Ausbrucherscheinung.

Zur Berechnung dieser Höhenänderung erwiesen sich nur zwei Morgenaufnahmen von 1909 Juni 5 und 6 als hinreichend genau. Es ergaben sich aus ihnen als Verlängerung des Endteils, infolge Zurückbleibens der östlichen Fleckmassen, 40 Megameter. Daraus folgt $S = 50$ Meg. und mit $u = 14^\circ 0'$ als Höhenänderung (Ausbruchshöhe) 202 Meg.

Diese Angaben können bei der Ungenauigkeit der Messungen an freihändig projizierten oder nach dem Augenmaß entworfenen Fleckenzeichnungen keinen Anspruch auf quantitative Schärfe machen. Sie beanspruchen aber qualitative Geltung, als weitere Belege für die Möglichkeit, Ausbrucherscheinungen auf der Sonnenoberfläche auch teleskopisch nachzuweisen.

Großflottbek (Holstein), 1909 Juni 17.

W. Krebs.

Photographische Beobachtungen des Perrineschen Kometen 1909 b.

1909 Aug. 12 $10^h 54^m 2$ Königstuhl $\alpha 1909.0 = 0^h 17^m 6^s 96$ $\delta 1909.0 = +35^\circ 35' 17.6$ Anschlußsterne: AG Lu 104, 121, AG Lei 98. Kopff. Wolf.

1909 Aug. 14 $13^h 6^m 7$ Greenwich $\alpha \text{ app.} = 0^h 21^m 24^s 06$ (9.297n) $\delta \text{ app.} = +36^\circ 35' 14.8$ (0.408) Red. ad l. app. $+1^s 97 + 3.4$. Cowell.

Inhalt zu Nr. 4349. A. Nekrassow. Über die Bahn des Kometen 1811 II. 65. — A. Hnatek. Eigenbewegungen von 68 Fixsternen. 69. — M. Münder. Beobachtungen von kleinen Planeten am Kreuzstabmikrometer. 75. — H. W. Bigelow. Observations of Comets. 75. — W. Krebs. Ausbrüche der Sonnentätigkeit, beobachtet und gemessen an Sonnenflecken. 77. — Photographische Beobachtungen des Perrineschen Kometen 1909 b. 79.