XXVI.

Über die Nachwirkung einer angestregten Muskularbeit auf den Stoffwechsel.

Von

A. Jaquet (Basel).

Vorliegende Versuche habe ich vor einigen Jahren im Anschluß an eigene und fremde Versuche über die Wirkung der Höhenklimas auf den Stoffwechsel unternommen. Da die Forscher, welche sich mit der Höhenklimatechnik befaßt haben, bisher genötigt waren durch anstrengende und langdauernde Märsche im Gebirge ihr Forschungsgebiet zu erreichen, so erschien es berechtigt, die Frage aufzuwerfen, ob durch eine derartige Anstrengung die normalen Funktionen des Organismus nicht auf längere Zeit gestört werden, so daß die reine Wirkung des Höhenklimas auf diese Weise in unberechenbarer Weise beeinflußt wird.

Die bisherigen Versuche über den Einfluß der Muskularbeit auf den Stoffwechsel, welche wir in der Hauptsache Zuntz und seinen Schülern verdanken, haben zwar zum Resultate geführt, daß die erhebliche Zunahme des Gasaustausches während der Arbeit kurz nach Beendigung derselben aufhört, so daß nach einer Ruhepause von wenigen Minuten wir Werte für den Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureproduktion in der Zeiteinheit beobachten, welche den Ruhewerten in nicht ermüdetem Zustande entsprechen.

In den ausführlichen Versuchen von Zuntz und Hagemann über den Stoffwechsel des Pferdes bei Ruhe und Arbeit konnten die Beobachter in keinem einzigen Falle eine irgendwie in Betracht kommende Nachwirkung der Arbeit feststellen, außer wenn die Arbeit zu einer erheblichen Erhöhung der Körpertemperatur des Versuchstieres geführt hatte. Zum gleichen Ergebnis kamen Zuntz und Schumburg in ihren Versuchen über die Physiologie des Marsches. Zwei junge gesunde Männer nach der Vorschrift der deutschen

Felddienst-Ordnung gekleidet und ausgerüstet, zeigten wenige Minuten nach Zurücklegung eines 4 bis 5stündigen Marsches auf ebenem Terrain keine Abweichung der Werte für den Sauerstoffverbrauch verglichen mit den vor der Arbeit ermittelten Ruhewerten. Die Werte für die Kohlensäureproduktion waren dagegen etwas geringer als im ausgeruhten Zustande, wodurch der R. Q. herabgesetzt wurde.

Auf andere Versuche zur Ermittlung der Wirkung der Muskelarbeit auf den Stoffwechsel gehe ich hier nicht näher ein, weil dieselben, u. a. die von Katzenstein von zu kurzer Dauer waren, um zu einer eigentlichen Ermüdung zu führen.

Auf diese experimentellen Vorarbeiten gestützt hielten sich Zuntz und seine Mitarbeiter bei ihren verschiedenen Expeditionen auf den Monte Rosa zur Erforschung der Wirkung des Höhenklimas auf den Stoffwechsel für berechtigt, die morgens früh nüchtern in der Ruhe beobachteten Werte für den Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureproduktion als wirkliche Ruhewerte zu betrachten. Wenn wir indessen die Versuchsergebnisse etwas näher betrachten, so fallen gewisse Unregelmäßigkeiten auf, welche auf die Wirkung eines störenden Faktors hindeuten scheinen. So notieren wir bei verschiedenen Mitgliedern der Expedition von 1901 Unterschiede in den Ruhewerten von Brienz, für welche eine befriedigende Erklärung nicht zu finden ist. Der Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureausscheidung sind am Ende des Aufenthalts in Brienz niedriger als in den ersten Tagen dieser Versuchsperiode. Den letzten Bestimmungen waren aber eine Serie von ziemlich anstrengenden Marschversuchen auf dem Brienzer Rothorn vorausgegangen, deren Wirkung sich möglicherweise nachträglich noch bemerkbar machte. Ferner weist Waldenburg am ersten Tage des Aufenthalts auf dem Col d'Olen wesentlich höhere Zahlen für Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung auf, als an den darauffolgenden Tagen. Dasselbe ist für Loewy und Caspari auf dem Monte Rosa der Fall, während Müller auf dem Monte Rosa bei 4560 m 1 Stunde nach der Ankunft und auch am darauffolgenden Tage niedrigere Werte für den Gaswechsel aufweist als in Berlin.

Die Vermutung liegt nahe, daß die Versuchsergebnisse durch gewisse unbekannte Faktoren getrübt worden sind und unwillkürlich drängt sich die Frage auf, ob den bisherigen Angaben entsprechend, die mit der Bergbesteigung verbundene erhebliche Muskelanstrengung wirklich keine nachteiligen Spuren hinterläßt. Dieser

Zweifel ist um so berechtigter als, wie wir später noch sehen werden, verschiedene Forscher eine Störung des Stickstoffumsatzes im Anschluß an erhebliche Muskelanstrengungen beobachtet haben, welche mehrere Tage anhielt.

Zur Klärung dieser Frage habe ich eine Reihe von Versuchen begonnen, welche den Einfluß einer bis zur Ermüdung gesteigerten Muskelanstrengung auf den Stoffwechsel feststellen sollte. Meine Absicht war, diese Versuche zunächst im Tieflande zu machen, um dieselben dann später unter möglichst ähnlichen Versuchsbedingungen zu wiederholen an einem Orte im Hochgebirge, welcher per Bahn, also unter Ausschluß einer größeren Muskelanstrengung erreichbar wäre. Es war mir aber bisher nur möglich, den ersten Teil meines Programms auszuführen, so daß ich vorläufig nur über die Ergebnisse der Tieflandversuche berichten kann.

Als Versuchsstation wählte ich das leicht erreichbare und bequem angelegte Bahntracé der Drahtseilbahn St. Imier-Sonnenberg im Berner Jura. In zuvorkommender Weise wurde mir von der Verwaltung ein Lokal im Stationsgebäude Sonnenberg zur Aufstellung meiner Apparate zur Verfügung gestellt und die Erlaubnis erteilt, meine Marschversuche auf der dem Bahnkörper entlang angelegten Treppe zu machen. Die Anfangsstation St. Imier befindet sich 832,8 m über Meeresspiegel; von derselben führt die Bahn mit einer Anfangssteigung von 30 Proz., welche progressiv bis zu 60 Proz. zunimmt, zur 1173,6 m gelegenen Endstation auf dem Sonnenberg. Die Linie hat eine Länge von 736 m und die Zahl der Stufen auf der ganzen Strecke beträgt 1552. Diese 1552 Stufen mit einem Höhenunterschied von 340,7 m legte ich gewöhnlich in 45 Minuten zurück.

Nach einer Vorperiode in Basel, während welcher ich täglich den Gaswechsel in der Ruhe morgens früh nüchtern bestimmte, zog ich nach St. Imier zur Vornahme der Arbeitsversuche. Die Versuche wurden alle morgens früh nüchtern gemacht, etwa 13 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme. Unmittelbar nach der Ankunft wurden Pulsfrequenz und Blutdruck bestimmt und eine sphygmographische Kurve aufgenommen. Darauf folgte eine Periode vollständiger Körperruhe in einem Liegestuhl und etwa 1 Stunde nach beendigter Arbeit wurde der erste Respirationsversuch gemacht.

Als Respirationsapparat benutzte ich einen großen Spirometer von 150 Liter Inhalt, sorgfältig kalibriert und mit einer Visiervorrichtung versehen zur genauen Ablesung an der Skala. Die Genauigkeitsgrenze der Ablesungen betrug 0,1 Liter. Zur Korrektur der

Temperatur war der Spirometer mit einem empfindlichen Thermometer versehen. Durch eine genau gearbeitete Suspension der Glocke war der Widerstand auf ein Minimum herabgesetzt; derselbe überstieg 2 mm Wasser nicht und war bei der Atmung nicht fühlbar. Mit Hilfe eines mit zwei Darmventilen versehenen Mundstücks wurde Außenluft eingeatmet, während die Ausatmung in den Spirometer erfolgte. Die Dauer eines Versuchs betrug 16—18 Minuten.

Ruheversuche.

Datum 1905	Zahl der Atemzüge	! Atemzug reduziert	Atemgröße p.Min. in L	O pro Min. in cem	CO ₂ pro Min. in cem	R. Q.
14. VII.	16.2	416	6.74	269	231	0.861
15. VII.	16.4	400	6.52	246	229	0.930
18. VII.	16.2	408	6.62	266	236	0.886
21. VII.	17.6	412	6.64	247	235	0.950
26. VII.	16.3	411	6.70	272	244	0.898
27. VII.	17.0	397	6.80	254	242	0.953
28. VII.	17.8	398	7.14	265	253	0.951
Mittelwert	16.8	406	6.74	260	239	

Arbeitsversuche auf dem Sonnenberg.

	Zahl der Atemzüge	! Atemzug reduziert	Atemzüge p.Min. i. L	O pro Min. in cem	CO ₂ pro Min. in cem	R. Q.
--	----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------

I. Einmalige Besteigung 5. VIII. 1905.

53' nach Arbeit	20	315	6.29	333	224	0.666
3 St. 53' " "	—	—	5.94	293	213	0.726
24 St. 58' " "	19	314	6.0	266	206	0.793

II. 7. III. 1905.

58' nach Arbeit	18.8	326	6.10	278	215	0.772
3 St. 48' " "	19	306	5.8	256	200	0.779
6 St. 3' " "	19.6	329	6.46	254	203	0.796
24 St. " "	19.4	326	6.27	251	218	0.869

III. Zweimalige Besteigung 10. VIII. 1905.

54' nach Arbeit	21	305	6.44	276	226	0.818
3 St. 25' " "	20	294	5.87	256	204	0.797
5 " 54' " "	19	342	5.79	274	207	0.757
25 " 24' " "	20	295	5.90	255	202	0.792
48 " 21' " "	19.4	305	5.91	252	201	0.799

	Zahl der Atemzüge	1 Atemzug reduziert	Atemgröße p.Min.i.L.	O pro Min.	CO ₂ in cem	R. Q.
--	-------------------	---------------------	----------------------	------------	------------------------	-------

IV. Dreimalige Besteigung 14. VIII. 1905.

53' nach Arbeit	20.7	323	6.69	303	227	0.747
3 St. " "	19.2	319	6.14	290	211	0.725
6 " 8' " "	19.2	313	6.02	273	204	0.748
21 " 16' " "	18	324	5.77	272	217	0.798
45 " 10' " "	18.8	318	5.96	260	218	0.837

V. Viermalige Besteigung 18. VIII. 1905.

56' nach Arbeit	20.5	306	6.28	306	223	0.730
4 St. 16' " "	17.4	322	5.6	276	206	0.746
20 " " "	17.7	326	5.75	275	209	0.759

VI. 21. VIII. (am Tage vorher Ausflug 5 Stunden.)

1 St. nach Arbeit	20.7	328	6.79	319	232	0.728
4 " " "	18.8	337	6.33	289	218	0.754
21 " 30' " "	18	323	5.81	270	202	0.752
46 " " "	18	302	5.44	248	197	0.782

Marsch. Läuferfingen—Belchen—Kellenkopf.

	Zahl der Atemzüge	1 Atemzug reduziert	Atemgröße pro Min. in L	O pro Min.	CO ₂ in cem	R. Q.
1. Ruheversuch	18	396	7.12	282	233	0.826
2. " "	17.4	411	6.91	252	219	0.871
3. " "	16.7	396	6.6	256	230	0.901
4. " "	17	400	6.85	269	244	0.906
Mittelwert Arbeitstag	17.3	401	6.87	265	232	
2 Stund. 25 Min. n. Arb.	21.9	407	8.92	363	286	0.788
15 " " "	17.5	373	6.54	241	183	0.760
39 " " "	17.6	368	6.5	246	200	0.812
63 " " "	16.2	395	6.4	252	222	0.881
87 " " "	16.8	399	6.71	244	228	0.936

Marsch. Erschwil—Hohe Winde—Passwang.

2 Stund. 40 Min. n. Arb.	20	398	7.96	317	257	0.810
13 " " "	16.76	381	6.39	172	142	0.823
37 " " "	16.51	401	6.61	235	197	0.839
61 " " "	17	388	6.60	260	215	0.826
85 " " "	17.54	398	6.97	272	228	0.837

Die Analyse der Spirometerluft wurde nach der sehr exakten Methode von Petterson und Palmquist vorgenommen. Die Respirationsversuche wurden am Arbeitstage noch ein- bis zweimal wiederholt. Die Zeit zwischen zwei Versuchen wurde für die Gasanalyse verwendet. Nach Beendigung des letzten Respirationsversuchs fand die erste Nahrungsaufnahme statt. An den Versuchstagen wurden nur zwei Mahlzeiten eingenommen. Am folgenden Tage fuhr ich per Bahn auf den Sonnenberg zur Vornahme eines Respirationsversuchs.

Wenn wir uns die in beiliegender Tabelle zusammengestellten Versuchsergebnisse etwas genauer ansehen, so fällt zunächst eine geringe Zunahme der Atemfrequenz gegenüber der Norm auf. Im ausgeruhten Zustande nimmt die Zahl der Atemzüge zwar etwas ab; sie bleibt indessen immer etwas höher als bei den Ruheversuchen in Basel. Das reduzierte Volum eines Atemzuges ist der Höhendifferenz entsprechend deutlich geringer als bei den Ruheversuchen in Basel.

Im ersten Versuche konstatieren wir eine Stunde nach der Arbeit eine sehr beträchtliche Zunahme des Sauerstoffverbrauchs, welche in geringerem Grade noch drei Stunden nach der Arbeit fortbesteht. Diese Zunahme ist im zweiten Versuche nur angedeutet und nach 3 Stunden verschwunden. Zur Erklärung dieser Differenz mag der Umstand in Betracht kommen, daß ich am Tage vor dem ersten Versuche mit der Installation des Laboratoriums beschäftigt, angestrengt hatte arbeiten müssen. Das Tragen und Auspacken der schweren Kisten, die Montierung der Apparate erforderte einen erheblichen Kraftaufwand und am Abend fühlte ich mich recht müde. Auch hatte ich am Versuchstage die Treppe zum ersten Male bestiegen, und die mir noch ungewohnte Bewegung wurde offenbar mit einem höheren Kraftaufwand als bei den späteren Versuchen verrichtet. Der zweite Versuch dürfte somit erst als maßgebend betrachtet werden. Hier ist die geringe Zunahme des Sauerstoffverbrauchs, welche eine Stunde nach der Arbeit noch besteht, nach weiteren zwei Stunden vollständig verschwunden.

Im Versuch III wurde die Treppe zweimal, im Versuch IV dreimal und im Versuch V und VI je viermal hintereinander bestiegen. Nach Ankunft auf dem Sonnenberg fuhr ich per Bahn hinunter, um sofort die nächste Steigung vorzunehmen. Zwischen zwei Besteigungen betrug die Ruhepause durchschnittlich 20 Minuten. Die vier Aufstiege in den Versuchen V und VI erforderten ungefähr vier Stunden; während dieser Zeit wurden 6208 Stufen und eine

Höhe von 1363,7 m erklettert. Im Versuche VI hatte ich am Tage vorher einen Ausflug von 5 Stunden auf den Chasseral gemacht.

Während im Versuche III die Sauerstoffzahlen nur unbedeutend von den Ruhewerten in Basel differieren, tritt im Versuche IV, also nach dreimaliger Besteigung des Berges eine deutliche Zunahme des Sauerstoffverbrauches zutage, welche drei Stunden nach der Arbeit noch besteht. Sechs und einundzwanzig Stunden nach der Arbeit sind die Sauerstoffzahlen noch hoch; indessen nähern sie sich bereits so sehr den Normalwerten, daß wir nicht mehr berechtigt sind von einer eigentlichen Erhöhung zu sprechen. Das Resultat der Versuche V und VI stimmt hinsichtlich der Sauerstoffwerte mit demjenigen von Versuch IV überein.

Betrachten wir hingegen die Kohlensäurewerte, so konstatieren wir kurz nach der Arbeit eine Kohlensäureproduktion, welche von den Normalwerten noch wenig abweicht, immerhin etwas geringer ist als letztere. Es erfolgt aber nicht wie für den Sauerstoff baldige Rückkehr zur Norm, sondern eine weitere Abnahme der Kohlensäureproduktion, welche nach 24, ja sogar nach 48 Stunden noch deutlich vorhanden ist. Wir werden noch später auf die Ursache dieser Verminderung der Kohlensäureausscheidung und der damit verbundenen Herabsetzung des R. Q. zurückkommen.

Die in obigen Versuchen verrichtete Muskularbeit war noch recht bescheiden, und wenn ich auch am Ende der Vers. V und VI eine gewisse Müdigkeit verspürte, so war dieselbe im Verlauf der nächsten Stunden verschwunden. Ich hielt es deshalb für angezeigt, den Einfluß größerer Leistungen zu untersuchen und machte im Spätsommer desselben Jahres und ein Jahr später noch zwei diesbezügliche Versuche.

Im ersten Versuche machte ich nach einer Vorperiode von vier Tagen zur Herstellung des Stickstoffgleichgewichts einen Ausflug von Läuelfingen (Baselland) über den Belchen nach Schöenthal und über den Dürenberg, Bielstein auf den Kellenkopf; dann die Wasserfälle hinunter über Reigoldswil nach Oberdorf. Dabei trug ich einen Rucksack mit einem Gewicht von 8 Kilo. Um halb acht Uhr von Läuelfingen aufgebrochen, langte ich nachmittags vier Uhr in Oberdorf an. Ich hatte eine Rast von 20 Min. zum Frühstück auf dem Belchen und eine von 40 Min. auf dem Kellenkopf zum Mittagessen gemacht. Das Wetter war ungünstig; es regnete zeitweise stark und infolgedessen war die Gangart etwas schneller als gewöhnlich. Die Lufttemperatur war aber kühl und wiederholte Messungen ergaben, daß meine Körpertemperatur nie über 37,4°

betrug. Die Pulsfrequenz betrug eine Stunde nach der Ankunft in Oberdorf 96. In $7\frac{1}{2}$ Stunden habe ich ungefähr 25 km zurückgelegt und bin dabei ca. 1200 m gestiegen und ebensoviel bergab gegangen. Diese Leistung, welche etwa einem gewöhnlichen Sonntagsausflug entsprechen dürfte, war auch nicht besonders ermüdend. Zwei Stunden nach Beendigung des Marsches war ich wieder in Basel und machte einen ersten Respirationsversuch (6 Stunden nach der letzten geringfügigen Nahrungsaufnahme).

Wenn wir zunächst die Sauerstoffzahlen betrachten, so finden wir 2 St. 25 Min. nach Beendigung der Arbeit noch eine beträchtliche Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs. Nach 15 Stunden dagegen haben wir Sauerstoffzahlen, welche die untere Grenze der im Ruhezustand beobachteten Werte nicht einmal erreichen. In den weiteren Versuchen nach 39 und 63 Stunden nehmen sie nur wenig zu.

Die Kohlensäureproduktion dagegen, welche zwei Stunden nach der Arbeit noch deutlich erhöht war, sinkt später beträchtlich unter die Norm und hat nach 39 Stunden die Ruhewerte noch nicht wieder erreicht. Die am Arbeitstage gewonnenen Zahlen sind zwar keine reine Nüchternwerte, indem im Laufe vom Tage Nahrung eingenommen worden war. Die letzte Nahrungsaufnahme hatte aber sechs Stunden vor dem Respirationsversuch stattgefunden, so daß der Einfluß der Verdauung auf den Gaswechsel die hohen Werte für O und CO₂ kurz nach der Arbeit nicht zu erklären vermag.

In einem zweiten Versuch ging der Marsch über Erschwil (Solothurn) auf die Hohe Winde und den Paßwang nach Reigoldswil. Dabei trug ich ebenfalls einen 8 Kilo schweren Rucksack. Die Dauer des Marsches betrug 10 Stunden; davon sind abzuziehen eine Rast von 30 Minuten auf der Hohen Winde und eine von 45 Minuten auf dem Paßwang. Den zurückgelegten Weg schätze ich auf 24 km und die bestiegene Höhe auf ca. 1000 bis 1100 Meter. Es handelt sich also wiederum in diesem Falle um eine mäßige Leistung, welche in keiner Weise mit den Anstrengungen einer stärkeren Bergtour in den Alpen verglichen werden kann.

Zwei Stunden und vierzig Minuten nach Beendigung der Arbeit ist eine beträchtliche Vermehrung des Sauerstoffverbrauches vorhanden. Nach 13 Stunden sind dagegen auffallend niedrige Zahlen für den Sauerstoff zu verzeichnen. Im zuletzt erwähnten Versuche hatten wir bereits eine Herabsetzung des Sauerstoffverbrauches am Tage nach der Arbeit bis auf die untere Grenze der Normalwerte festgestellt; hier aber begegnen wir einer Sauerstoffverminderung

von 30 Proz. der Normalwerte. 24 Stunden später steht der Sauerstoffverbrauch mit 235 ccm pro Minute noch unter den normalen Ruhewerten und erst nach 61 Stunden ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Ich habe keinen Grund zur Annahme eines Versuchsfehlers; die Respirationsversuche und die Gasanalysen wurden mit der gewohnten Sorgfalt angestellt, so daß ich an der Wirklichkeit einer Herabsetzung der Oxydationsvorgänge im Reparationsstadium nach einer größeren Arbeit zu zweifeln keinen Grund habe.

Die Verhältnisse bezüglich der Kohlensäureproduktion decken sich mit denjenigen des vorletzten Versuchs: zunächst beobachten wir kurz nach der Arbeit eine mäßige Zunahme, dann am Tage darauf eine beträchtliche Abnahme der Kohlensäurewerte, welche noch am dritten Tage, wenn auch in schwächerem Grade, besteht.

Ein Unterschied besteht insofern zwischen den zwei zuletzt besprochenen Versuchen, als der Ausflug auf den Belchen im September 1905 in gut trainiertem Zustand stattfand, während ich den Ausflug auf die Hohe Winde im September 1906 untrainiert machte, indem ich in jenem Sommer durch mancherlei Geschäfte verhindert worden war, Bergtouren zu machen.

Diese Versuche waren beendet, als im Jahre 1907 eine Arbeit von Porges und Pribram aus dem Zuntzsehen Laboratorium über den respiratorischen Stoffwechsel nach ermüdender Arbeit erschien. Die Verfasser experimentierten an einem tracheotomierten Hunde, den sie auf der geeigneten Tretbahn arbeiten ließen. Diese Versuche berichtigten die Angaben früherer Forscher in dem Sinne, als Porges und Pribram sich überzeugten, daß eine stundenlange ermüdende Arbeit eine Erhöhung des Gaswechsels verursacht, welche in gewissen Fällen noch drei bis fünf Stunden nach Beendigung der Arbeit wahrzunehmen ist; indessen konnten sie eine nachfolgende Herabsetzung des Sauerstoffverbrauchs unter die Norm nicht beobachten. Sie notierten zwar einige sehr niedrige Zahlen, dieselben sind nicht niedriger als die kleinsten Zahlen im Ruhezustand. Eine Herabsetzung der Kohlensäureproduktion unter die Norm haben Porges und Pribram auch nicht beobachtet.

Die in unserem letzten Versuche beobachtete Herabsetzung des Sauerstoffverbrauches nach geleisteter Muskularbeit ist indessen nicht einzig dastehend. Wenn wir die Versuchsprotokolle der Monte Rosa-Expedition sorgfältig durchmustern, so finden wir, daß z. B. Waldenburg am 7. September auffallend niedrige Zahlen für den Sauerstoffverbrauch aufweist; diese Zahlen sind sogar kleiner als die Ruhewerte in Berlin. In einer Fußnote finden wir die Be-

merkung: „Analyse wohl falsch, Ursache unklar, Zahlen nicht berücksichtigt.“ Am 4. und 5. September hatte aber Waldenburg ziemlich anstrengende Marschversuche auf den Cold'Olen bei 45 prozentiger Steigung gemacht. Bei Müller sind die Werte für den Sauerstoffverbrauch und für die Kohlensäureausscheidung auf dem Col d'Olen und auf dem Monte Rosa niedriger als in Berlin. Am 7. und 8. September hat endlich Loewy auf dem Monte Rosa einen Sauerstoffverbrauch, der demjenigen im Ruhestand in Berlin entspricht, während er am 3. und 4. bedeutend höher war.

Somit erscheint die Vermutung gerechtfertigt, daß unter den Nachwirkungserscheinungen nach anstrengender Muskelarbeit ein Sinken des Sauerstoffverbrauchs unter die Norm unter Umständen beobachtet werden kann. Ich wiederhole hier, daß die Muskelleistung in meinen Versuchen durchaus nichts Ungewöhnliches hatte und einem Durchschnittstagesausflug im Jura entsprach.

Wenn wir nun noch einen kurzen Blick auf die R. Q. unserer Versuche werfen, so konstatieren wir ein regelmäßiges Sinken derselben nach der Arbeit. Bei kleiner Arbeit steigt der R. Q. bereits nach 24 Stunden wieder an; bei größeren Leistungen bleibt er zwei bis drei Tage unter dem Niveau der Ruhewerte. Diese Abnahme der R. Q. nach der Arbeit ist von den anderen Forschern ebenfalls notiert worden. Sie erscheint auch leicht erklärlich.

Die Lungenventilation ist während der Muskelarbeit erheblich gesteigert. Dadurch wird der CO_2 P. D. der Lungenalveolen herabgesetzt. Dementsprechend sinkt auch der P. D. der CO_2 im Blute. Auf der anderen Seite haben Zuntz und seine Schüler gezeigt, daß die Muskelarbeit mit einer beträchtlichen Produktion von sauer reagierenden Körpern, u. a. Milchsäure, einhergeht. Diese Säuren bemächtigen sich der Alkalien der Säfte unter Bildung von neutralen Salzen. An dieser Neutralisation nehmen die Karbonate und Bikarbonate des Blutes und der Lymphe einen Hauptanteil, indem CO_2 gleichzeitig in Freiheit gesetzt wird. Auf diese Weise ist die Menge der fixen Kohlensäure im Körper am Schlusse einer Arbeitsperiode vermindert. In der nachfolgenden Zeit werden die oben erwähnten sauren Produkte des intermediären Stoffwechsels allmählich verbrannt und die an denselben gebundenen Alkalien werden wieder frei. Diese verbinden sich wiederum mit CO_2 unter Bildung von Karbonaten und Bikarbonaten und dementsprechend nimmt auch die Menge der fixen Kohlensäure wieder zu. Ein Teil der produzierten Kohlensäure wird also in dieser Periode zurückgehalten wodurch das Verhältnis CO_2 : O entsprechend kleiner wird.

Endlich steht die Herabsetzung des R. Q. noch mit der Glykogenverarmung des Körpers im Anschluß an die Arbeitsleistung in Zusammenhang. Nach einer anhaltenden anstrengenden Arbeit hat der Körper den Hauptteil seines Glykogenvorrats verzehrt und er ist zur Erzeugung von Energie im wesentlichen auf die Verbrennung von Eiweiß und Fett angewiesen. Dadurch erhalten wir die kleinen R. Q. der Fett- und Eiweißverbrennung. Aber selbst wenn wir nach vollendeter Arbeit eine gemischte Kost mit reichlich Kohlehydraten genießen, so steigt der R. Q. nicht gleich in entsprechendem Maße, indem der Körper scheinbar die Tendenz hat, seinen Glykogenvorrat zu vervollständigen und zu diesem Zwecke die genossenen Kohlehydrate der Verbrennung zunächst entzieht.

Ich will mich mit diesen Andeutungen begnügen. Eine eingehendere Untersuchung des Verhaltens des R. Q. erfordert andere Untersuchungsmethoden als die, welche mir zur Verfügung stand. Man muß den Gaswechsel während längerer Perioden ununterbrochen bestimmen, um wirklich zuverlässige Resultate zu gewinnen.

Um die Nachwirkung der Muskularbeit auf den Stoffwechsel zu übersehen, müssen notwendigerweise die Versuche über den Gaswechsel durch eine Untersuchung des Stickstoffumsatzes vervollständigt werden.

Die Ansichten über den Einfluß der Muskularbeit auf den Stickstoffumsatz sind noch nicht geklärt. Man hat bei den diesbezüglichen Versuchen weitgehende individuelle Unterschiede konstatiert.

Einige Forscher beobachteten im Anschluß an eine anstrengende körperliche Leistung einen mehrere Tage andauernden beträchtlichen Stickstoffverlust durch den Urin. Bei anderen Beobachtern wurde das Stickstoffgleichgewicht durch eine ähnliche Leistung kaum gestört. So hat Argutinsky eine Vermehrung des Harnstickstoffes von 6 bis 10 g am Tage eines Ausfluges im Gebirge und an den zwei darauf folgenden Tagen festgestellt; Dunlop und Paton haben ebenfalls Verluste von 6 bis 8 g notiert, während in den Versuchen von Hirschfeld und von Kaup ein Einfluß der körperlichen Anstrengung auf den Stickstoffumsatz nicht hervortritt.

Der Stickstoffverlust kann unter Umständen die Folge einer ungenügenden Ration sein, wie Krummacher es an sich selbst feststellen konnte. Durch Erhöhung der Kostration konnte der Stickstoffverlust nach Muskularbeit bedeutend herabgesetzt werden. Dasselbe haben Atwater und Benedict beobachtet. Ihre Versuchsperson arbeitete täglich acht Stunden im Respirationskalori-

meter. Mit einer Ration von 4000 bis 4500 Kal. war noch ein regelmäßiger Stickstoffverlust zu verzeichnen; derselbe hörte auf sobald die Kostration auf 5100 Kal. erhöht wurde. Indessen reicht diese Erklärung nicht für alle Fälle aus. In den Versuchen von Dunlop und Paton bestand trotz ausreichender Kostration ein erheblicher Stickstoffverlust.

Der mehr oder weniger große Prozentsatz an Eiweißstoffen der Kost genügt ebenfalls nicht zur Erklärung des Stickstoffverlustes nach Muskularbeit. Wenigstens war in den Versuchen von Hirschfeld kein Unterschied zu verzeichnen zwischen einer Kost, welche 36 bis 40 g Eiweiß enthielt und einer solchen mit 130 g Eiweiß.

Man hat auch die Vermutung ausgesprochen, daß Unterschiede in der Reaktion auf Muskularbeit davon herrühren könnten, daß die zu den Versuchen herangezogenen Personen mehr oder weniger gut trainiert waren. Wir finden aber neben Athleten und Sportsleuten, welche mit bedeutenden Verlusten an Stickstoff auf eine Muskelanstrengung reagieren, vollständig untrainierte Personen bei welchen die Muskularbeit ohne Einfluß auf den Stickstoffumsatz bleibt.

Nicht ganz gleichgültig scheinen aber die Bedingungen zu sein, unter welchen die Arbeit ausgeführt wird. Oppenheim hatte bereits notiert, daß der Stickstoffverlust zutage trat, wenn die Muskelanstrengung von Dyspnoe begleitet war. Nach Zuntz und Schumburg ist die Lufttemperatur ebenfalls von Bedeutung. Bei einer der Versuchspersonen, welche zu den Versuchen über die Physiologie des Marsches verwendet wurden, war der Stickstoffverlust während einer warmen Periode viel ausgesprochener als wenn die Märsche bei kühlem Wetter ausgeführt wurden.

Bei meinen Versuchen auf dem Chasseral im Jahre 1899 hatte ich am Tage der Ankunft und am darauffolgenden Tag eine Vermehrung der Stickstoffausscheidung mit dem Urin von mehr als 2 g in 24 Stunden beobachtet. Ich hatte diesen Stickstoffverlust auf die Muskularbeit bezogen, obschon die Leistung eine recht bescheidene gewesen war, indem ich bloß den letzten Teil des Weges mit einem Höhenunterschied von 700 Meter zu Fuß zurückgelegt hatte. Indessen meinen Zuntz und seine Schüler, daß es sich da nicht um eine Nachwirkung der Muskularbeit handeln könne, indem bei Kolmer und Müller nach ihrer Ankunft auf dem Briener Rothorn eine ähnliche Zunahme der Stickstoffausscheidung beobachtet wurde, obschon sie die Strecke von Brienz auf den Rothorn per Bahn zurückgelegt hatten. Wenn auch die beiden Forscher am

12. August per Bahn den Rothorn erreicht haben, so haben sie an den zwei vorangehenden Tagen bis zur Ermüdung gearbeitet, so daß das Stickstoffdefizit des 12. August eine Nachwirkung der vorangegangenen Ermüdung sein könnte¹⁾. Die Stickstoffwerte der Monte Rosa-Periode können wir nicht berücksichtigen, indem die Bergkrankheit und die gestörte Nahrungsaufnahme eine sichere Beurteilung der Ursache des beträchtlichen Stickstoffverlustes auf der höchstgelegenen Versuchsstation nicht gestatten.

Die Hypothese von Zuntz, der diesen primären Eiweißzerfall einer spezifischen Reizwirkung der Höhe zuschreibt, schien mir nicht gerade wahrscheinlich, nachdem die Mitglieder der Zuntzsehen Expedition meine Angabe vom Jahre 1899 bestätigen konnten, daß nach wenigen Tagen der Aufenthalt in der Höhe sich durch eine beträchtliche Stickstoffretention kundgibt. Ich hielt es deshalb für angezeigt, einen neuen Versuch anzustellen, bei welchem der Einfluß der Muskelermüdung auf den Stickstoffumsatz unter Ausschluß der Höhenwirkung untersucht wurde.

Dieser Versuch wurde mit dem bereits erwähnten Marschversuch über den Belchen und den Kellenkopf kombiniert. In einer Vorperiode von vier Tagen brachte ich mich in N-Gleichgewicht bei einer genau analysierten Kost, bestehend aus 200 g gesalzenen Rindfleisches, zwei Eiern, $\frac{1}{2}$ Liter Milch, 50 g Butter, 30 g Käse, 400 g Brot, 200 g getrockneten Pflaumen, 30 g Zucker und 5 g Bovril, welche zur Bereitung von 3 Dezil. Fleischbrühe dienten. Als Getränk wurde ferner genossen: schwarzer Kaffee 2 Dezil., Tee 2 Dezil., Rothwein 2 Dezil. Diese Kostration enthielt 23,2 g Stickstoff und entsprach 3350 Kalorien. Diese sehr reichliche Kost hatte den Zweck einen eventuellen Stickstoffverlust nach Muskularbeit zu vermeiden, der auf eine ungenügende Kostration hätte bezogen werden können, wie dies bei den Versuchen von Krummacker, sowie von Atwater und Benedict der Fall war.

Am fünften Tage wurde die Arbeit geleistet, worauf eine Nachperiode von vier Tagen folgte bei genau gleicher Kost und möglichst gleichem Verhalten wie in der Vorperiode.

Das Ergebnis dieses Versuchs habe ich in folgender Tabelle zusammengestellt:

1) S. 121. Der Rest des Tages (21. VIII.) ging hin mit dem Verpacken . . . eine für die als Packer fungierenden Personen ungewohnte und recht anstrengende Muskularbeit. Tabelle IV. Kolmer 10. VIII. Marschversuche. Sehr ermüdet 12. VIII. Labor. Einrichtung. Tabelle VI. Müller 11. VIII. Einpacken der Kisten, sehr anstrengend. 12. VIII. Auspacken.

Urin.

No.	Datum	Menge	Spez Gew.	N	SO ₄ H ₂	Cl	P ₂ O ₅
1	20. IX. 05	1825	1023	15.61	1.32	9.52	3.19
2	21. "	1280	1032	16.18	2.74	8.47	3.47
3	22. "	1250	1031	16.57	2.73	7.70	3.47
4	23. "	1250	1029	15.98	2.68	8.05	3.65
5	24. "	1260	1027	19.23	3.87	5.80	2.75
6	25. "	1110	1031	18.83	3.01	7.58	3.52
7	26. "	1145	1031	18.44	2.98	8.31	3.35
8	27. "	1255	1028	18.55	2.99	9.11	3.58
9	28. "	1285	1028	18.69	3.04	9.41	3.63

Kot.

vom 20.—23. IX: 545 g = 155 Trockenkot = 10.45 g N
Kotstickstoff pro Tag: 2.615.

vom 24.—28. IX: 644 g = 181 Trockenkot = 11.946 N
Kotstickstoff pro Tag: 2.38 g.

Schweiß.

Mit dem Schweiß verlorener Stickstoff am Arbeitstag: 0.532 g.

Wie wir bereits erwähnt haben, enthielt die tägliche Ration 23,21 g Stickstoff. Die tägliche Ausscheidung mit den Fäces betrug 2,61 g, so daß 20,6 g N resorbiert wurden. Vom 21. bis zum 23. Sept. wurden durchschnittlich 16,24 g N mit dem Urin ausgeschieden. Während dieser Periode fand somit eine tägliche Stickstoffretention von 4,36 g statt. Dieselbe ist zum Teil auf die für mich sehr hohe Kostration mit reichlichem Eiweißgehalt zurückzuführen; zum Teil mag sie aber auch eine Nachwirkung der kurz vorher genossenen Ferien sein, indem eine regelmäßige und ausgiebige Körperbewegung den Stickstoffansatz begünstigt.

Am Arbeitstag steigt die Stickstoffausscheidung um volle 3 g und diese Zunahme hält in der Nachperiode an, so daß am letzten Versuchstag 2,45 g N mehr ausgeschieden wurden als durchschnittlich in der Vorperiode. Ich bedauere, den Versuch nicht länger fortgesetzt zu haben; ich hielt aber eine Nachperiode von vier Tagen für ausreichend, indem bei anderen Beobachtern die Nachwirkung der Arbeit sich nie auf mehr als zwei bis höchstens drei Tage erstreckte. In unserem Versuch haben wir zwar keine negative Stickstoffbilanz, sondern bloß eine Herabsetzung des Stickstoffansatzes, für welche keine andere Ursache als die geleistete Arbeit zu finden ist. Vom 24. bis zum 28. September hat der Organismus durchschnittlich 2,51 g Stickstoff mit dem Urin mehr ausgeschieden als

in der Vorperiode, was für die ganze Periode 12,55 g ausmacht. Hier haben wir also zweifellos mit einer Ermüdungserscheinung zu tun, unabhängig von jeder Beeinflussung durch das Höhenklima.

Die Ausscheidung der Schwefelsäure geht mit der Stickstoffausscheidung beinahe parallel: sie nimmt am Arbeitstage beträchtlich zu, und die Zunahme dauert, wenn auch nicht so intensiv, in der Nachperiode, fort. Unter dem Einfluß der Muskularbeit nimmt dagegen die Chlorauscheidung beträchtlich ab. Diese Abnahme ist aber von kurzer Dauer und am folgenden Tage ist der Chlorgehalt des Urins auf die ursprüngliche Höhe wieder gestiegen. Dasselbe ist für die Phosphorsäure der Fall.

Wenn wir nun die aus diesen Versuchen sich ergebenden Schlußfolgerungen zusammenzufassen suchen, so müssen wir uns hüten, voreilig zu verallgemeinern. Wir wissen, daß bei allen diesen Versuchen die individuellen Verschiedenheiten sehr ausgesprochen sind, so daß allgemeine Schlüsse erst auf Grund von Beobachtungen an einer größeren Zahl von Individuen gezogen werden können.

Dieser eine Versuch genügt aber um zu zeigen, daß es Individuen gibt, welche, trotzdem sie aus einer Gebirgsgegend stammen und an Bergtouren gewöhnt sind, nachhaltig auf eine Muskelanstrengung reagieren. Diese Nachwirkung äußert sich sowohl im Gaswechsel wie im Stickstoffumsatz und läßt sich mehrere Tage verfolgen. Wenn nun Leistungen, welche in keiner Weise mit den anstrengenden Touren im Hochgebirge mit schlechten Wegen und Kletterpartien verglichen werden können, bereits derartige Reaktionen zur Folge haben, so ist man berechtigt anzunehmen, daß größere Märsche im Hochgebirge auch nicht ohne Nachwirkung bleiben werden. Es bleibt noch festzustellen, ob es Individuen gibt, bei welchen diese Reaktionen ausbleiben. Vorderhand müssen wir verlangen, daß Versuche zur Erforschung des Stoffwechsels im Hochgebirge unter Ausschluß jeder anstrengenden Muskularbeit angestellt werden. Forscher, die ermüdet auf dem Bergesgipfel anlangen, befinden sich in einem pathologischen Zustand, dessen Intensität und Dauer wir nicht beurteilen können, und sind aus diesem Grunde zur Anstellung physiologischer Beobachtungen nicht geeignet. Die Anstellung von Versuchen unter Ausschluß einer ermüdenden Körperarbeit ist aber mit unseren verschiedenen Bergbahnen, welche uns einen bequemen Transport von Instrumenten und Versuchspersonen gestatten, nicht besonders schwierig. Ich hoffe, daß es mir in absehbarer Zeit möglich sein wird, diese erste Versuchsreise nach meinem ursprünglichen Plane zu vervollständigen.

Literaturnachweis.

1. Zuntz und Hagemann. Unters. über den Stoffwechsel des Pferdes. N. F. Landw. Jahrb., 27. Ergänz., 3. 1898. — 2. Zuntz und Schumburg. Physiologie des Marsches. Bibl. v. Koler, 6. Berlin 1901. — 3. Zuntz, Loewy, Muller u. Caspari. Höhenklima und Bergwanderungen. Berlin, 1906. — 4. Jaquet. Physiolog. Wirkung des Höhenklimas. Rektorats-Programm. Basel 1904. — 5. Porges und Pribram, Respirat. Stoffwechsel nach ermüdender Arbeit. Biochemische Zeitschr., 1907, S. 453. — 6. Argutinsky, Pflügers Archiv. XLVI, 1890, S. 552. — 7. Dunlop, Paton, Stockmann, Maccadam. Journ. of Physiology. XXII, 1897, S. 68. — 8. Krummacker, Pflügers Arch. XLVII, 1890, S. 454 und Zeitschr. f. Biolog. XXXIII, 1896, S. 108. — 9. Atwater und Benedict, Exper. on the Metabolism in Human Body. U. S. Dep. of Agric. Bullet. No. 136, 1903. — 10. Hirschfeld, Virchows Arch. CXXI, 1890, S. 501. — 11. Kaup, Zeitschr. f. Biolog. XLIII, 1902, S. 221. — 12. Oppenheim, Pflügers Arch. XXIII, 1881, S. 446.
-