regungszuständen, wie dem Asthma bronchiale, dem Heufieber usw. gesehen und v. NEUSSER konnte auch experimentell Eosinophilie durch Pilokarpin, den Erreger des parasympathischen Systems erzeugen. In der Literatur sind 2 Fälle von STRISOWER bekannt, bei denen Eosinophilie bei malignen Tumoren vorkam und die von dem Autor auf mechanische Vaguserregung durch die Tumormassen zurückgeführt wird. Das eine Mal handelte es sich um peribronchiale Ausbreitung von Metastasen eines Uteruscarcinoms, „wodurch wohl eine Reizung der Vagusverzweigungen in den Bronchien stattgefunden haben könnte“, das zweite Mal um ein Lymphogranulom am Halse, das beide Vagi eingebettet hatte. Auch KAPPIS beschreibt einen Lungentumor mit hochgradiger Bluteosinophilie. Er selbst erklärt diese durch eine Reizwirkung zerfallender Tumormassen auf die Bildungsstätten der eosinophilen Zellen, während STRISOWER auch hier mechanische Vaguserregung gelten lassen möchte. Es liegt somit nahe, auch bei unserem Falle an ähnliche Vorgänge zu denken, die vor der Operation bestehende Eosinophilie als Ausdruck der Ummauerung, somit mechanischen Erregung des Vagus durch den Tumor zu werten, die mit eingetretenem Recidiv wieder zur alten Höhe ansteigende Zahl der Eosinophilen wiederum mit mechanischer Erregung des peripheren Vagusstumpfes durch Umwachsung mit Tumormaterial. Die Operation wäre also mit einem gut gelungenen Experiment zu vergleichen.

Jedoch gegen diesen Gedankengang lassen sich auf Grund unserer Beobachtungen Einwendungen erheben. Irgendwelche klinischen Symptome, die man als erhöhten Tonus des Parasympathicus (erweiterten Vagus) deuten könnte, also etwa Bradykardie, Hypersekretion oder spastische Motilitätsstörungen im Magendarmkanal usw. hat Patient weder vor noch nach der Operation gehabt. Ferner scheint das Recidiv weniger von in der Tiefe zurückgelassenem als in der Haut haften gebliebenem Tumormaterial ausgegangen zu sein. Die Eosinophilie, nach der Operation fast zur Norm zurückgegangen, nahm wieder zu, als sich die Haut in der Umgebung der Operationsnarbe zu infiltrieren begann. Wer andererseits an die zahllosen Reizversuche denkt, die man am Vagus angestellt hat und die zum Teil zu recht verschiedenen Resultaten führten — ich erinnere nur an die Ulcusforschung! — der wird auch in diesem Falle vorsichtig sein. Im übrigen hatten wir in der letzten Zeit Gelegenheit, mehrere Fälle von malignen Halstumoren zu beobachten — bei einem nicht operierten bestand eine Recurrenslähmung, bei einem zweiten wurde bei der Exstirpation des Tumors (eines linksseitigen branchiogenen Carcinoms) der Vagus reseziert — bei keinem fand sich eine Eosinophilie.

Meines Erachtens liegt es näher, der Anwesenheit von mehr oder weniger großen Massen Tumorgewebes als solchen die Hauptbedeutung beizulegen. So erklärt denn auch TÜRK die Eosinophilie aus endogener Ursache durch Störungen im Zellenleben, wie sie durch jede Erkrankung, schließlich auch durch jeden Tumor hervorgerufen werden können. SCHELLONG, der vor kurzem aus der Schittenhelmschen Klinik über hochgradige Eosinophilie bei Tumoren berichtete, schließt sich dieser Auffassung an und erinnert an die von SCHLECHT ermittelte Eosinophilie bei anaphylaktischen Vorgängen (parasitäre Eosinophilie!) und die von SCHLECHT sowie von SCHITTENHELM und AHL gefundene Eosinophilie nach parenteraler Verabreichung von verschiedenen Eiweißstoffen. Warum Eosinophilie bei malignen Tumoren nur außerordentlich selten vorkommt, dafür einen Grund anzugeben, sind wir nicht in der Lage. Es werden eben noch ganz besondere,

auf das hämopoetische System des jeweiligen Individuums abgestimmte Reize erforderlich sein, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß das parasympathische System dabei eine Rolle spielt. *Mit der Annahme einer grobmechanischen Reizung des Nervus vagus ist es jedenfalls nicht getan.*

Erwähnt sei noch, daß sich im histologischen Präparate nur verschwindend wenig eosinophile Zellen fanden. Man hat die bei Tumoren recht häufige Gewebseosinophilie (im Gegensatz zur seltenen Bluteosinophilie) mit den Nekrosen des Tumors in Zusammenhang gebracht. In den dicken Krebszapfen des vorliegenden Falles sah man mehrfach zentrale Nekrosen, jedoch weder in ihrer unmittelbaren Nähe, noch auch im Krebsstroma ließen sich eosinophile Zellen in besonders starker Anhäufung feststellen, was auch mit den Angaben in der Literatur insofern übereinstimmt, als sich dort durchaus keine Proportionalität zwischen Gewebseosinophilie und Nekrose, ebenso wenig wie zu Entzündungszuständen im Tumor konstatieren läßt.

Literatur: KAPPIS, Münch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 18. — v. NEUSSER, zit. nach SCHWARZ in LUBARSCHE u. OSTERTAG XVII, I. 1914. — SCHELLONG, Münch. med. Wochenschr. 1922, Nr. 15. — SCHITTENHELM u. AHL, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. 1913, I, S. 111. — SCHLECHT, Verh. d. Kongr. f. inn. Med. 1910, S. 482. — SCHLECHT, Arch. f. klin. Med. 1910, 98. Habilitationsschrift 1912 und Verh. d. Kongr. f. inn. Med. 1912, S. 416. — STRISOWER, Wien. klin. Wochenschr. 1913, Nr. 1, S. 16.

ÜBER NEUROTISCHE ATMUNGSTETANIE.

Von

Prof. HANS CURSCHMANN (Rostock).

PORGES und ADLERSBERG teilen in ihrer interessanten Arbeit über neurotische Atmungstetanie und ihre Behandlung mit Animsulfat (Klin. Wochenschr. Nr. 24, 1922) mit, daß der Engländer VERNON 1909 zuerst die gelegentliche Beobachtung gemacht habe, daß die gesteigerte Atmungsfrequenz zu Tetaniesymptomen führe. Demgegenüber möchte ich darauf hinweisen, daß die erste diesbezügliche Beobachtung von mir¹⁾ 1904 mitgeteilt worden ist. Es handelte sich genau, wie bei den von PORGES und ADLERSBERG veröffentlichten Fällen, um eine schwere Hysterie, insbesondere permanente und paroxysmale Tachypnoe; während letzterer Steigerung der Atmungsfrequenz auf 140 in der Minute. Ein einziges Mal kam es während eines solchen Anfalls (bei gleichzeitiger großer psychischer Erregung durch die klinische Vorstellung) zu einem anscheinend reinen Tetanieanfall (Carpopedalkrämpfe) von 5 Minuten Dauer; während des Anfalls stark positiver Chvostek. Die Untersuchung auf die mechanische Übererregbarkeit anderer Nervenstämmen, auf Trousseau und galvanische Übererregbarkeit der motorischen Nerven und des Acusticus bald nach dem Anfall ergab allerdings ein negatives Resultat. Es blieb, trotzdem zahllose Anfällen schwerer Tachypnoe voraus- und hinterhergegangen sind, der einzige Tetanieanfall der Patientin.

Ich war damals angesichts des Fehlens des ERBSCHEN, des TROUSSEAU-SCHEN und CHVOSTEK JUN. Phänomen eher geneigt, eine hysterische Pseudotetanie anzunehmen, wies aber darauf hin, daß der Anfall an gewisse abortive Tetanieanfälle erinnere, wie sie im Verlauf von Tetanieepidemien vorkommen, und, bei denen auch das Facialisphänomen (zusammen mit den anderen Übererregbarkeitssymptomen) nach dem Anfall verschwinden können. Ich habe später auf Tetaniesymptome bei neurotischer und organisch bedingter Hyperpnoe stets geachtet, aber nie wieder derartiges beobachten können. Ich glaube deshalb, daß es sich um ein sehr seltenes Vorkommnis handelt, bei dem doch eine gewisse latente Tetaniedisposition (benigner Hypoparathyreoidismus) als Basis solcher Anfälle vorliegen muß. Ich neige um so mehr zu dieser Ansicht, als Versuche an gesunden Personen, die ich ausführte, trotz energischer willkürlicher Hyperpnoe nicht zu Tetaniesymptomen führten.

KURZE WISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE NATUR DES HETEROGENETISCHEN PRÄCIPITINS.

Von

E. FRIEDBERGER und A. LASNITZKI.

In einer früheren Mitteilung (diese Wochenschrift Nr. 25, S. 1248) sind Untersuchungen über Typen der Präcipitation ver-

öffentlicht worden, die zu dem Ergebnis geführt haben, daß die durch das homologe Eiweiß erzeugten Präcipitate sich von jenen unterscheiden, wie sie präcipitierende Sera in nicht seltenen Fällen mit in der Tierreihe ganz fern stehendem (heterogenetischem) Eiweiß bilden. Die Ergebnisse dieser

¹⁾ Deutsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 1904, 27.

Untersuchungen nicht nur über das verschiedene morphologische Verhalten, sondern auch über Differenzen bezüglich der Komplementablankung und bezüglich der Thermostabilität der Komponenten führten uns zu der Vorstellung, daß auch im chemischen Verhalten zwischen den lockeren isogenetischen und den dichten, schüppchenartigen heterogenetischen Präcipitaten Verschiedenheiten bestehen müßten.

Wir dachten auf Grund der seitherigen Tatsachen an die Möglichkeit, daß es sich bei den spezifischen Präcipitaten, zum mindesten im wesentlichen, um Eiweißfällungen, bei den heterogenetischen um Lipoidfällungen handeln würde.

Durch Behandlung der Komponenten der Reaktion mit einem Lipoidlösungsmittel müßte sich die Frage entscheiden lassen. Beruht die heterogenetische Präcipitation tatsächlich auf lipoiden Komponenten, so müßte sich durch Behandlung des Antiserums und Antigens mit Lipoidlösungsmitteln die Reaktion zum Verschwinden bringen lassen.

Die Verwendung von Alkohol, Benzol, Chloroform scheiterte an der ausflockenden Wirkung dieser Extraktionsmittel. Dagegen erwies sich der Äther als brauchbar.

Schüttelt man ein heterogenetisch übergreifendes, präcipitierendes Serum und gleichzeitig die Antigene, auf die es reagiert (in Form von Seris), $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde mit Äther, trennt dann im Scheidetrichter den Äther ab und stellt die Präcipitinreaktion mit den entätherten Komponenten an, so beobachtet man folgendes:

Die isogenetische Präcipitation verläuft mit den entätherten Komponenten fast so stark wie mit den nativen Komponenten, und der Typus der Flocken bleibt der gleiche (lockere). Ebenso ist natürlich das Verhalten, wenn man nur eine der Komponenten mit Äther extrahiert hat.

Bringt man dagegen das mit Äther extrahierte Antiserum mit dem gleichfalls mit Äther extrahierten *heterogenetischen* Eiweiß zusammen, so ist jetzt die bei den nativen Komponenten vorhandene starke, dichte Präcipitation so gut wie vollkommen geschwunden, oder es zeigen sich in einzelnen Fällen, in denen anscheinend die Entätherung *nicht vollkommen* gelungen ist, doch nur noch Andeutungen einer dichten Präcipitation. Wird nur eine der Komponenten der Reaktion mit Äther behandelt, so schwindet die Präcipitinreaktion nicht, sondern sie ist nur deutlich schwächer, wobei in der Mehrzahl der Fälle die Entätherung des Antiserums von stärkerem Einfluß ist. Wir lassen nachstehend ein Versuchsprotokoll folgen:

Versuch mit einem Rinderantiserum (gewonnen durch Behandlung eines Kaninchens mit Rinderserum), das auf Pferdeserum übergreift (Titer: Rind 1:20000; Pferd 1:20000).

Vermischen von 1 ccm Antigen (1:100 verdünnt) mit 0,1 ccm Antiserum.

Befund nach ca. 14 Std.

(Ä) = mit Äther ausgeschüttelt.

Antiserum	Antigen	Beschaffenheit des Präcipitats	Menge
Rinderantiserum	Rinderserum	grob, locker	++++
" (Ä)	"	grob, locker	++++
" (Ä)	" (Ä)	grob, locker	++++
" (Ä)	" (Ä)	grob, locker	++++
" (Ä)	Pferdeserum	fein, dicht	+++
" (Ä)	"	fein, dicht	+
" (Ä)	" (Ä)	fein, dicht	++
" (Ä)	" (Ä)	optisch leer	

Aus den Versuchen ergibt sich also, daß die bei der dichten Präcipitation beteiligten Komponenten im Äther löslich sind, und daß bei dieser Präcipitation sowohl ätherlösliche Komponenten des Antiserums wie des Antigens beteiligt sind. Wir dürfen ihnen wohl auf Grund dieser Versuche einen Lipoidcharakter zuschreiben.

Die Komponenten der spezifischen Präcipitate dagegen werden durch den Äther kaum beeinflusst, vielleicht nur insoweit, als bei ihrer Bildung die Komponenten der heterogenetischen Präcipitation eine Rolle spielen. (Aus dem Hygiene-Institut der Universität Greifswald.)

ZUR FRAGE DER ÜBERTRAGBARKEIT DES HERPES GENITALIS AUF DAS KANINCHEN.

Von

A. LUGER und E. LAUDA.

In Fortsetzung unserer seinerzeit mitgeteilten Untersuchungen über die Ätiologie des Herpes febrilis sowie des Herpes zoster haben wir uns auch mit der Frage der Übertragbarkeit des Herpes genitalis auf das Kaninchen, zunächst im Cornealversuch, ferner auch auf dem Wege der intravenösen und der subduralen Injektion beschäftigt. Im vorliegenden sollen in Kürze die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchungen mitgeteilt werden. Hinsichtlich der bereits in der Literatur vorliegenden Angaben (BLANC und CAMINOPETROS, BAUM, DOERR und SCHNABEL, FLANDIN und TZANCK, FONTANA, LIPSCHÜTZ, RAVAND und RABEAU) sei auf eine demnächst erscheinende ausführliche Arbeit über den gleichen Gegenstand hingewiesen, wo auch zu den von den anderen Autoren erhobenen Befunden kritisch Stellung genommen werden soll.

Den Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bildeten drei Fälle von Herpes genitalis. Der Inhalt der Bläschen wurde in zwei Fällen auf die beiden Corneae zweier Kaninchen (je zwei Kaninchen corneae von zwei Kaninchen), in einem Falle auf die eines Kaninchens übertragen. Während die Impfung in einem Falle keine Reaktion erkennen ließ, entwickelte sich in den anderen Fällen nach einer Inkubation von 24-48 Stunden eine der wiederholt beschriebenen herpetischen Impfkera- titis; ähnliche Hornhautentzündung mit der charakteristischen Verzweigung, den Epitheldefekten, der Bläschen und Dollenbildung und den Infiltraten. Im weiteren Verlaufe kam es meist am dritten Tage zu einer mäßigen Conjunctivitis, die manchmal zur Verklebung der Lider führte, und zu diffuser Trübung der Cornea. Diese schweren Entzündungserscheinungen hielten durchschnittlich 10 Tage an, dann kam es unter Abklingen der Reizerscheinungen zu Einwachsen von Gefäßen vom Limbus her, zur Pannusbildung. Der Prozeß heilte entweder mit Restitutio ad integrum oder mit einer dichteren oder zarteren Narbe ab.

Es gelang ferner die Übertragung der Keratitis in der Passage von Kaninchen auf Kaninchen.

Die histologische Untersuchung der geimpften Cornea zeigte am zweiten Tage der Affektion neben partiellen Epitheldefekten, ballonierender Degeneration der Epithelien, leukocy- tären Infiltraten im Epithel und in den obersten Schichten des Stratum proprium corneae an den Kernen der Epithel- zellen, in geringer Anzahl auch an den Kernen der Hornhaut- körperchen, degenerative Veränderungen bezüglich deren genaueren Schilderung wir, da zwischen den Kernverände- rungen des Herpes febrilis und Herpes genitalis wesentliche Unterschiede nicht bestehen, auf unsere früheren Arbeiten über Herpes febrilis verweisen können. (LUGER und LAUDA Sitzung d. d. med. Ges. in Wien v. 25. November 1920, Sitz. d. Ges. f. innere Med. u. Kinderheilk. in Wien v. 17. Februar 1921, Sitz. d. ophthal. Ges. in Wien v. 14. März 1921, Wien. klin. Wochenschr. 1921, Nr. 12 und 21, Sitz. d. Ges. d. Ärzte in Wien v. 13. Mai 1921, Zeitschr. f. d. ges. experiment. Med. XXIV, S. 289, 1921, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 94, Heft 2, 3. 1921). Diese Kernveränderungen wurden beim Herpes genitalis zuerst von LIPSCHÜTZ beschrieben, doch können wir uns auch hier ebensowenig wie beim Herpes febrilis und beim Herpes zoster seiner Deutung dieser Ver- änderung als Einschlüsse im Sinne der Chlamydozoenlehre anschließen und befinden uns hierin in Übereinstimmung mit PASCHEN.

Bei cornealer Infektion hatten wir keine Gelegenheit herpetische Allgemeinerscheinungen der Kaninchen zu beobachten. Hingegen traten in zwei Fällen nach intravenöser Injektion von Bläscheninhalt die gleichen Allgemein- erscheinungen auf wie sie zuerst von DOERR, später von uns und anderen Untersuchern nach Infektion des Kaninchens mit Herpes febrilis beobachtet worden sind. (Manège- bewegungen, Krämpfe, Paresen, Trismus usw.) Nach intra-