

± longe pedicellatus, ebracteatae. Pedicelli floriferi 1–2 mm longi, fructiferi usque ad 5 mm fere elongati. Calyx florifer 2,5–3 mm longus, fructifer ad 4–5 mm elongatus, laciniis 5 lineari- vel oblongo-lanceolatis, usque ad basin liberis, ± 1 mm latis, subacutis. Corolla 5–6 mm longa, diam. 6–8 mm lata, infundibuliformis, in vivo atro-violacea (e collectore), in sicco intense coerulea; tubus calyce brevior, ± 1,5 mm longus; limbus tubo longior, paulo ultra medium in lobos oblique explanatos suborbiculares, ± 4 mm diam. longos latosque divisus; fornices trapeziformes, in margine supremo faucis inserti, apice truncati. Antherae ellipsoideae, ± 1 mm longae, infra fornices in tubo insertae. Stylus in statu florifero 1,5 mm fere longus, demum usque ad 2 mm elongatus, stigma capitatum ferens. Nuculae submaturae ovoideae vel ovoideo-oblongae, 5–6 mm longae, area mediana oblonga glabra laevi, ala ± 1–1,2 mm lata, margine saepe coerulescente, undulato neque autem dentato neque glochidiato. — Species *M. pygmaeo* RECH. f. affinis, sed habitu, indumento, corollaque multo majore ab eo valde distat.

Afghanistan: E: Kabul: In declivibus australibus jugi Salang, 2700–3300 m, substr. granit., 25. VI. 65, RECH. 31422, ! PODLECH 12202!

Distr. gen.: Endem.

19. *M. subscaposum* RECH. f. & H. RIEDL, sp. nov. — Tab. 19, fig. 6; tab. 24. Typus: RECH. 16926, W!

Herba perennis caespitosa, 10–20 cm alta, pilis inaequilongis brevibus, rigidis, albis, basi tuberculatis, patentibus ubique densissime tecta, itaque incana. Caulis unicus tantum evolutus, in regione inflorescentiae dichotome ramosus, erectus, rigidus. Folia basalia lanceolata, petiolo incluso 35–60 mm longa, 5–9 mm lata, margine crispato-undulata, acuta vel obtusiuscula, in petiolum laminae dimidium vel tertiam partem longitudinis tantum attingentem sensim attenuata. Folia caulina perpauca, valde diminuta, 6–10 mm longa, 1–2 mm lata, sessilia. Inflorescentiae simplices vel furcatae, terminales, floriferae capitato-contractae, fructiferae paulo elongatae, rectae, rigidae, ebracteatae. Pedicelli floriferi subnulli vel usque ad 1,5 mm longi, fructiferi usque ad 2,5–4 mm elongati. Calyx dense hirsutus, florifer 3–4 mm longus, laciniis lineari-lanceolatis, obtusis, fructifer laciniis patentibus vel reflexis usque ad 5 mm longis. Corolla cylindrico-campanulata, 7–8 mm longa, coerulea, glabra, tubo calycem distincte superante, 5 mm fere longo, limbo tubi dimidium aequante, usque ad tertiam partem superiorem in lobos suberectos rotundatos 1,5–2 mm latos diviso. Fornices ad basin faucis inserti, trapeziformes, longitudine sesquialtiores, bilobi. Antherae oblongae, usque ad 1,5 mm longae, apice basin fornicum non attingentes, filamentis brevissimis paulo supra medium tubum insertis. Stylus in corolla inclusus, 2,5 mm fere longus. Nuculae 4, suborbiculares, 6–7 mm longae, ala scaphiformi, 2–2,5 mm lata, pellucida, margine glochidiato-dentata, dentibus inflexis, disco anguste ovoideo, acuto, 3 mm longo, 2 mm lato, glochidiis longis obsito. — Inter species sectionis *M. acroclado* RECH. f. & H. RIEDL tantum habitu similis, differt ab eo corollis multo maioribus, cylindrico-campanulatis, nuculis maioribus, ala scaphiformi, pellucida.

Afghanistan: E: Kabul: In faucibus Tang-i Gharu inter Kabul et Sarobi, substr. gneiss, 1400–1500 m, 17. VI. 1962, RECH. 16926! Jaji: Inter Qasim Khel et Dobandi in jugo Shutargardan, 3300 m, RECH. 32348! — SE: Orozgan: Kuh Garm-ab, LINDB. 969!

Distr. gen.: Endem.