und Tartrate verwendbar, ebenso zum Nachweis von Zucker in Zitronensäure.

Um Zucker in Weinsäure nachzuweisen, führt man die Probe bei gewöhnlicher Temperatur aus; der Zucker wird hierbei verkohlt, dagegen nicht die Weinsäure.

2. Quantitative Bestimmung organischer Körper.

a. Elementaranalyse.

Zur Zerstörung organischer Substanzen benutzt W. Migault¹⁾ die Caro'sche Säure, die Sulfomonopersäure²⁾. Fast alle organischen Körper können durch Caro'sche Säure³⁾ (H_2SO_5) unter 100° verbrannt werden. Um zum Beispiel ein Streichholz zu verbrennen, gibt man im Reagensrohr zu 30-prozentigem Wasserstoffsuperoxyd (Perhydrol) die zweifache Menge konzentrierte Schwefelsäure und wirft das Streichholz, dessen Köpfchen natürlich vorher entfernt wurde, hinein. Unter Erhitzung und Schwärzung braust die Lösung auf und wird am Ende der Reaktion wieder wasserklar.

Auch Fleisch, Fette und andere Substanzen, die klebrig oder schlecht in fein zerteilte Form zu bringen sind, können ohne weiteres zerstört werden. Schwierigkeiten bereiten jedoch die Paraffine. Um Substanzverluste zu vermeiden, bringt man die etwas zerkleinerte Substanz in einen Kolben mit angeschmolzenem Kühler und gibt konzentrierte Schwefelsäure hinzu. Die Perhydrolösung befindet sich in einem Tropftrichter ohne Hahn mit langem, dickwandigem Kapillarrohr, das durch das Kühlrohr hindurch bis in die Schwefelsäure reicht. Die obere Öffnung ist mit einem Druckballon verbunden, so dass man beliebige Mengen Perhydrol in den Kolben drücken kann. Zunächst erhitzt man den Kolbeninhalt auf zirka 100° und entfernt die Flamme. Nachdem die Kohlenstofffärbung über Schwarz in Rotgelb übergegangen ist, wird, ohne zu kühlen, langsam auf etwa 140° erhitzt. Nach dem Abkühlen der Lösung entfärbt man ganz durch weiteren Zusatz von Perhydrol und abermaligem Erhitzen. Für 1 g Substanz sind 2—4 ccm Perhydrol und 6—12 ccm Schwefelsäure erforderlich.

¹⁾ Chemiker-Zeitung **34**, 337.

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift **48**, 308.

³⁾ Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. zu Berlin **34**, 853 und 1521 und Zeitschrift f. angew. Chemie **11**, 845.

Ist die Gegenwart von Quecksilber nicht störend, so kann durch Zusatz von wenigen Zehntel-Grammen Quecksilber der Verbrauch an Perhydrol und Schwefelsäure bedeutend eingeschränkt, eine gleichmäßige Reaktion bei viel niedrigeren Temperaturen gewährleistet und eine Zerstörung der letzten Reste organischer Substanz ohne wiederholte Erhitzung erzielt werden. Die Dauer der Zersetzung beträgt dabei stets nur wenige Minuten, während ohne Quecksilber etwa 30 Minuten erforderlich sind.

Vor der Verwendung von Bleisuperoxyd zur Elementaranalyse warnt H. Weyl.¹⁾ Nach seiner Erfahrung ist Bleisuperoxyd, das beim Erwärmen keine Kohlensäure abgibt, im Handel nicht zu haben. Man kann es jedoch durch tagelanges Erwärmen auf 280 ° im Verbrennungsrohr völlig von Kohlensäure befreien und ein solches Produkt arbeitet dann wochenlang völlig zufriedenstellend. Aus noch nicht aufgeklärten Ursachen wird aber bei anderen Proben, nachdem sie kurze Zeit einwandfreie Resultate geliefert haben, Kohlensäure zentigrammweise zurückgehalten und zwar, ohne dass eine Bildung von Mennige oder Bleioxyd bemerklich wird. Erhitzt man dann das Superoxyd stärker als gewöhnlich, so geht wieder langsam Kohlensäure in die vorgelegte Barytlösung über. Bei der Analyse nach Dennstedt, bei der das Superoxyd jedesmal gewechselt werden soll, werden diese Erscheinungen vielleicht nicht in dem Maße bemerklich.

Zur Elementaranalyse von rasch abbrennenden Flüssigkeiten, insbesondere solchen mit einigermaßen explosivem Charakter, bringt E. Berl²⁾ einen Beitrag. Man stellt sich aus feinmaschigem, ausgeglühtem Kupferdrahtnetz durch Umlegen um einen dicken Glasstab kleine, etwa 2 cm lange Becher her, deren Durchmesser so bemessen ist, dass sie leicht in das vertikal gehaltene Verbrennungsrohr hineingleiten können. In diese Becher füllt man erst eine Schicht von grobem, dann eine von feinem Kupferoxyd und glüht sie im schräg gestellten Kupfertiegel aus. Nach dem Erkalten im Exsikkator lässt man in die Becher aus einer Kugelhahnpipette je 1—2 Tropfen der zu analysierenden Flüssigkeit auftropfen. Das Gewicht der angewandten Substanzmenge ermittelt man durch Zurückwägen der Pipette. Nun lässt man einen Becher in das ausgeglühte Verbrennungsrohr hinabgleiten, gibt etwas grobes, ausgeglühtes Kupferoxyd nach, lässt dann den zweiten Becher folgen und

¹⁾ Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. zu Berlin **43**, 149.

²⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie **23**, 249.