gelatineartig aufgequollenen Niederschlag die alkoholische, in der Hauptsache Bitterstoffe enthaltende Lösung abgießt, jenen sofort mit 96%-igem kalten Alkohol kräftig verrührt und das ungelöst bleibende Lecithin von den in Lösung gegangenen letzten Spuren der Fett- und Bitterstoffe abtrennt.

M. Schütz.

Eier.

E. G. Willcock: Krystallinisches Eieralbumin. (Journ. of. Physiol. 1908, **37**, 27—36.) — Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: 1. Durch eine geringfügige Abänderung der Hopkin'schen Sulfatprobe bei der Darstellung des krystallisierten Eiereiweißes gelingt es, ein Eiweiß zu erhalten, dessen spezifisches Drehungsvermögen um mehr als 1° größer ist. 2. Bei dem spezifischen Drehungsvermögen sind geringe Schwankungen bemerkbar. 3. Zur Auskrystallisation des Albumins aus essigsaurer Lösung kann an Stelle des Ammoniumsulfats das Magnesiumsulfat verwendet werden. 4. Der Proteinkomplex wandert in saurer Lösung zur Kathode, in alkalischer Lösung zur Anode, daraus kann geschlossen werden, daß das in schwach saurer oder alkalischer Lösung befindliche Eiweiß eine salzähnliche Bindung mit der Säure oder dem Alkali eingeht.

Max Müller.

Lewin, Miethe und Stenger: Über die spektralen Eigenschaften des Eigelbs. (Pflüger's Archiv 1908, **124**, 585—590.) — Die von den Verff. beobachteten Absorptionen des Dotterfarbstoffes liegen innerhalb der Wellenlängen 500—370 $\mu\mu$, die äußersten bei $\lambda = 492$ und 378. Zu den Versuchen wurden mit Isocol gefärbte sensibilisierte Platten verwendet, die die Verff. sich selbst hergestellt hatten (Pflüger's Archiv 1907, **118**, 83). Als Aufnahmeapparat diente ein Gitterspektroskop, als Lichtquelle im Sauerstoff-Leuchtgasgebläse weißglühende Zirkonplättchen. Die Absorptionsstreifen wurden ausgemessen. Als Flüssigkeitsgefäße wurden nur Reagensgläser von 1 cm lichter Weite verwendet, die als Zylinderlinsen wirken und auf den Spalt des Spektographen ein Bild der Lichtquelle projizieren. Hervorrufung und Fixierung der Platten geschah nach Möglichkeit unter Ausschluß roten Dunkelkammerlichtes in der allgemein üblichen Form. Die Lösungsmittel wurden im reinsten Zustande verwendet, sie wurden nach der Kundt'schen Regel geordnet. Diese besagt: Hat ein farbloses Lösungsmittel ein größeres Brechungs- oder Dispersionsvermögen als ein anderes, so liegen die Absorptionsstreifen einer in den Medien gelösten Substanz bei Anwendung des ersteren Mittels dem roten Ende des Spektrums näher als bei Benutzung des zweiten. Innerhalb einer Gruppe sind die Lösungsmittel etwa gleichwertig und es finden nach der Lage der Absorptionsspektren innerhalb der Gruppen Vertauschungen statt. Es wurden nur 3 Gruppen verwendet und zwar: 1. Wasser (als Verteilungsmittel kleiner Farbstoffmengen), Alkohol, Äther, Aceton. 2. Chloroform. 3. Benzol. Die Untersuchungen zeigten, daß in den Lösungsmitteln Chloroform und Benzol die einzelnen Absorptionsstreifen wirklich um 5—10 μ nach dem roten Ende des Spektrums verschoben sind. Zwischen den Wellenlängen 422 und 378 — also im äußersten Violett bzw. Ultraviolett — wurden zwei schwache Absorptionsstreifen beobachtet, die bisher noch nicht bekannt waren. Außerdem wurden noch drei weitere starke Absorptionsstreifen festgestellt.

Max Müller.

R. Paladino: Über die Fette im Hühnerei. (Biochem. Zeitschr. 1909, **17**, 356—360.) — Das durch kalten und warmen Äther dem Eigelb entzogene Fett teilte sich nach längerem Stehen in zwei Schichten von ungleicher Dichte und Färbung. Vorherrschend ist ein fester Anteil von hellgelber Farbe, das flüssige Fett ist dunkel orange-gelb und zeigt im Spektroskop einen breiten Streifen, der das Grün, Blau und Violett absorbiert. Beide Bestandteile enthalten Olein-, Palmitin- und Stearinsäure und erhebliche Mengen Phosphorsäure, Schwefel und Eisen sind zugegen. Flüchtige Säuren waren vorhanden; es konnte darin aber nur die Anwesenheit von Ameisensäure

nachgewiesen werden. Das Lutein des Eigelbs wurde aus dem Chloroformauszuge in gelben Nadeln krystallisiert erhalten; seine Lösung in Alkohol und Äther zeigt im Spektrum zwei Absorptionsstreifen bei F und zwischen F und G. *G. Sonntag.*

Kappeller und R. Schulze: Eierfleischpräparate. (Bericht des Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes Magdeburg 1909, 6.) — Die Untersuchung von drei sogen. Eierfleischpräparaten ergab folgende Zusammensetzung:

Probe	1	2	3
Wasser %	13,15	12,44	12,78
Ätherextrakt (Rohfett) % . .	2,61	2,38	2,54
Protein %	16,50	16,62	16,87
Lecithin-Phosphorsäure % . .	—	0,051	0,049

C. Mai.

Patente.

Dr. Maximilian Riegel in Schöneberg bei Berlin: Verfahren zur Konservierung von Eigelb. D.R.P. 207 166 vom 25. Sept. 1907. (Patentblatt 1909, 30, 857.) — Macht man Eigelb durch Zusatz von indifferenten Säuren, z. B. Milchsäure, Phosphorsäure o. dgl., sauer, so gelingt es bereits mit einem Zusatz von 5—6% Kochsalz ein dauernd haltbares Eigelb zu erzeugen. Der Zusatz der Säure kann vor oder nach dem Zusatz des Kochsalzes erfolgen. Die konservierende Wirkung scheint auf der Bildung von freier Salzsäure zu beruhen. *M. Schütz.*

Literatur.

Dr. Max Rubner, o. Professor und Direktor des Physiologischen Instituts der Universität Berlin: Kraft und Stoff im Haushalte der Natur. Gr. 8°. 181 Seiten. Leipzig 1909. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. — Unter demselben Titel erschien 1855 die bekannte Schrift von Fr. K. Chr. Ludw. Büchner, die in monistisch-materialistischer Weise auch das geistige Dasein als eine Eigenschaft der Materie bzw. als ein notwendiges Erzeugnis besonderer Stoffe erklärte. Die Schrift Büchner's wurde ebenso sehr bekämpft als gelesen und erschien 1888 in 16. Auflage. Ein ähnliches Geschick kann auch vielleicht die vorliegende Schrift erleben, wenngleich M. Rubner darin auf Grund des Energiegesetzes nur der Annahme einer besonderen Lebenskraft d. h. einer von der Materie ablösbaren selbständig existierenden Kraft entgegentritt. Kraft und Stoff besitzen in der belebten Welt dieselben Werte wie in der unbelebten. Jede lebende Substanz bedarf der Nahrungszufuhr. Materie und Energie der Nahrung sind für die lebende Substanz trennbare Dinge und werden auch, jede für sich, zu besonderer Funktion verwendet. Wie sehr auch Bakterien, Hefen, Wirbellose und Wirbeltiere in dem chemischen Aufbau ihrer Zellen und deren spezifischer Lebens-tätigkeit verschieden sein mögen, zwei unlösbare Grundreaktionen zeigt alle lebende Substanz; zunächst den durch Energiezufuhr dauernd unterhaltenen Kreisprozeß, der mit Verlust von Energie durch Arbeitsleistung oder Wärmeerzeugung endet; daneben den fermentativ wirkenden Zustand der — dem Biogen anhaftenden — Bionten, der den Nahrungsstoff spaltet, die Energieübertragung auf die lebende Substanz — Biogen — unter gleichzeitiger Hemmung der Fermentäußerung, den Verlust an Energie und die Wiederkehr fermentativer Wirkung richtig als Einzelstadien des Kreislaufs bedeutet. Unter diesen Gesichtspunkten verfolgt der Verf. den Energieumsatz bei niederen und höheren Lebewesen, von der embryonalen bzw. fötalen Entwicklungszeit bis zum vollendeten Wachstum und bis zum Absterben. Hierbei kommt der Verf. zu verschiedenen bemerkenswerten Ergebnissen, u. a. daß der Energieverbrauch verschiedener Lebewesen unter gleichen Verhältnissen annähernd gleich ist, z. B. beträgt der Kraftwechsel für je 1 g Körpergewichts-Stickstoff beim Frosch 3,3 Kal., bei der Puppe 2,4 Kal., beim Maikäfer 2,8 Kal. Die energetische Leistung der Körpergewichtseinheit entspricht bei den Säugern und Vögeln, die am genauesten untersucht sind, unter sonst gleichen Verhältnissen einer Konstanten. Großes Wachstum bedingt großen, kleines Wachstum kleinen Kraftwechsel, aber der Energieaufwand in der Wachstumszeit zur Verdoppelung des Körpergewichtes ist bei den Wirbeltieren — mit Ausnahme des Menschen — fast gleich, indem er für je 1 Körperkilo in Kilokalorien (Reinkalorien) beträgt:

Pferd	Rind	Schaf	Schwein	Hund	Katze	Kaninchen
4512	4243	3926	3754	4304	4554	5066 Kal.,