mittlere Bewegung n eine unveränderliche Größe ist, daß dagegen die halbe große Achse a infolge der Störungen ihren Wert ändert, also zwischen beiden Größen das dritte *Kepler*-sche Gesetz nicht gilt. Man kann indessen auch die Größe a

unverändert lassen, wenn man die Störungsgröße $\delta \log a$ anstatt an $\log a$ einfach an $\log r$ anbringt.

Die instantanen Elemente sind die folgenden, bezogen auf das mittlere Äquinoktium 1900.0:

$$\begin{aligned} n &= 839''.102 = 0^\circ 233084 & e &= 0.40615 + \delta e \\ A(1900 \text{ Jan. } 0 \text{ } 0^h \text{ m. Z. Berlin}) &= 126^\circ 25 & \pi &= 333^\circ 04 + \delta \pi \\ \log a &= 0.41746 + \delta \log a & i &= 15^\circ 46 + \delta i \\ L &= A + n(t - 1900 \text{ Jan. } 0 \text{ } 0^h \text{ m. Z. Berlin}) + \delta L & \Omega &= 244^\circ 33 + \delta \Omega \end{aligned}$$

wo L die mittlere Länge in der Bahn bedeutet und wo:

$$\begin{aligned} \delta \log a &= \delta \log r = 0.00087 \sin[253^\circ 29 + 24^\circ 435(t - t_0)] + 0.00016 \sin[242^\circ 74 + 5^\circ 914(t - t_0)] \\ \delta L &= 1^\circ 128 \sin[306^\circ 39 + 5^\circ 914(t - t_0)] + 0^\circ 422 \sin[343^\circ 39 + 24^\circ 435(t - t_0)] \\ &\quad + 0^\circ 131 \sin[146^\circ 78 + 48^\circ 870(t - t_0)] + 0^\circ 063 \sin[214^\circ 98 + 103^\circ 852(t - t_0)] \\ \delta e &= +0.000005(t - t_0) + 0.00376 \sin[20^\circ 34 + 5^\circ 914(t - t_0)] \\ \delta \pi &= +0^\circ 0132(t - t_0) + 0^\circ 530 \sin[290^\circ 34 + 5^\circ 914(t - t_0)] \\ \delta i &= +0^\circ 0002(t - t_0) & \delta \Omega &= -0^\circ 0143(t - t_0) \end{aligned}$$

In den letzteren sechs Ausdrücken ist die Zwischenzeit $t - t_0$ in tropischen Jahren zu nehmen, $t_0 = 1900.00$ gesetzt. Die periodischen Störungen der Neigung und des Knotens sind nicht beträchtlich; die säkularen Störungen sind auch so gering, daß wir sie allenfalls hätten beiseite lassen können.

Durch diese Elemente wird die Beobachtung von 1902 sowohl in geozentrischer Länge wie in Breite auf etwa 6', diejenigen von 1910 auf etwa 2' in Länge und etwa 11'

in Breite dargestellt, und diese Differenzen sind auf den Einfluß der vernachlässigten Störungsglieder zurückzuführen, die gegen 20% der berücksichtigten betragen mögen.

Hiernach scheint die Erwartung nicht unberechtigt, daß durch die obigen Elemente der geozentrische Ort des Planeten für die nächsten 10 Jahre auf etwa 1° dargestellt wird, sodaß die Gefahr, daß die Wiederauffindung Schwierigkeiten bieten könnte, wohl als beseitigt angesehen werden kann.

Frankfurt a. M., 1911 Dez. 9.

Martin Brendel.

Notiz betreffend die Veränderlichkeit von α Herculis. Von H. E. Lau.

[Tafel 3, Fig. 2].

Bei einer Durchmusterung der Sterne der »Revised Harvard Photometry«, die im Herbst 1911 auf der Treptow-Sternwarte begonnen wurde, habe ich bisher etwa 70 Sterne gefunden, deren Helligkeiten um mindestens 0^m.3 von den Angaben der H. R. abweichen. Diese Sterne habe ich seither nach der Stufenmethode weiter verfolgt und dabei in mehreren Fällen Helligkeitsschwankungen gefunden, die eine photometrische Prüfung der betreffenden Sterne wünschenswert erscheinen lassen.

In einer der ersten »sequences« am 7. August wurde α Herculis 0^m.3 schwächer als sein Nachbar ξ gefunden, obgleich beide Sterne gewöhnlich fast gleich hell sind. Am 23. August war α Herculis wieder verdächtig schwach und ist seitdem an jedem hellen Abend beobachtet worden. Die bisherigen Beobachtungen sind:

1911	M. E. Z.		1911	M. E. Z.	
Aug. 23	11 ^h 49 ^m	ξ 3 0	Sept. 10	8 ^h 36 ^m	ξ 0.5 0
26	9 56	ξ 2.5 0	10	10 47	ξ 2.5 0
27	9 18	ξ 0.5 0	11	8 19	ξ 1.5 0
28	8 53	ξ = 0	12	7 57	ξ 2.5 0
28	10 20	ξ 1 0	12	8 54	ξ 2 0
Sept. 1	9 30	ξ 1.5 0	15	8 13	ξ 1 0
2	9 21	ξ 3 0	20	10 4	ξ 4 0
3	12 36	ξ 1 0	Okt. 3	10 35	ξ 4 0
4	8 50	ξ 2 0	9	9 57	ξ 3 0
7	8 45	ξ = 0	16	8 32	ξ 4 0

1911	M. E. Z.		1911	M. E. Z.	
Okt. 17	7 ^h 21 ^m	ξ 3 0	Okt. 22	10 ^h 2 ^m	ξ 2.5 0
17	8 6	ξ 2.5 0	24	7 48	ξ 2 0
18	8 7	ξ 1 0	26	7 10	ξ 1.5 0
22	6 31	ξ 4 0			

Nach diesen Beobachtungen ist α Herculis zu folgenden Zeiten im oder nahe im Minimum gewesen:

1911	B - R	1911	B - R
Sept. 2.39	+0 ^d .31	Okt. 9.41	-0 ^d .29
20.42	-0.47	16.36	+0.39
Okt. 3.44	+0.01	22.27	+0.03

Die Formel $\text{Min.} = 1911 \text{ Okt. } 3.43 \text{ M. E. Z.} + 6^{\text{d}} 27^{\text{E}}$ gibt die Restfehler $B - R$. Wegen der Verteilung der Beobachtungen ist eine eintägige Periode nicht ausgeschlossen; obiger Wert scheint aber die Beobachtungen ziemlich gut darzustellen. Nach der Phase AT geordnet geben meine Beobachtungen folgende Normalwerte (Mittel aus je zwei Beobachtungen):

AT	$\xi - 0$	AT	$\xi - 0$	AT	$\xi - 0$
0 ^d .06	4.0 st	1 ^d .44	1.7 st	4 ^d .03	1.7 st
0.22	2.8	1.94	1.5	5.15	1.0
0.43	2.3	2.16	2.0	5.53	2.0
0.97	1.0	2.58	2.0	5.84	3.5
1.39	1.5	3.37	2.0		

Nach der vorläufigen Lichtkurve (Tafel 3, Figur 2) scheint α Herculis dem β Lyrae-Typus anzugehören. Die Helligkeitsschwankungen sind indessen nur innerhalb der Phasen ± 0.5 merkbar; in dem übrigen Teil der Periode schwankt die Helligkeit kaum um eine halbe Stufe. Das Spektrum von α Herculis gehört nach *Maury* der Gruppe VIIb an.

Treptow-Sternwarte, 1911 Oktober.

α Herculis ist bekanntlich schon früher von *F. Schwab* [A. N. 94.249, vergl. auch A. J. 13.109, Ch₂ (6502)] als veränderlich angegeben. *F. Schwab's* Angaben über die scheinbare Periode des Lichtwechsels ($6^d.5$), sowie über die Amplitude ($0^m.3$ bis $0^m.4$) stimmen mit obigem recht befriedigend überein.

H. E. Lau.

Ephemeride des Planeten 480 Hansa

berechnet für 12^h M. Z. Berlin nach den Elementen von *M. Giacobini*.

1911-12	α	δ	$\log r$	$\log A$	Gr.
Dez. 15	2 ^h 29 ^m 17 ^s	+15° 49' 1	0.40225	0.23374	11 ^m 5
17	28 58	15 30.2			
19	28 45	15 12.1			
21	28 39	14 55.0	0.40208	0.24807	11.6
23	28 40	14 38.8			
25	28 47	14 23.5			
27	29 1	14 9.1	0.40194	0.26337	11.6
29	29 22	13 55.6			
31	29 49	13 43.0			
Jan. 2	30 22	13 31.4	0.40180	0.27926	11.7
4	31 2	13 20.5			
6	31 47	13 10.6			
8	32 39	13 1.4	0.40168	0.29546	11.8
10	33 36	12 53.1			
12	34 39	12 45.5			
14	2 35 47	+12 38.7	0.40157	0.31173	11.9

1911 Dez. 14.

Zuerst unternahm ich die Berechnung der Ephemeride für diesen Planeten nach den Elementen von *Bauschinger* (Berl. Jahrb. für 1913) für die Zeit vor und nach der Opposition, welche am 27. Dezember 1911 stattzufinden hätte. Da die für diesen Tag erhaltenen Werte $\alpha = 2^h.8$ und $\delta = +14^\circ$ von den im Berl. Jahrb. angeführten $\alpha = 6^h.4$ und $\delta = +1^\circ.6$ sehr verschieden sind, könnte man schließen, daß die Opposition bereits Ende Oktober l. J. stattgefunden hat *). Ich teilte das Ergebnis der nach den Elementen von *Bauschinger* berechneten Ephemeride Herrn *M. Giacobini* mit, der mir den Rat gab, nochmals die Berechnung der Ephemeride nach den von ihm etwas geänderten Elementen (Astr. Nachr. 4423) vorzunehmen, da seine Elemente eine viel kleinere Differenz zwischen Beobachtung und Rechnung für die Beobachtungen des Planeten im Jahre 1905 und 1906 ergeben. Vielleicht wird man diesen Planeten mittels der vorstehenden Ephemeride auf photographischem Wege noch auffinden können, da er nach 1906 nicht wieder beobachtet wurde.

Dr. *Victor Drapczynski*, z. Z. Paris, Observatoire.

*) Nach einer Mitteilung von Herrn Professor *Berberich* müssen die Oppositions-Daten in den Oppositions-Ephemeriden für 1911 des Berliner Jahrbuchs lauten: Nov. 13 11^m 3 3^h 9^m 8 +21° 55' 0^m 9 -13' 0.180. *Red.*

New variable star 86.1911 Lyrae.

Position: 1855.0 18^h 19^m 8^s.7 +39° 30' 7 1900.0 18^h 20^m 37^s.7 +39° 32' 0.

The following notes refer to photographic observations of a variable star or nova close to μ Lyrae. The object is a comparatively faint one — I estimate its maximum

photographic magnitude at $\pm 11^{\text{th}}$ and minimum $< 15^{\text{th}}$. For the lettering of the stars in the region about the variable, called *N*, see the accompanying sketch.

The instruments used are V = 6 $\frac{1}{2}$ -in. Voigtländer Portrait Lens, 30-in. focus; D = 2 $\frac{3}{4}$ -in. Dallmeyer Portrait Lens, 8-in. focus; R = 15-in. Reflector, 74.5-in. focus.

1911	Time	Plate	Remarks
May 25	10 ^h 6	V 4	<i>N</i> not visible, <i>a</i> bright, <i>b</i> distinct, <i>c</i> limit of visibility
May 27	10.3	V 5	<i>N</i> : minute sharply defined speck in this position possibly only a defect on the plate, <i>a</i> quite bright, <i>b</i> quite distinct, <i>c</i> visible
June 7	10.0	V 9	<i>N</i> not visible, <i>a</i> distinct, <i>b</i> limit of visibility, <i>c</i> not visible
June 8	10.4	V 11	<i>N</i> limit of visibility, <i>a</i> bright, <i>b</i> visible, <i>c</i> visible
Aug. 11	9.2	V 16	<i>N</i> visible, <i>a</i> quite bright, <i>b</i> quite distinct, <i>c</i> distinct
Oct. 1	8.5	D 29	<i>N</i> quite distinct, <i>a</i> quite distinct, <i>b</i> just visible, <i>c</i> extreme limit of visibility