als diejenige eines Perisaturniumsumlaufs oder der Differenz desselben von der entsprechenden Größe für Titan ist. Solche zu finden ist auf dem eingeschlagenen Wege nicht möglich. Daß es zur Zeit überhaupt nicht möglich ist, läßt sich theoretisch leicht einsehen.

Aber auch eine allgemeine Theorie, die für die großen Störungen Rechenschaft gibt, ist deshalb nicht einwandfrei zu geben, weil eine nach ϵ und ϵ' fortschreitende Reihe für die Störungsfunktion nicht nur sehr langsam konvergiert, also

Berlin, 1917 Sept. 14.

praktisch der Behandlung großen Widerstand leistet, sondern überhaupt divergent erscheint. So bleibt nur eine solche Theorie, bei der eine Entwicklung der Störungsfunktion überhaupt nicht vorkommt, also etwa eine Herstellung der Störungsglieder aus speziellen Störungen, ähnlich wie sie *G. H. Darwin* in den periodic Orbits gegeben hat. Eine andere habe ich jetzt zu einem gewissen Abschluß gebracht, aber ihre Anwendung auf den Spezialfall nicht durchgeführt. Diese hoffe ich demnächst veröffentlichen zu können.

H. Samter.

Neuer Veränderlicher 18.1917 Persei.

1855.0 $3^h 3^m 37^s.6$ $+47^\circ 16'6''$ 1900.0 $3^h 6^m 43^s.3$ $+47^\circ 27' 2''$.

Auf einem 1917 Nov. 15 $6^h 12^m - 7^h 12^m$ hier aufgenommenen, Sterne bis zur etwa 10.5. Größe umfassenden Photographie fehlt der Stern BD $+47^\circ 783$ Gr. 9^m vollständig. Laut einer Mitteilung der Sternwarte zu Bonn vom 27. November muß der Stern als veränderlich angesehen werden.

Frederiksværk, 1917 Dez. 6.

A. Fock.

Photographische Messungen von Doppelsternen. Von *E. Hertzsprung*.

(Vorläufige Mitteilung von Resultaten.)

Die folgenden aus 223 Platten¹⁾ abgeleiteten 91 photographischen Positionen von 90 hellen, weiten Doppelsternen sind mit dem Potsdamer 50 cm visuellen Objektiv in der Zeit zwischen 1914.08 und 1917.63 gewonnen worden. 1 mm auf der Platte entspricht $16''.39$. Es wurde im visuellen Fokus photographiert, und zwar auf Erythrosinsilberplatten mit durch Zusatz von einem gelben Farbstoff zur Emulsion herabgesetzter Blauempfindlichkeit (Perutz Perxantoplaten). Die mittlere effektive Wellenlänge betrug $544 \mu\mu$, kaum merklich verschieden für gelbe und weiße Sterne. Der bei gewöhnlichen photographischen Aufnahmen störenden Wirkung der atmosphärischen Dispersion (A. N. 192 Nr. 4603) wird so durch das verhältnismäßig scharfe Empfindlichkeitsmaximum der Erythrosinsilberplatten wirksam entgegengetreten, (vgl. *Deslandres-Bergstrand*, Nova acta reg. soc. scient. Upsalensis Ser. IV, Vol. 2, No. 4, p. 37).

Größere Helligkeitsunterschiede zwischen den beiden Komponenten, welche auch beträchtliche systematische Fehler veranlassen können, wurden durch ausgedehnten Gebrauch von verschiedenen Objektivgittern teilweise kompensiert, indem für den Hauptstern das Mittel der Einstellungen auf die beiden sternähnlichen Spektren erster Ordnung genommen wurde.

Was die systematischen Meßfehler betrifft, so wurde ein Teil davon dadurch unschädlich gemacht, daß alle Platten sowohl in $A\alpha \cos \delta$ als auch in $A\delta$ in zwei symmetrischen Lagen mit Schicht oben und Schicht unten (durch das Glas) gemessen wurden. Die Ausmessung geschah mit einer Töpferischen Schraube, und zwar bei festem Mikroskop und durch die Schraube gemessener Verschiebung der Platte selbst. Bei jeder der vier Ausmessungen (in $A\alpha \cos \delta$ und $A\delta$ jede mit Schicht oben und Schicht unten) der Platte wurden die am besten aussehenden Expositionen ausgewählt. Das Mittel der benutzten Zahl der Bilder ist für jede Platte in der Tabelle angegeben.

Der mittlere Fehler der aus einer Platte abgeleiteten mittleren Position wurde zuerst aus den Abweichungen der Einzelbilder vom Mittel abgeleitet. Es zeigte sich aber, daß

die Mittelwerte zeitlich benachbarter Platten durchgängig etwas stärker voneinander abwichen, als allein hiernach zu erwarten wäre. Die in der Tabelle angegebenen mittleren Fehler sind in Übereinstimmung damit erhöht. Sie entsprechen also der Reproduktionsgenauigkeit der Positionen.

Beachtung verdienen die großen Unterschiede in der Genauigkeit der verschiedenen Positionen. In der Tat sind gelegentlich sehr schlechte Platten mitgemessen worden, um, insbesondere bei den kurzen Distanzen, die Grenze der Leistungsfähigkeit der Methode kennen zu lernen. In solchen Fällen, wo ich besonders systematische Fehler, namentlich in der Distanz, befürchte, ist der mittl. Fehler in Klammern gesetzt.

Das Gesamtgewicht $\Sigma 1/(m.F.)^2$ der 91 Positionen beträgt demnach etwa 3000000, wovon die Hälfte auf jede Koordinate entfällt. Der normale mittlere Fehler eines einzelnen der benutzten 9296 Bilder beträgt somit $\pm 0''.08$ in jeder Koordinate oder etwa ebensoviel wie bei einer guten visuellen Messung.

Die Ausmessung beanspruchte im ganzen — einige wenige Wiederholungsmessungen mitgezählt — 90844 Einzelpointierungen. Daran haben teilgenommen die Herren *A. H. Jøys* (bei den mit * angemarkten Positionen), *W. Gyllenberg* und *F. Pavel* (bei der ersten Position von $\Sigma 2272$ beide) mit bezw. 3634, 1092 und 735 Einstellungen.

Noch sei bemerkt, daß als normale Expositionszeit für einen Stern der visuellen Größe 7^m bei freiem Objektiv 12^s gelten kann — sie wechselt aber bei der hier benutzten langen Brennweite von 12.6 m sehr mit der Unruhe der Luft. — Die kleinsten erhaltenen Durchmesser der Sternbildchen haben sich auf den besten Platten wiederholt übereinstimmend zu 45μ oder $\frac{3}{4}''$ ergeben.

Die Positionswinkel sind für Präzession auf die Normal-epoche 2000 gebracht.

Die Einzelheiten der Arbeit werden in den Potsdamer Publikationen erscheinen. Inzwischen kann noch auf die Bemerkungen in den Jahresberichten der V. J. S. Jg. 50, 51 u. 52 verwiesen werden.

¹⁾ Davon tragen 4 gleichzeitige Expositionen von ϵ_1 und ϵ_2 Lyrae.

Bu	Σ	1910 +	Pos.-W. Ep. 2000	Distanz	m. F. o oot	Zahl der Plat- ten	Bil- der	Bu	Σ	1910 +	Pos.-W. Ep. 2000	Distanz	m. F. o oot	Zahl der Plat- ten	Bil- der
426	60	5 ^h 6.41	251 ^m 25	6 ^s 8.37	7	3	92	7514	2010	5 ^h 8.22	101.50	29 ^m 186	11	3	71
439	61	4.756	117.07	4.465	7	2	90	*7563	2032	5.202	217.43	4.064	4	6	301
520	79	4.785	192.92	7.813	16	1	35	7703	2078	6.248	110.19	3.522	11	1	21
570	88	4.003	159.83	29.839	20	1	36	7878	2130	6.223	128.68	2.200	3	8	470
941	162	5.970	212.84	1.907	21	1	14	7914	2140	5.912	111.61	4.702	6	2	83
993	180	5.388	359.73	8.218	7	4	150	8003	2161	4.917	313.31	3.899	10	2	116
1061	202	5.970	313.11	2.567	14	1	34	8057	2180	4.547	262.10	3.142	34	1	14
1159	232	5.823	66.17	6.591	30	1	19	8136	2202	4.500	92.84	20.576	25	1	49
1733	401	6.093	270.00	11.369	22	1	36	8302	2264	5.412	258.69	6.277	12	1	34
2014	485	6.076	304.79	17.921	15	2	68	*8340	2272	5.195	140.46	4.554	5	8	253
2250	559	5.530	277.94	3.063	14	2	59	"	"	6.770	137.86	4.908	7	3	113
2284	572	6.106	199.43	3.745	10	2	63	8377	2280	4.814	2.17	14.085	13	2	114
2307	577	7.128	242.28	1.360	17	1	22	8441	2308	4.500	230.71	19.719	25	1	51
2543	644	7.128	220.73	1.519	11	1	37	8684	2351	5.457	159.12	5.197	9	2	72
2751	716	6.137	202.65	4.885	13	1	42	8732	2368	4.607	325.71	1.894	8	1	45
2770	718	7.164	74.28	7.856	19	1	30	8776	2375	4.645	114.99	2.287	13	1	67
2821	738	6.117	43.63	4.335	14	2	56	8783	2382	4.965	8.66	2.903	4	4	220
3181	845	6.137	355.64	7.785	16	1	32	8785	2383	4.849	121.04	2.244	4	4	215
3587	958	5.595	258.53	4.910	7	3	130	8914	2417	5.538	103.37	22.031	50	1	20
3793	1009	4.906	153.35	3.608	23	1	31	9137	2486	4.895	216.38	9.095	6	3	129
*4122	1110	6.065	218.87	5.186	3	11	491	9374	App. 1.43	5.485	54.15	34.543	9	4	107
4601	1223	5.700	216.40	4.977	6	4	176	9560	App. 1.46	4.573	134.04	38.485	9	2	128
4815	1280	6.250	49.41	4.533	9	1	45	9634	2583	4.637	115.18	1.229	(17)	2	45
4972	1321	6.093	69.34	18.927	13	3	80	9713	2603	7.610	6.23	3.027	8	1	58
5014	1334	5.127	235.09	2.811	12	1	36	9765	2605	5.651	180.11	3.305	11	2	63
5136	1362	6.083	131.68	5.006	28	1	21	9808	2611	7.627	205.85	5.262	25	1	18
*5388	1424	6.044	117.41	3.912	3	9	533	10022	2655	5.683	2.19	6.168	13	1	36
5603	1487	6.577	107.60	6.480	9	2	50	10135	2671	5.400	338.64	3.294	10	2	65
6134	1633	7.353	245.04	8.952	28	1	26	10361	2703	5.721	290.03	25.336	19	1	23
6243	1670	5.097	144.27	5.955	4	5	436	10509	2727	4.014	269.05	10.714	6	3	136
6313	1692	4.937	227.81	19.688	18	2	79	10676	2742	4.684	220.68	2.616	(30)	1	20
6474	1740	6.250	75.21	26.754	19	1	23	10713	2751	4.648	350.83	1.559	22	1	19
6482	1744	5.729	149.44	14.391	7	4	131	10732	2758	5.687	129.94	23.533	4	17	518
*6641	1785	4.323	337.92	1.206	10	2	66	10926	2789	4.733	115.13	6.353	15	1	26
*6772	1816	4.324	82.79	1.187	10	2	54	11214	2822	4.643	130.78	1.639	11	1	51
6778	1821	5.036	236.33	13.079	13	3	94	11323	2840	4.647	194.59	18.010	12	2	75
6842	1835	4.304	190.07	6.269	17	1	40	11334	2843	5.607	139.40	1.853	10	1	45
*6954	1864	4.486	104.12	5.846	11	4	125	11483	2863	5.868	280.92	7.032	8	3	118
6975	1871	6.250	295.71	1.860	8	1	38	11514	2873	5.822	70.93	13.716	30	1	14
7031	1890	5.526	44.31	3.259	7	3	144	11743	2909	5.214	307.92	2.891	4	3	220
7034	1888	4.300	100.78	2.084	(14)	1	78	11779	2917	5.756	70.63	4.623	9	2	61
7120	1909	5.067	243.41	3.920	4	6	374	11839	2922	4.636	185.41	22.377	10	2	80
7259	1938	6.250	51.82	1.235	9	1	35	11997	2947	4.759	63.58	3.791	7	3	147
7318	1954	4.322	183.83	3.613	11	1	54	12601	3042	5.243	87.80	5.017	7	3	88
7334	1962	4.385	187.61	11.887	36	1	21	12675	3050	6.196	223.54	2.118	5	4	158
7352	1965	5.210	302.55	6.234	7	5	193	Potsdam, 1917 Okt. 29. E. Hertzsprung.							

Mitteilungen über Kleine Planeten.

Aufnahmen auf der Königstuhl-Sternwarte.

Nr.	Planet	Position 1917.0	Tägl. Bew.	Gr.
1	4 1917 CQ	23 ^h 54 ^m 20 ^s + 9° 22' 2"		15 ^m 5
2	499 Venusia	2 58.9 + 18 8	0'4	2'13.1
3	5 1917 CX	0 51 25.1 + 1 24 19" + 0.3 + 3 14.5		
4	1917 CZ (neu)	2 50.3 + 6 29	- 0.5 + 3 13.2	
799 [1915 WOI] nicht auf den Platten, Platten gut.				
Nr.	Platte	Plattenmitte	M. Z. Kgst.	Beob.
1	D1608	23 ^h 54 ^m 0 + 9° 20'	6 ^h 20 ^m 3	M. Wolf
2	B4019	3 6.9 + 19 21	8 0.8	"
3	D1613	0 49.4 + 1 26	7 20.8	"
4	B4021	2 50.0 + 7 19	9 0.8	"

Anschlußbeobachtungen von Dr. M. Mundler.

Planet	1917	M. Z. Kgst.	Position 1917.0
499 Venusia	Dez 5	9 ^h 17 ^m 3	2 ^h 58 ^m 10 ^s 24 + 18° 5' 2"5
437 Rhodia	" 5	10 32.7	4 24 29.84 + 24 33 22.5
Heidelberg, 1917 Dez. 6. M. Wolf			

Ephemeriden-Korrekturen.

Planet	1917	Korr.	Ephem.	Beob.
437 Rhodia	Dez. 5	+ 0 ^m 4 + 2'	R. I.	M. Mundler
499 Venusia	" 5	- 14.7 - 51	"	"

Identifizierung. Der in Heidelberg 1917 Sept. 22 auf-
gefundene und mit 1917 CS bezeichnete Planet (A. N. 4905)
hat sich = 775 [1914 TX] erwiesen. Recheninstitut.