zeichnet sind, daß unexplosible Gemenge von Wasserstoff und Sauerstoff mit Wasserstoffüberschuß der stillen elektrischen Entladung ausgesetzt werden. Diese bewirkt offenbar durch Ionenstoß die Dissoziation der Wasserstoffmoleküle. Sekundär findet dann die Anlagerung dieser Atome an Sauerstoffmoleküle, d. h. die Bildung von Wasserstoffperoxyd statt. Die Arbeitsweise *Hemptinnes* ist nun derart, daß er das Gasgemisch aus einem Gasometer durch eine Berthelotsche Röhre und dann zur Absorption des gebildeten Wasserstoffperoxyds durch Wasser im Kreislauf leitet. Auf diesem Wege kann er natürlich niemals zu hochkonzentriertem Produkt gelangen. Aus seinen Zahlen läßt sich berechnen, daß er Lösungen von 0,08 Gew.-% Wasserstoffperoxyd erhalten hat.

Dagegen ist es *Fischer* und *Wolf* gelungen, unter Einhaltung genau studierter Versuchsbedingungen 100 proz. Peroxyd zu gewinnen. Das Produkt wurde durch tiefe Temperatur in der Berthelotschen Röhre kondensiert. Dieses Verfahren hat den großen Vorzug, daß man bei Anwendung reiner Gase durch direkte Synthese ein absolut reines Produkt herstellen kann. Allerdings sind die Stromkosten ziemlich hoch, und es bleibt abzuwarten, ob es möglich sein wird, dieselben so weit herabzusetzen, daß das Verfahren konkurrenzfähig wird.

Mögen diese kurzen Ausführungen gezeigt haben, mit welchem Eifer und in welchem Sinne Wissenschaft und Technik an dem Problem arbeiten, die wertvollen Eigenschaften des Wasserstoffperoxyds allgemein nutzbar zu machen.

Über einige scheinbare physikalisch-chemische Anomalien.

Von Dr. F. Marshall, Halle a. S.

Nachdem kürzlich das schöne Werk von *Weinbergs* „Kinetische Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen“¹⁾ erschienen ist, fällt es an der Hand der kinetischen Theorien nicht schwer, auch einige scheinbare Widersprüche auf anorganischem Gebiete aufzuklären, ohne auf stereochemische Verhältnisse selbst näher einzugehen.

1. Öfters ist zum Beispiel bereits die Frage aufgeworfen worden: wie kommt es, daß Wasser, welches aus zwei gasförmigen Komponenten gebildet wird, flüssig ist, während der nahe verwandte Schwefelwasserstoff, der aus einem gasförmigen und einem festen Elemente gebildet wird, selbst gasförmig ist. Wie ist es ferner zu erklären, daß bei der völligen Unschädlichkeit des als Nahrungsmittel für Tiere und Pflanzen unentbehrlichen Wassers das Schwefelwasserstoffgas ein gefährliches Gift ist? In diese Verhältnisse vermag nun die kinetische Anschauungsweise Licht zu brin-

gen. Die Atome eines jeden Elementes enthalten einen Betrag von Energie und zwar Bewegungsenergie, bei der Vereinigung von Atomen verschiedener Elemente pflegt nun in der Mehrzahl der Fälle diese Bewegungsenergie der beteiligten Atome um einen bestimmten Betrag vermindert zu werden, und zwar wird sie in Form von Wärme, der sogenannten Bildungswärme der betreffenden Verbindung, abgegeben. Je größer nun diese Bildungswärme ist, um so geringer wird die Energiesumme sein, die in der Verbindung der Atome zurückbleibt, d. h. mit anderen Worten die Beweglichkeit der Atome. Umgekehrt, je geringer die Bildungswärme, desto größere Beweglichkeit verbleibt den verbundenen Atomen. Muß man endlich gar, wie in einer Anzahl von Fällen (endothermische Verbindungen) noch Energie zuführen, um eine Vereinigung von Atomen verschiedener Elemente zu erzielen, so ist die Beweglichkeit der Einzelatome so groß, daß sie zu plötzlicher explosionsartiger Zersetzung der Verbindung führen kann.

Aus einem Vergleich der Bildungswärmen können wir nun ohne weiteres folgern, daß im Wasser (68,3 Kal.) die Einzelatome weit weniger beweglich sind als im Schwefelwasserstoff (4,6 bzw. 2,8 Kal.), was des weiteren auch durch die viel größere Beständigkeit des Wassermoleküls gegenüber dem leicht zersetzbaren Schwefelwasserstoffmolekül bewiesen wird. — Daß die Beweglichkeit der Atome einen starken Einfluß auf den Aggregatzustand des Moleküls hat, ist ohne weiteres klar. Durch Erwärmen verstärken wir bekanntlich den Bewegungsgrad von Atomen und benutzen diese Tatsache auch vielfach, um Reaktionen zu erleichtern, durch Erwärmen vermögen wir aber zugleich feste Körper zu schmelzen und zu vergasen. Weitere Beweise für die relative Starrheit des Wassermoleküls im Vergleich zum Schwefelwasserstoffmolekül sind zunächst die erst bei 1000° beginnende Dissoziation des Wassers, während Schwefelwasserstoff schon bei gewöhnlicher Temperatur allmählich zersetzt wird. Ferner gelingt die Bildung von Wasserstoffperoxyd nur unter Energiezufuhr, während Schwefelwasserstoff verhältnismäßig leicht 1—3 Atome Schwefel addiert. Die Beständigkeit dieser Wasserstoffsupsulfide läßt sich beträchtlich erhöhen, wenn man in ihnen die Atombewegungen hemmt, also eine Belastung im von Weinbergschen Sinne herbeiführt, so existiert eine kristallisierte Verbindung von Strychnin mit Wasserstofftrisulfid und eine solche von Bruzin mit Wasserstoffdisulfid. Endlich wäre noch in Betracht zu ziehen, daß das Wasser ein Verbrennungsprodukt ist, während beide Komponenten des Schwefelwasserstoffs noch brennbar sind, d. h. also noch ihre ganze Verbrennungswärme abzugeben vermögen.

Die Giftigkeit des Schwefelwasserstoffes muß gleichfalls als eine Folge des lebhaften Bewegungszustandes angesehen werden, dafür ist zwar

¹⁾ von *Weinberg*, „Kinetische Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen“. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1914.

kein strikter Beweis vorhanden, wohl aber eine Reihe von Begründungen. So nimmt zum Beispiel in der Sauerstoffgruppe die Giftigkeit der Wasserstoffverbindungen von der des Schwefels ab zu, entsprechend der zunehmenden Beweglichkeit des Selen- und Telluratoms. Um einige Beispiele aus anderen Gruppen zu greifen, so sehen wir eine enorme Giftigkeit des wenig beständigen Phosphorwasserstoffs, entsprechend der lebhaften Bewegung des Phosphoratoms. Ist dieses aber, wie in der Orthophosphorsäure oder in der Modifikation des roten Phosphors, einigermaßen zur Ruhe gekommen, so schwindet auch die Giftigkeit. Fernerhin ist der Kohlenstoff der Kohlensäure und der Karbonate, dem nur noch eine sehr geringe Bewegungsenergie zukommt, völlig ungiftig, im Kohlenoxyd jedoch, welches bei seiner weiteren Verbrennung zu Kohlendioxyd noch ebensoviel Energie abgibt als Wasserstoff bei seiner Verbrennung zu Wasser, ist das Kohlenstoffatom außerordentlich giftig. Es ließen sich diese Beispiele beliebig mehrten, auch der Geruch ließe sich als eine Folge der Atombewegung beweisen, es würde uns dies jedoch zu weit führen.

Nun könnte aber jemand kommen und alle obigen Schlüsse über den Haufen werfen wollen mit dem Einwand: Ja, wie kommt es denn, daß der Sauerstoff gasförmig und der viel beweglichere Schwefel fest ist? Nun, wir haben es hier nicht mit Sauerstoff und Schwefel als solchen zu tun, sondern mit Atomen. Wieviel Atome sich im festen Schwefel zum Reihen verbunden haben, um ihr bewegtes Wesen einzubüßen, können wir zurzeit noch nicht bestimmen, aber wir wissen, daß im Schwefeldampf eine weit lebhaftere Atom- und Molekularbewegung stattfindet, als im auf gleiche Temperatur erhitzten Sauerstoff. Beweisend sind hierfür die Vergleiche der Dissoziationerscheinungen zwischen Wasser und Schwefelwasserstoff sowie die Abnahme der Dampfdichte des Schwefels mit steigender Temperatur.

2. Wenn die Verbindung eines Atoms des festen Schwefels mit 2 Atomen des gasförmigen Sauerstoffs, das Schwefeldioxyd, gasförmig ist, so sollte man vielleicht erwarten, daß die Aufnahme eines weiteren O-Atoms im Schwefeltrioxyd erst recht zu einem gasförmigen Körper führen müßte. Statt dessen ist aber Schwefeltrioxyd eine feste Substanz. Nun ist die Bildungswärme des Schwefeldioxyds = 71,1 Kal., die des Schwefeltrioxyds aber = 103,2 Kal. Im Schwefeldioxyd ist somit ein Mehrbetrag von Energie, d. h. von Beweglichkeit enthalten, auf letzteres würde vielleicht auch der Geruch schließen lassen. Ein fernerer Beweis der Beweglichkeit des Schwefelatoms im SO_2 ist seine starke Reaktionsfähigkeit, die es als kräftiges Reduktionsmittel erscheinen läßt. Es erscheint nun auffällig, warum denn beim Verbrennen von Schwefel Schwefeldioxyd entsteht und nicht gleich das stabilere Schwefeltrioxyd. Geringe Mengen des letzteren entstehen

allerdings bei der Verbrennung des Schwefels und das ist eigentlich noch merkwürdiger, als wenn gar keines gebildet würde. Man könnte sich vorstellen, daß zunächst Schwefeltrioxyd gebildet wird und daß dieses durch den geschmolzenen Schwefel zum Dioxyd reduziert würde, während gleichzeitig der Schwefel sich zu Schwefeldioxyd oxydiert:

es müßten dann am Schlusse der Reaktion geringe Mengen Schwefeltrioxyd vorhanden bleiben, wie dies ja auch der Fall ist. Diese Annahme entbehrt allerdings jeden Beweises, wenn wir nicht auf die Analogie in der Reduktion der Schwefelsäure zu Schwefeldioxyd durch Erhitzen mit Schwefel verweisen wollen. Unverständlicher erscheint es dagegen, daß Schwefeldioxyd beim Erhitzen mit Sauerstoff nicht in Schwefeltrioxyd übergeht, außer wenn eine geeignete Kontaksubstanz vorhanden ist. In der Hitze nimmt nun aber auch die Beweglichkeit des 6wertigen S im Schwefeltrioxyd zu, wie ja doch auch die Moleküle und Atome des Schwefeldampfes bei zunehmender Temperatur das Bestreben zeigen, zu einfacherer Bauart zu zerfallen. Es muß dann Temperaturgrenzen geben, oberhalb deren der vierwertige Schwefel (wie im SO_2) die beständigere Form ist, und so ist denn auch der Schwefel im Schwefeldioxyd in der Hitze weniger beweglich als im Schwefeltrioxyd, daher zeigt das letztere auch Dissoziationerscheinungen in Schwefeldioxyd und Sauerstoff. Wir können also aus diesem Verhalten zugleich folgern: Bei gewöhnlicher Temperatur kommt dem Schwefel im Schwefeldioxyd größere Beweglichkeit zu als im Schwefeltrioxyd, in der Hitze hingegen, wo der 4wertige Schwefel die beständigere Form ist, zeigt sich das umgekehrte Verhalten, weil hier der 6wertige Schwefel in 4wertigen überzugehen bestrebt ist, was ihm vermöge der in Form von Wärme zugeführten Energie ermöglicht wird.

3. Ein ähnlicher Fall, wie zwischen Wasser und Schwefelwasserstoff, wenn auch nicht ganz so kraß, liegt vor bei dem gasförmigen Kohlendioxyd und dem festen Siliziumdioxyd. Die Bildungswärme des Kohlendioxydes liegt bei 96,9 Kal., während die Bildungswärme des Siliziumdioxydes beträchtlich höher ist. Während ersterer Körper durch Elektrizität oder durch Hitze in Kohlenoxyd und Sauerstoff dissozierbar ist, ist dies beim Siliziumdioxyd nicht der Fall. Dies alles zeugt für eine relative Beweglichkeit des C-Atomes im Kohlendioxyd. Immerhin mag es in dieser Verbindung als einem Produkt vollständiger Verbrennung schon ziemlich zur Ruhe gekommen sein, daß aber überhaupt dem atomistischen Kohlenstoff eine viel stärkere Bewegungsenergie zukommt als dem Siliziumatom, das geht aus der Unzahl von Kohlenstoffverbindungen hervor, die das Gebiet der organischen Chemie bilden, und die ferner am Aufbau von

Tier- und Pflanzenkörpern in hohem Maße beteiligt sind. —

Es ließen sich noch eine ganze Reihe von Beispielen anführen und mittels der kinetischen Theorie zur Erklärung bringen, es mögen aber hier obige 3 Fälle genügen. Kurz sei nur noch auf folgendes hingewiesen: durch Hitze, die in gewissen Effekten einer Druckverminderung gleichkommt, somit auch durch die letztere selbst wird den Atomen und Molekülen die Beweglichkeit erleichtert, weil sie nicht durch Überwindung äußerer Widerstände einen Teil ihrer Energie zu opfern brauchen, Beweise hierfür lernten wir schon in den Dissoziationerscheinungen kennen, eine leichtere Beweglichkeit, speziell von Molekülen bei vermindertem Druck, wird durch die leichtere Flüchtigkeit unter diesen Bedingungen dargetan. Auf der anderen Seite wird natürlich durch Temperaturniedrigung und Druckvermehrung die Beweglichkeit vermindert; so nimmt bei Temperaturen tief unter dem Nullpunkt die allgemeine Reaktionsfähigkeit, die doch durch die Beweglichkeit bedingt wird, stark ab. Die Wirkung von hohem Druck läßt sich am besten wieder an den Dissoziationerscheinungen demonstrieren: eine Dissoziation geht nur vor sich, bis ein bestimmter Druck, der durch die bei derselben entstehenden Komponenten erzeugt wird, vorhanden ist. Ferner läßt sich die Flüchtigkeit mancher Körper, die ungeschmolzen verdampfen, durch Druckerhöhung so herabsetzen, daß sie schmelzbar werden und einen Siedepunkt besitzen bei einer Temperatur, bei welcher sie unter normalen Verhältnissen bereits vergast sein würden; durch den erhöhten Druck ist ihre Beweglichkeit so weit vermindert, daß der durch dieselbe erzeugte Gegendruck erst jetzt imstande ist, den äußeren Druck zu überwinden.

Die kinetische Theorie bringt alte Tatsachen in neuem Gewande, was dereinst als Wahlverwandtschaft, als Affinität im frühesten Sinne gedeutet wurde, das Gleichnis von Liebe und Haß der Elemente, ferner die Anziehung zwischen elektrisch entgegengesetzten und die Abstoßung der elektrisch gleichsinnigen Teilchen untereinander, all diese Anschauungen setzen ja schon Beweglichkeit der Elementaratome und Moleküle voraus. Die kinetische Auffassung ist ja auch schon älteren Datums, aber meines Wissens hat noch niemand den Versuch unternommen, scheinbare Widersprüche chemisch-physikalischer Natur, wie die oben behandelten, mit ihrer Unterstützung aufzuklären. Die Lektüre von Weinbergs lieferte hierzu die äußere Anregung.

Besprechungen.

Roosevelt, Theodore, *Aus meinem Leben*. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1914. VIII, 500 S. Preis geh. M. 9,—, geb. M. 10,—.

In der Person Theodore Roosevelts besaßen die Vereinigten Staaten Nordamerikas einen Präsi-

ten, der den Naturwissenschaften, insbesondere der Zoologie, ein weitgehendes Interesse entgegenbrachte und sie nach Kräften zu fördern suchte. Wer unter den früheren Publikationen Roosevelts die Schilderung seiner Jagdfahrten in Ostafrika (Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers. Parey, Berlin, 1910) gelesen hat, weiß z. B., mit welcher Energie und Freudigkeit diese männlich starke, von Idealen getragene Persönlichkeit die Mühen weiter Steppenwanderungen auf sich genommen hat, um im Genuß eines freien, an Gefahren reichen Lebens gleichzeitig den amerikanischen Museen ein wertvolles Material an Bälgen der verschiedensten Tierarten zuzuführen.

Aus Roosevelts Autobiographie erfahren wir nun, wie er seine „Laufbahn als Zoologe“ schon in früher Jugend begann, indem er zunächst an einem auf dem Markt ausgestellten toten Seehund Messungen und Beobachtungen anstellte und seine Notizen zu einer Naturgeschichte dieses Tieres vereinigte, sowie, daß er mit zwei Vettern zusammen eine, aus einer Anhäufung aller möglichen, dem Knaben wertvoll erscheinenden Kuriositäten bestehende Art von Museum begründete. Bald folgte die Erlernung der Kunst des Ausstopfens und eine rationellere Sammeltätigkeit, zu der der Besitz einer Flinte und verschiedener Bücher über Säugetiere und Vögel anregten. Die Kenntnisse, die Roosevelt sich auf diese Weise aneignete, und die namentlich das amerikanische Vogelwesen betrafen, bildeten für ihn eine gute Grundlage, als er 14-jährig auf einer Reise nach Ägypten kam. An der Hand eines in Kairo erhaltenen englischen Buches verstand der Knabe, sich in die Ornithologie dieses Landes leicht einzuarbeiten und die damals von ihm gesammelten Vogelbälge gingen einige Jahre darauf in den Besitz amerikanischer Museen über. Seinen naturwissenschaftlichen Interessen blieb auch der spätere Schüler des Harvard-College treu, der ernstlich daran dachte, die Gelehrtenlaufbahn eines Zoologen einzuschlagen, doch gelangte diese Absicht nicht zur Ausführung, weil die Arbeit mit dem Mikroskop und überhaupt die Laboratoriumstätigkeit, wie sie Voraussetzung für ein tieferes Eindringen in die Biologie gewesen sein würde, den Neigungen des Studenten nicht entsprach.

Aber die Freude an der Natur geht doch durch die späteren Lebensjahre Roosevelts unvermindert hindurch. Den Blumen, den Vögeln und ebenso dem wehrhaften Großwild widmet er manch warmes und begeistertes Wort. Im engsten Zusammenhange mit diesem Empfinden stehen seine wertvollen, auf die Erhaltung von Naturschönheiten und den Schutz der Tierwelt in den Vereinigten Staaten gerichteten Bestrebungen.

Waren auch vorher bereits Reservate wie z. B. der Yellowstone-Nationalpark geschaffen worden, wo Naturerscheinungen, Wald und Wild vor rücksichtsloser Ausbeutung bewahrt wurden, waren das Yosemite-Tal und die Baumriesen Californiens unter Schutz gestellt, so veranlaßte doch Roosevelt während der 7½ Jahre seiner Präsidentschaft weitere wichtige Maßnahmen zur Konservierung solcher nationalen Reichtümer. Nicht weniger als fünf Nationalparks wurden neu geschaffen, so der Kratersee in Oregon, Wind Cave in Süddakota, Platt in Oklahoma, Sully Hill in Norddakota und Mesa Verde in Colorado; dazu vier Asyle für Großwild in Oklahoma, Arizona, Montana und Washington.

Außerdem wurden 51 Vogelschutzgebiete gegründet