Repertorium specierum novarum regni vegetabilis

auctore

F. Fedde

No. 179/181

VIII. Band

25. Juni 1910

XCVII. F. Fedde, Noch einmal *Goldmania*.

(Originalmitteilung.)

Wenn auch die Überschrift der Bemerkung auf p. 325 in der vorigen Nummer des Repertorium ohne Zweifel richtig ist, so ist dies leider nicht mit den daraus gezogenen Folgerungen der Fall. Wie mir sogleich nach dem Druck des Artikels Prof. Harms nachwies, hat Greenman für *Goldmania* den Namen *Goldmanella* in Bot. Gaz., XLV (1908), p. 199 aufgestellt. Da beim Ausziehen für den Index nov. spec. in Justs Jahresbericht dieser neue Name vergessen worden ist, so war mir die Neubenennung entgangen und ich muss wegen dieser zweifelhaften Bereicherung der Synonymik um Entschuldigung bitten.

XCVIII. *Myrsinaceae* novae tonkinenses.

Auctore Aug. de Candolle.

(Originaldiagnosen.)

1. *Maesa Boni* A. DC., nov. spec.

Frutex, ramis floriferis in sicco atro-purpureis laevibus, cum petiolis foliisque subtus et racemis pilis pallidis tomentellis. Folia ovato-acuminata, petiolo ad 1 cm longo, lamina 11 cm longa 5 cm lata, supra mox glabrata et nitida, margine supra medium obscure undulato-subdentata, membranacea, nervis secundariis circiter 8 utrinque cum centrali prominulis. Inflorescentia axillaris prope basin tantum paupere ramosa; ramis ad 3 cm longis. Pedicelli brevissimi. Sepala late ovata extus et margine pilosa. Corolla 2½ mm longa ad ⅔ connata, lobis late ovatis reflexis. Stamina 5 ad medium tubi inserta, antheris ellipticis exsertis filamentis vix brevioribus. Ovarium glabrum, placenta tota (summo apice tantum excepto) ovulis obtecta. Stilus brevis stigmatē clavato.

Tonkin; Kien-Khé, in rupestr. Dong Hâm (H. Bon, no. 3829). „Frutex ramosissimus, 10—15 dec.“ Fleurs blanches, en mars.

2. *Maesa parvifolia* A. DC., nov. spec.

Frutex, ramulis floriferis teretibus cum inflorescentiis pilis brevissimis patentibus fugaciter puberulis. Folia parva, petiolo 5 mm longo, lamina lanceolata basi cuneata apice longe acuminata (42 mm longa, 17 mm lata), margine sat profunde dentata, membranacea, nervis secundariis 8—10 subtus cum centrali prominulis. Inflorescentiae axillares 4—6 cm longae, bipinnatim ramosae. Pedicelli ad 1½ mm longi. Sepala late

ovata bene ciliata. Corolla 2 mm longa paullo ultra medium connata, lobis suborbicularibus lineis paucis pictis. Stamina ad medium tubi inserta, antheris cordatis medio dorsifixis. Stylus (in floribus ♂) brevis. Flos ♀ non visus.

Tonkin; Ké-So. (H. Bon, no. 3743). „Frutex 5—10 dec. ramosissimus, fl. albis. Bibunt foliorum infusionem.“

Cette espèce que le R. P. Bon nous dit être cultivée, se distingue de toutes ses congénères par la petitesse de ses feuilles. Elle fleurit en mars.

3. *Ardisia* (§ *Blahdia*) *kteniophylla* A. DC., nov. spec.

Subarbuscula semiprostrata (fide viatoris), glabra, ramis ultimis cinereis. Folia magna approximata, petiolo 2-centimetrali superne canaliculato, lamina tenuissima oblanceolata (30 cm longa, 11 cm lata), a triente superiori basin versus sensim attenuata, apice sensim acuminata, punctis elevato-conspicuis crebris utrinque conspersa, margine dentibus inaequalibus glanduloso-linearibus pectinata; nervis secundariis utrinque 12, cum centrali subtus prominulis, supra immersis. Inflorescentiae 25—30 cm longae, supraaxillares (? ex anaphyllorum parvorum axillis provenientes), panniculatae, ramis 3—4 cm longis apice umbelliferis. Pedicelli centimetrales bractea exigua lineari suffulti. Sepala ovato-triangularia (1 mm longa) ciliolata. Petala basi ad 1 mm coalita (4 mm longa, 2½ mm lata) ovato-acuta parce nigro-punctulata. Stamina ovata 2 mm longa, pallide lepidota, filamentis brevissimis basi coalitis. Ovarium subglobosum, ovulis paucioribus in parte superiori placentae 1-seriatis. Stylus ad 6 mm longus.

Tonkin: Ninh-Thái, in nemore collis Mudu-Lang (Bon, no. 3158). Fleurs blanches et roses, en mai.

4. *Ardisia* (§ *Acrardisia*) *tonkinensis* A. DC., nov. spec.

Arbuscula glaberrima, ramis pallide virescentibus lenticellis confluentibus subereis. Folia alterna, petiolo centimetrali, lamina obovata (135—150 mm longa, 50—60 mm lata) basin versus longe attenuata, apice breviter abrupteque acuminata, submembranacea, subtus sub lente lepidibus parvis adspersa, punctis crebris utrinque prominulis; nervo centrali subtus prominulo, secundariis utrinque circiter 15 recte patentibus. Inflorescentia terminalis corymbosa, ramis elongatis umbelliferis, umbellis 6—8-floris bracteis membranaceis nigro-punctatis oblongis ½-centimetralibus involucreis. Pedicelli ad 2 cm longi gracillimi. Sepala ovata (5 mm longa) apice rotundata fere ad basin libera, punctis lineolisque nigris notata, nec non lepidibus brunneis adspersa. Petala ad 1 cm longa ovato-acuminata basi ima inter se connata sparse nigro-punctata glabra. Antherae 5 mm longae anguste triangulares subsagittatae, rimis apice poratim dilatatis dehiscentes, dorso raro nigro-punctulatae, filamentis brevissimis ad basin corollae insertis. Ovarium subconico-ovatum punctulis atro-rubris creberrime notatum.

Tonkin: Kien-Khé, in rupestribus Dong Ham et Dong Bàu (H. Bon, no. 2142, 2541, 2912). — Vo-Xá, in monte Chuir-Hac (H. Bon, no. 2902).