(Aus der akademischen medizinischen Klinik zu Düsseldorf.)

Zur Deutung des Elektrokardiogramms.

Von

Prof. Dr. **Aug. Hoffmann.**

(Hierzu Tafel X—XIII.)

Die Untersuchung der Aktionsströme des Herzens, für welche durch die Einführung des Saitengalvanometers von Einthoven eine für die Klinik brauchbare Methodik gewonnen ist, scheint berufen zu sein, über manche bisher noch dunkle Vorgänge bei der Tätigkeit des Herzens neue Aufschlüsse zu geben. Die bisherigen Versuche, aus dem Elektrokardiogramm Rückschlüsse auf das Verhalten des Herzmuskels und seiner Tätigkeit zu ziehen, können aber deshalb nicht voll befriedigen, weil das typische Elektrokardiogramm in seinen einzelnen Teilen noch nicht gedeutet werden kann. Um so mehr macht eine Deutung der atypischen Elektrokardiogramme in ihren Abweichungen gegenüber den typischen zurzeit noch grosse Schwierigkeiten.

Bevor man über die Bedeutung der einzelnen Zacken, in welche man nach dem Vorgange von Einthoven¹⁾ die Kurve des einzelnen Herzschlages zerlegt, ein einigermaassen feststehendes Urteil hat, wird es schwer halten, aus Abweichungen einzelner derselben oder ihrer Gesamtheit Rückschlüsse auf pathologische Verhältnisse des Herzmuskels oder seiner Tätigkeit zu ziehen. Wenn trotzdem schon jetzt gewisse klinische Erfahrungen Rückschlüsse in beschränktem Maasse auf pathologische Verhältnisse zulassen, so sind dieselben doch keineswegs so sicher gestützt, dass nicht jederzeit neu gefundene Tatsachen die bisher gewonnenen Resultate in Frage stellen können.

1) Einthoven, Über das normale menschliche Elektrokardiogramm. Pflüger's Arch. Bd. 80 S. 140.

Vor allen Dingen vermisst man in den meisten der nach Versuchen mit dem neuen Instrument veröffentlichten Arbeiten jeden Zusammenhang mit den von früheren Untersuchungen gefundenen Resultaten, wenn auch diese Ergebnisse mit anderen Untersuchungsmitteln gewonnen sind. Andererseits ist eine Nachprüfung der mit älteren Methoden angestellten Versuche für das weite Gebiet der Elektrophysiologie mit dem Einthoven'schen Instrument noch nicht erfolgt. Es ist aber zu erwarten, dass auch die mit der neuen Methodik zu findenden Tatsachen mit den durch ältere Methoden festgestellten nicht im Widerspruch stehen werden, da, abgesehen von der grösseren Empfindlichkeit und Handlichkeit des Messinstrumentes, die Methoden prinzipiell die gleichen geblieben sind.

Die bisherige Auffassung des Elektrokardiogramms als Ausdruck der Tätigkeit des Herzmuskels, also des Verlaufes seiner Kontraktion, haben dazu verleitet, aus Abweichungen des typischen Elektrokardiogramms Rückschlüsse nicht nur auf eine Veränderung des Kontraktionsablaufes, sondern sogar auf die Qualität, das mehr oder weniger Intaktsein, des Herzmuskels im einzelnen Falle zu ziehen. Es müssen aber, nachdem bereits klinisch eine solche weitgehende Elektrodiagnostik des Herzens sich als nicht einwandfrei erwiesen hat, auch theoretische Bedenken dagegen auftauchen, in dem Ablaufe der Kurven des Aktionsstromes einen einfachen Ausdruck der Kontraktion zu sehen, und es verlohnt sich deshalb, die Frage der Deutung des Elektrokardiogramms weiteren klinischen Untersuchungen voranzustellen; denn erst nach befriedigender Deutung desselben wird man in der Lage sein, von einer klinischen Methode der Elektrokardiographie zu sprechen.

Der Weg zu einer grundlegenden Theorie des Elektrokardiogramms oder auch nur zu einer richtigen Abschätzung der praktischen Bedeutung desselben kann ein doppelter sein: erstens der Tierversuch und zweitens die klinische Beobachtung im Vergleich mit anderen graphischen Methoden sowie unter Heranziehung des pathologisch-anatomischen Befundes. Vor allen Dingen ist es notwendig, das Elektrokardiogramm in bestimmte Beziehung zu den einzelnen Phasen der Herztätigkeit zu bringen und festzustellen, ob der Verlauf der Kurven desselben in Form und zeitlichen Verhältnissen bestimmten, bekannten Vorgängen am Herzen entspricht.

Was nun die bisher über diese Verhältnisse veröffentlichten Studien betrifft, so ist wohl sicher festgestellt, dass die Gruppe *P*

der Erregung beider Vorhöfe entspricht. Samojloff¹⁾ stellte dieselbe durch direkte Ableitung vom Froschherzen mittelst des Kapillarelektrometers dar; ich selbst habe beim Frosch wie bei der Katze durch direkte Ableitung die Zacke *P* isoliert darstellen können; speziell gelang es mir auch mit der weiter unten beschriebenen Methodik auf das Sicherste die Identität der Zacke *P* mit den Erregungsvorgängen am Vorhofe nachzuweisen. Ganz anders verhält es sich mit den Gruppen *R* und *T*. Ich spreche hier von einer Gruppe *R* und *T* ebenso wie von der Gruppe *P*, weil in vielen Fällen sich nicht nur bei der Zacke *R*, sondern auch bei der Zacke *P* und *T* deutlich zeigt, dass dieselben aus verschiedenen Schwankungen zusammengesetzt sind, was ja auch Nicolai²⁾ veranlasste, die Gruppe *P*, welche er mit *A* bezeichnet, in eine *Aa*, *A* und *Ap*, also eine der Atriumzacke vorangehenden und eine ihr folgende Schwankung aufzulösen, während schon Einthoven³⁾ die Gruppe *R* in die Zacken *QR* und *S* auflöste (nach Nicolai *Ja*, *J* und *Jp*). Die Zacke *T* = *F* wurde von Nicolai in *Fa*, *F* und *Fp* aufgelöst. Da die Einthoven'sche Nomenklatur bisher allgemein angenommen ist, so möchte ich in dieser Arbeit diese beibehalten, besonders auch weil die Nicolai'sche Bezeichnung, welche von den Anfangsbuchstaben der Vorgänge genommen ist (Atrium-, Initial- und Finalschwankung der Kammersystole), schon eine ganz bestimmte aber zurzeit noch unbewiesene Beziehung zur Systole annimmt und so vielleicht den Tatsachen vorgreift.

Der Verlauf der Gruppe *R*, die als Initialschwankung der Systole jetzt allgemein aufgefasst wird, nachdem auch Einthoven die Zacke *Q* nicht mehr zur Vorhofkontraktion rechnet, ist eine äusserst schnell verlaufende diphasische resp. triphasische Schwankung. Auf dieselbe folgt eine mehr oder weniger parallel der Abszisse verlaufende, mitunter aufsteigende Linie, die dann nochmals durch eine langsam und sanft verlaufende, meist nach oben gerichtete Schwankung *T* unterbrochen wird.

1) Samojloff, Beiträge zur Elektrophysiologie des Herzens. Engelmann's Arch. 1906. — Elektrokardiogrammstudien. Jena 1909.

2) Nicolai und Simons, Zur Klinik des Elektrokardiogramms. Mediz. Klinik 1909 Nr. 5.

3) W. Einthoven, Über die Form des menschlichen Elektrokardiogramms. Pflüger's Arch. Bd. 60 S. 101. 1895.

Während Einthoven in der Höhe des Ausschlages *R* den Ausdruck für die Kraft der Kontraktion des Herzens sieht und diese als den Maassstab für die Kraft der Herzkontraktion betrachtet, hat Kraus¹⁾ der Zacke *T* eine besondere klinische Bedeutung beigelegt. Er bezeichnet die Aufsplitterung und das vollständige Fehlen von *T* als Ausschlag nach oben als pathognomisches Zeichen für einen kranken Herzmuskel. „Ist die Splitterung jedoch stark ausgeprägt, so finden sich für gewöhnlich auch noch andere Anomalien der Kurve, und die betreffenden Individuen haben einen klinisch unzweifelhaft kranken Herzmuskel“, und an anderer Stelle: „Der speziell diagnostische Wert des Fehlens von *T* liegt vielmehr darin, dass wir eine exakte, für den Patienten weniger strapaziöse Methode besitzen, um z. B. in Fällen von „Neurasthenie“, im ersten Stadium von Arteriosklerose, bei „Unfallherzen“, beim „Tropenherz“ usw., in welchem Falle die Fragestellung manchmal klinisch sonst höchst schwierig liegt, bestimmt zu entscheiden, dass das Myocard nicht normal ist. Andere Male vermögen wir ebenso, z. B. in einem Fall von Alkoholherz, selbst mit mässiger Erweiterung von Herzdämpfung, mit starken subjektiven Beschwerden, sicher auszusagen, der Herzmuskel verhält sich in einer auf das Wesentliche seiner Tätigkeit betreffenden Richtung nicht abnorm; wir können einen ängstlichen Neurastheniker beruhigen usw.“ Dies sind die wichtigsten Folgerungen, welche bisher aus dem Verhalten der beiden in den Bereich der Systole fallenden Gruppen *R* und *T* gezogen sind. Ich sehe hier ganz ab von den Abweichungen, welche diese Gruppen bei den verschiedenen Formen der Irregularität des Herzens zeigen; es handelt sich hier ja zunächst nur um die Feststellung der Bedeutung des typischen Elektrokardiogramms. Diese rein empirisch gewonnenen Schlüsse sind experimentell und eingehend noch nicht geprüft worden.

Was nun zunächst die Einthoven'sche Ansicht anbetrifft, dass die Höhe der Zacke *R* mehr oder weniger einen Maassstab für die

1) Kraus und Nicolai, Über das Elektrokardiogramm unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Berl. klin. Wochenschr. 1907 Nr. 25 und 26.

Kraft der Herzkontraktion abgibt, so hat Einthoven¹⁾ schon eine gewisse Schwierigkeit in dem Verhalten der atypischen Elektrokardiogramme bei Extrasystolen gefunden, wenngleich er sein Kapitel mit den Worten einleitet, „man hat allen Grund, anzunehmen, dass bei der Vergleichen einiger nahezu dieselben Formen besitzenden Elektrokardiogramme die Höhe der Spitzen einigermaassen einen Maassstab für die Kraft der Herzkontraktion angibt“. Die Tatsache, dass die atypischen Kontraktionen oft einen bedeutend grösseren Ausschlag des Galvanometers bewirken als die typischen, obwohl sie doch einer schwächeren, erfolgloseren Kontraktion entsprechen (je länger die Pause, um so stärker, je kürzer, um so schwächer fällt die Kontraktion aus), machen ihm einige Bedenken; er glaubt aber, dass die Verfrühung der Extrasystole bisweilen so gering ist, dass sie kaum in Betracht gezogen zu werden braucht, und aus dem Puls schliesst er, dass der Effekt, wahrscheinlich auch die Kraft, bei beiden Kontraktionsarten nur wenig verschieden ist, ja er nimmt als bewiesen an, „dass die Kraft von jeder seiner (des Patienten R.) atypischen Kontraktionen wenig geringer ist als die Kraft einer normalen Systole“.

Die klinische Untersuchung zeigt weiter, dass die Zacke *R* in vielen Fällen von schwacher Herztätigkeit bei gleicher Ableitung und Fadenspannung grösser ist als bei kräftigem, ja hypertrophischem Herzen. Zugleich ist schon ein Widerspruch darin zu finden, dass bei Lageveränderungen, wie in meiner Klinik Dr. Grau²⁾ eingehend nachwies, die Zacke *R* bei demselben Menschen sehr verschiedene Höhe zeigt. Noch weniger wird dieser Maassstab einleuchtend, wenn, wie Einthoven³⁾ weiter ausführt, die Zacke *R* wesentlich ein Ausdruck der Arbeit des rechten und die Zacke *S* ein solcher des linken Ventrikels sein soll. Dann aber noch kommt hinzu, dass Zacke *R* bei den verschiedenen Ableitungen I (r. Arm, l. Arm), II (r. Arm, l. Bein), III (l. Arm, l. Bein) ganz verschiedene Höhe

1) W. Einthoven, Weiteres über das Elektrokardiogramm. Pflüger's Arch. Bd. 122 S. 517.

2) Grau, Über den Einfluss der Herzlage auf die Form des Elektrokardiogramms. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 69.

3) W. Einthoven, Weiteres über das Elektrokardiogramm. Pflüger's Arch. Bd. 122 S. 517.

bei demselben Individuum zeigt. Welche Ableitung gibt denn die Kraft richtig an? Noch schwieriger wird die Deutung, wenn man bedenkt, dass die Zacke *R* zum grössten Teil der Kontraktion vorausgeht, sich also durchaus nicht zeitlich deckt mit der Austreibungszeit des Herzens, in welcher der eigentliche Effekt der Herzkontraktion zum Ausdruck kommt, und in welcher das Herz seine Kraft in Arbeit umsetzt. Schon diese theoretische Überlegung macht es unwahrscheinlich, dass die Höhe der Zacke *R* irgendeine Beziehung zur Herzarbeit hat.

Es bedarf also weiterer Untersuchungen, um die Deutung des ersten Teils des Kammerelektrokardiogramms festzustellen.

Weitere Untersuchungen bedarf aber auch die Bedeutung der Zacke *T*. Die von Kraus¹⁾ zuerst geäusserte Ansicht, dass Veränderungen der Spitze *T* mehr oder weniger beweisend für eine Erkrankung des Myocards sein sollen, ist von Einthoven²⁾ übernommen worden. Über die Gruppe *T* liegt bereits eine Reihe von Beobachtungen vor. Ich beschränke mich hier nur auf die Betrachtung der Spitze *T* bei der Ableitung I, d. h. von Hand zu Hand. Es ist bekannt, dass sie nach den Untersuchungen von Einthoven²⁾, Nicolai und Müller³⁾ nach Arbeit gewöhnlich stärker wird; bei Vergiftungen tritt mitunter im Anfang eine Vergrösserung und nachher eine Verkleinerung der Nachschwankung ein (Kraus, Nicolai); vor dem Tode des Versuchstieres wird sie kleiner und verschwindet (dieselben Autoren); bei starkem Blutverlust und in Chloroformnarkose soll *T* kleiner oder gar negativ werden (Einthoven). Ein Einfluss des Alters auf *T* wird ebenfalls behauptet (Nicolai), im Greisenalter wird sie kleiner oder verschwindet. Es ist demnach eine Reihe von Umständen bekannt, welche ein Kleinerwerden und Verschwinden von *T* hervorrufen sollen: Herzinsuffizienz, Myodegeneratio, Blutverlust, Chloroformnarkose, Vergiftung, Greisenalter. Zahlreiche von mir aufgenommene Kurven zeigen, dass trotz Myodegeneratio und trotz bestehender Herzinsuffizienz die Gruppe *T* wohl

1) Kraus und Nicolai, l. c. Das Buch „Das Elektrokardiogramm“ erschien nach Drucklegung dieser Arbeit und konnte nicht berücksichtigt werden.

2) W. Einthoven, Weiteres über das Elektrokardiogramm. Pflüger's Arch. Bd. 122 S. 517.

3) Müller und Nicolai, Über den Einfluss der Arbeit auf das Elektrokardiogramm des Menschen. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 22 Nr. 2.

ausgebildet sein kann. Ganz besonders betrifft dieses Herzen, bei denen die Insuffizienz mit einer starken Beschleunigung der Herztätigkeit einhergeht. Die Fälle von erhaltener Nachschwankung bei Insuffizienz des Herzens sind so häufig, dass die einfache Folgerung, Fehlen der Gruppe *T*, ergo geschädigter Herzmuskel, sich nicht aufrechterhalten lässt. Diese meine schon im September 1908 geäußerte Anschauung wird durch die Untersuchungen von Simons und Nicolai¹⁾ bestätigt, die ebenfalls in Fällen von klinischer Herzinsuffizienz die Gruppe *T* erhalten fanden. Umgekehrt fehlt die Gruppe *T* im Alter, aber auch sonst bei Menschen, bei denen keinerlei Anzeichen einer Herzinsuffizienz klinisch nachzuweisen sind. Es ist aber andererseits eine Tatsache, dass oft ein Fehlen resp. Kleiner- oder Negativwerden der Gruppe *T* mit Herzschwäche zusammentrifft. Über die Gründe soll am Schluss der Arbeit diskutiert werden.

Ein Grösserwerden ist bisher beobachtet worden erstens bei kräftigen Personen, zweitens nach Arbeit, und zwar nicht nur bei suffizienten, sondern auch bei insuffizienten Herzen (Nicolai, Simons), drittens im Anfangsstadium einiger Vergiftungen (Kraus, Nicolai). Kraus²⁾ betont, dass die Höhe der Nachschwankung bei solchen Leuten gross sei, die vermehrte Ansprüche an das Herz mit einer Vergrösserung der Füllung beantworten, d. h. solchen, bei denen das autonome System die Kompensation übernimmt; dagegen soll bei solchen Kranken, die mit vermehrter Schlagfrequenz (Sympathicuswirkung) regulieren, die Gruppe *T* kleiner sein.

Was das Verhalten des Herzens nach Arbeit anbetrifft, so kann ich bestätigen, dass in sehr vielen Fällen, wo die Gruppe *T* vorher kleiner war, nach einigermaassen erheblichen Muskelanstrengungen sie sich sehr deutlich zeigt, zugleich damit regelmässig eine Beschleunigung der Herztätigkeit verbunden, und gerade diese Beschleunigung der Herztätigkeit scheint mir für das Anwachsen der Gruppe *T* das Wesentliche zu sein. Bei Beschleunigung der Herzaktion wird zunächst die Herzpause verkürzt, d. h. die zwischen den einzelnen Herzrevolutionen liegende Ruhezeit. Die Dauer der Systole (Systole plus Diastole) bleibt bei mässiger Erhöhung der Pulsfrequenz

1) Nicolai und Simons, l. c.

2) Kraus, Diskuss. Bun. Verhandl. des Kongresses f. innere Medizin. Wiesbaden 1909.

erhalten. Tritt aber stärkere Beschleunigung ein, so verkürzt sich auch die Systole und nicht nur die Pause (Frey und Krehl)¹⁾. Bei diesen Systoleverkürzungen besonders tritt die Erhöhung von *T* ein. Ich fand in allen Fällen, welche ich im Laufe der letzten 2 $\frac{1}{2}$ Jahre elektrokardiographisch untersucht habe, dass einer Verkürzung der Systole eine besonders ausgeprägte Gruppe *T* entspricht. Sehr schön zeigt dieses Fig. 1, bei der chronotrope Einflüsse wirksam sind. Die hier bestehende Irregularität wird durch vom Atrium ausgehende Systolen hervorgerufen; demgemäss ist die typische Form des Elektrokardiogramms auch nicht verändert. Man kann die Gruppe *T* bei allen Systolen deutlich erkennen. Es zeigt sich nun, dass die Zacke *T* bei einzelnen Schlägen verschieden hoch ausfällt. Bei den Schlägen, bei denen sie besonders hoch ist, lässt sich deutlich eine Verkürzung gegenüber den Systolen mit niedrigem *T* nachweisen. Auch bei Fällen von Hyperthyreoidismus zeigt sich das abnorme Grösserwerden von *T* mit Kürzerwerden der Systole. Bei diesen Kranken bemerkt man oft einen abnorm schnellen Verlauf der im Elektrokardiogramms darstellbaren Systole. Wenn man dieses Verhalten mit dem bei Herzinsuffizienz vergleicht, so geht daraus hervor, dass ein schneller Ablauf der Kontraktion eine Vergrösserung von *T* zur Folge hat, ein langsamer Ablauf eine Verkleinerung. Da viele insuffiziente Herzen wahrscheinlich einen verlangsamten Kontraktionsablauf zeigen, so kann deshalb eine Verkleinerung von *T* eintreten, wird umgekehrt durch Arbeit bei solchen Herzen der Erregungsablauf beschleunigt, dann tritt *T* wieder auf resp. wird grösser. Es zeigt sich also, dass *R* von der Kontraktilität resp. von der Kontraktion unabhängig sein kann, während *T* gewisse Beziehungen zum Ablauf der Systole hat.

Zu einem Verständnis des Verhaltens der einzelnen Gruppen kann man aber nur dann kommen, wenn man festzustellen sucht, was denn eigentlich im Elektrokardiogramm geschrieben wird. Nach den Ausführungen von Einthoven, Kraus und Nicolai soll das Elektrokardiogramm ein Ausdruck für die Kontraktionsvorgänge im Herzen sein; es soll gewissermaassen ein getreues Spiegelbild der Verhältnisse der Muskulatur des Herzens während des Kontraktionsablaufes sein.

1) v. Frey u. Krehl, Untersuchungen über den Puls. Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt., 1890 S. 31.

Von dem Grundsatz ausgehend, dass die gereizte resp. tätige Materie sich gegenüber der nicht gereizten resp. untätigen zinkartig verhält, muss der Weg der Erregung resp. der Kontraktion gesucht werden, der die eigentümliche Form des Elektrokardiogramms erklären soll. Nicolai¹⁾ erklärt die *R*-Zacke für einen Ausdruck der Erregung des basalen Teils des papillaren Muskelsystems. Die Erregung pflanzt sich bis zur Spitze fort; wenn sie dort anlangt, ist die Kurve bereits wieder abgesunken. Der darauf folgende wagerechte Verlauf der Kurve soll der allseitigen Kontraktion der gesamten Kammermuskulatur (zirkuläre Muskelschicht) entsprechen, und in diesem Intervall soll sich die entstehende Potentialdifferenz so ausgleichen, dass keinerlei Ausschläge nach der einen oder anderen Seite erfolgen. Die Zacke *T* soll die Rückkehr des Erregungsvorganges zur Herzbasis andeuten (durch die äussere Längsmuskelschicht des Herzens?). Von Gotch²⁾ ist eine auf embryologische Verhältnisse zurückgeführte Erklärung gegeben, indem er annimmt, dass die Erregung den Vorhöfen durch den rechten Ventrikel zur Herzspitze und von dort durch die linke Kammer zum Aortenteil zurückläuft. Die Zacke *R* würde dem ersten Vorgang, die Zacke *T* dem letzteren entsprechen, wobei die Basis des Herzens sowohl zu Anfang wie zum Schluss der Revolution negativ ist. Beide Erklärungen so bestechend sie zunächst scheinen haben doch etwas Gezwungenes. Vor allen Dingen muss es auffallen, dass die Schwankungen *Q*, *R*, *S* so rasch verlaufen, während die Schwankung *T* einen langsamen, verweilenden Verlauf nimmt. Dies muss das Bedenken erwecken, ob denn die in *R* und *T* verzeichneten Vorgänge gleicher Art sind, oder ob es nicht vielleicht etwas Verschiedenes ist, was einerseits *R*, andererseits *T* anzeigt.

Die Nicolai'sche Auffassung, dass es sich bei der Zacke *R* um eine reine kräftige Negativität der Herzbasis gegenüber der Spitze handelt, die sich gewissermaassen in gerader Linie zur Spitze hin fortbewegt, liesse auf eine grosse Geschwindigkeit der Leitung schliessen, da die ganze Gruppe *R* nur einen geringen Zeitwert hat; ich berechne denselben beim menschlichen Elektrokardiogramm auf

1) Nicolai in Nagel's Handbuch der Physiologie. Zentrabl. f. Phys. 1907 Nr. 20.

2) Gotch, Capillary Electrometer Records of the electrical changes during the natural beat of frogs heart. Proceedings of the Royal Soc. vol. 79. 1907.

etwa 0,1 Sekunde. Auch bei vermehrter Schnelligkeit der Herzrevolutionen zeigt sich an der Zacke *R* keine weitere Veränderung, als dass sie mitunter kleiner wird. Wir wissen durch die Untersuchungen von Hering¹⁾ und Salzmann²⁾, dass sich die Papillarmuskeln in der Regel vor dem Konus der rechten Kammer kontrahieren. Wenn das Elektrokardiogramm der Ausdruck der Kontraktionen sein soll, so müsste bei der ersten Kontraktion der Papillarmuskeln sich die Negativität umgekehrt verhalten, da der Papillarmuskulatur der Erregungsreiz von ihrem Ansatz an der Herzwand zugeführt wird und der Verlauf der Papillarmuskeln von der Spitze zur Basis hinauf gerichtet ist.

Die Strecke zwischen *R* und *T*, welche namentlich bei langsam schlagenden Herzen häufig ganz wagerecht verläuft, soll die Zeit darstellen, in der sich die allseitige Kontraktion der Ringmuskelschicht abspielt. Hier nimmt Nicolai einen Ausgleich der verschiedenen Potentialdifferenzen an, so dass keine eigentliche wirksame Potentialdifferenz zwischen Spitze und Basis resp. den Herzteilen, welche durch die Arme abgeleitet werden, besteht. Ist schon an und für sich ein derartiges Verhalten der sich angeblich nacheinander kontrahierenden Teile und der in vielfach verschlungenen Richtungen verlaufenden Muskelfasern unwahrscheinlich, nämlich dass alle durch die Kontraktion der einzelnen Fasern entstehenden Potentialdifferenzen sich zu einem plus minus Null ausgleichen und somit der Darstellung gänzlich entgehen, und dass dies so regelmässig und gleichmässig erfolgen soll, dass bei jedem Herzschlage ein identisches Verhalten sich zeigt, so wird diese Annahme eigentlich durch den langsamen Ablauf der Schwankung *T* noch unwahrscheinlicher gemacht.

Die Zacke *T* soll die Rückkehr der Negativität zur Basis durch die Kontraktion der äusseren Muskelschicht andeuten. Diese verhältnismässig dünne und für die Leistung des Herzens erst in zweiter Linie in Betracht kommende Muskelschicht soll nunmehr die an Dauer längste und nach der Annahme von Kraus und Nicolai³⁾ für die Beurteilung

1) Hering, Über den Beginn der Papillarmuskelaktion etc. Pflüger's Arch. Bd. 126 S. 225.

2) Salzmann, Über die Fortpflanzung der Kontraktion im Herzen mit besonderer Berücksichtigung der Papillarmuskeln. Skand. Arch. f. Physiol. 1908.

3) Kraus und Nikolai, l. c.

der Herztätigkeit wichtigste Zacke bilden. Wenn die Erklärung von Nicolai und zugleich die klinische Deutung richtig wären, so müsste ganz wesentlich das Verhalten der äusseren Muskelschicht für die Herzkraft von Bedeutung sein.

Noch weniger einleuchtend scheint mir die Erklärung von Gotch (l. c.) zu sein, bei dem sich zunächst die rechte Kammerbasis, dann die rechte Herzspitze, dann die linke Kammerbasis und zuletzt erst die linke Kammerbasis kontrahieren soll. Für einen solchen Verlauf, der noch dazu recht langsam vor sich gehen müsste, sprechen jedenfalls die Versuche von Hering und Salzmann¹⁾ in keiner Weise.

Bei allen diesen Autoren findet man das ganze Kammerelektrokardiogramm gleichgestellt mit dem Ablauf der Kontraktion; die Tätigkeit des sich kontrahierenden Muskels wird zu dem ganzen sogenannten Kammerelektrokardiogramm direkt in Parallele gestellt. Es handelt sich aber beim Kammerelektrokardiogramm sicher nicht nur um den Ausdruck der Bewegung des Herzens. Schon die Kritik der angegebenen Erklärungen lässt erkennen, dass die Kontraktilität des Herzens nicht den adäquaten Ausdruck im Elektrokardiogramm finden kann.

Zunächst besteht für die Kontraktion eine gewisse Latenzzeit. Bei suspendierten Froschherzen beginnt das Elektrokardiogramm z. B. bereits 0,18 Sekunden (Fig. 2) vor der am Suspensionshebel erkennbaren Kontraktion des Muskels. Die Latenzzeit wechselt in ihrer Länge. Auf Fig. 4e beträgt sie z. B. 0,26—0,28 Sekunden. Der Spitzenstoss ist in Fig. 3 durch ein Cremer'sches²⁾ Telephon auf ein kleines Saitengalvanometer übertragen, wodurch zwischen dem ersten Vorwölben der Herzspitze und der Saitenschwingung eine Zeitdifferenz nicht entsteht. Es ist also die Zeichnung des Spitzenstosses in der Kurve genau mit diesem gleichzeitig. Auch hier zeigt sich eine Latenzzeit von mindestens 0,08 Sekunden zwischen dem Beginn der Zacke *R* und dem Beginn des Spitzenstosses. Da letzterer in der Anspannungszeit entsteht, also vor der Austreibungszeit, so kann die Zacke *R* nicht den in der Austreibungszeit wirksamen Kräften ihre Entstehung verdanken. Sie kann in ihrer Grösse nicht einen Maassstab für die Kraft des Herz-

1) l. c.

2) Cremer, Über die Registrierung mechanischer Vorgänge auf elektrischem Wege, speziell mit Hilfe des Saitengalvanometers. Münch. medicin. Wochenschr. 1907.

muskels darstellen. Es geht also die elektrische Schwankung der eigentlichen Tätigkeit des Herzmuskels weit voraus, was auch im menschlichen Elektrokardiogramm, wenn man dasselbe zugleich mit dem Spitzenstoss aufnimmt, deutlich zu erkennen ist. (Fig. 3.) Daraus geht doch wohl hervor, dass, während bereits das Elektrokardiogramm sich abzeichnet, die Muskeln noch eine, wenn auch geringe Zeit sich vollständig untätig verhalten. Würde das Kammerelektrokardiogramm die Folge der Kontraktion sein, so könnte es nicht derselben zum Teil vorausgehen. Die experimentelle Nachprüfung wurde in folgender Weise vorgenommen: Es wurde die Suspensionsmethode mit der Aufnahme des Elektrokardiogramms vereinigt, und zwar in der Weise, dass das Tier unmittelbar unter den Aufnahmeapparat gebracht wurde, so dass die Suspensionsfäden direkt an Aluminiumhebeln über dem Tiere befestigt waren, und zwar vor der Achse derselben. Am Ende des Hebels war ein langer Strohhalm senkrecht rechtwinklig nach unten angeklebt, so dass die Ausschläge genau wie das Elektrokardiogramm von links nach rechts zu lesen und dabei nach oben gerichtet sind. Zunächst wurden Versuche am Katzen- und Hundeherzen vorgenommen. Die Suspensionskurve der Kammer zeigt beim Herzflimmern nur geringe unregelmässige Ausschläge, die des Vorhofes noch rhythmisch erfolgende. Während derselben Zeit durchtoben starke Potentialschwankungen das Galvanometer und bringen hier langsam verlaufende, aber sehr ausgiebige Schwankungen hervor. Diese Ausschläge sind bedeutend grösser als das unmittelbar vorher bei derselben Fadenspannung aufgenommene Elektrokardiogramm. Es zeigt also hier ein ganz inkoordiniert wühlendes Herz, welches sich kraftlos um seinen Inhalt abmüht, stärkere Potentialdifferenzen als das vorher kräftig schlagende. Bezeichnend hierbei ist, dass die Ausschläge langsam wie bei Gruppe *T* des typischen Elektrokardiogramms verlaufen, entsprechend dem sichtbaren relativ langsamen Verlauf der „fibrillären“ Kontraktionen beim Flimmern.

Weitere Versuche wurden an Fröschen vorgenommen, und zwar an Froschherzen teils in situ, teils an ausgeschnittenen. Wenngleich das Elektrokardiogramm des Frosches nicht ganz identisch mit dem des Menschen ist, so eignet sich doch dasselbe wegen der langsamen Aktion sehr wohl zu grundlegenden Versuchen. Die Versuche in situ wurden einfach so angestellt, dass der leicht curaresierte Frosch unter die Suspensionshebel gebracht, dann das Herz freigelegt und Vorhof und Ventrikel oder letzterer allein an die Suspensionshebel

angehakt wurden. Vom Sinus und von der Herzspitze aus wurde entweder mit unpolarisierbaren Elektroden oder vermitteltst neu-silberner Serres-fines zum Galvanometer abgeleitet. Die so erhaltenen Kurven sind oft etwas abweichend von der „typischen“ Form, lassen aber deutlich die drei Gruppen *P*, *R* und *T* erkennen; vor allen Dingen bemerkt man, dass Gruppe *T* sich häufig sehr lange hinzieht. Es mögen dabei leichte Irritationen des Herzens beim Manipulieren die veränderte Form bedingen. Zur Feststellung des zeitlichen Verlaufes ist aber die Kurvenform weniger von Belang. Die Kurven haben bei verschiedenen Tieren oft bei anscheinend derselben Ableitungsstelle recht verschiedene Formen; doch sind die drei Gruppen stets herauszuschälen. Das Einkammerelektrokardiogramm des Frosches steht dem Zweikammerelektrokardiogramm des Säugetieres in seiner Form ausserordentlich nahe. Es zeigt sich nun, dass beim Muskarin vergifteten, durch Atropin wieder zum Schlagen gebrachten Herzen, trotzdem der Ausschlag des Suspensionshebels ein immer stärker werdendes Nachlassen der Kontraktilität anzeigt, die Ausschläge am Galvanometer bei unveränderter Ableitung und unveränderter Fadenspannung doch gross bleiben, ja mitunter sogar anwachsen können (Fig. 4*a*, *b*, *c*, *d*, *e*). In Fig. 5, ein menschliches Elektrokardiogramm mit graphischer Aufnahme der Carotis bei Extrasystolenarhythmie. Es ist die von Einthoven gegebene Erklärung, dass die Extrasystole den gleichen Effekt und die gleiche Kraft wie die Systole hat, keineswegs zutreffend. Die Extrasystole hat, wenn sie recht früh nach der letzten Systole einsetzt, so gut wie gar keinen motorischen Effekt; noch wichtiger aber erscheint mir, dass die erste normale Systole nach einer Extrasystole, die aus dem Grunde, dass das Herz in der kompensatorischen Pause sich mehr ausruht und an Kontraktilität und Leistungsvermögen gewinnt, keinen abnorm hohen Ausschlag des Elektrokardiogramms erkennen lässt. Auch bei den nach Art der Bowditch'schen Treppe schlagenden Herzen (Fig. 6), wobei die einzelnen Systolen am Suspensionshebel zunehmende Stärke zeigen, sind die Elektrokardiogramme in Höhe der Zacke *R* einander gleich. Ebenso verhält es sich bei der alternierenden Herztätigkeit. *R* bleibt gleich, während *T* mitunter das Alternieren zeigt. Es ist demnach die Ansicht voll zulässig, dass die Höhe der Spitze *R* einen Maassstab für die Kraft der Herzkontraktion nicht abgibt. Die Höhe der Spitze *R* verdankt anderen Umständen ihre Verschiedenheit.

Die Versuche am ausgeschnittenen Froschherzen wurden in folgender Weise vorgenommen. Das ausgeschnittene Herz wurde in einem kleinen Glasrichter befestigt. Durch das Rohr des Trichters wurde ein feiner Kupferdraht bis in den Hals desselben geführt, dann das Rohr mit Paraffin ausgegossen. Vor dem Erkalten des Paraffins wurde eine kleine Korkplatte in den Hals des Trichters gebracht, die mittelst einer hakenförmig gebogenen Nadel in dem erstarrenden Paraffin befestigt wurde. Das ausgeschnittene Herz wurde mit dem Sinusende mit Hilfe zweier Stecknadeln auf der Korkplatte festgesteckt und dann an Vorhof und Kammer mittelst kleiner Serres-fines suspendiert. Einige Tropfen Kochsalzlösung in den Trichter gebracht, stellten leitende Verbindung zwischen Sinus und dem durch die Trichterröhre gezogenen Kupferdraht her; der andere Pol wurde mit einer neusilbernen Serre-fine von der Spitze abgeleitet. In einzelnen Versuchen wurden unpolarisierbare Elektroden verwandt, aber es ergab sich kein wesentlicher Unterschied in den Kurven. Füllt man den Trichter bis zur Artrioventrikulargrenze mit physiologischer Kochsalzlösung, so ist ohne Veränderung der Lage des Herzens damit eine Ableitung von Herzspitze und Basis der Ventrikel gegeben, da die Vorhofpotentiale durch die Kochsalzlösung sich ausgleichen. Ebenso ist man in der Lage, Herzgifte, destilliertes Wasser usw. direkt an den Vorhof oder an das ganze Herz zu bringen, indem man die betreffende Lösung in den Trichter bis zu verschiedener Höhe einfüllt. Durch Absaugen mit einer Pipette kann man diese jederzeit wieder entfernen. Fig. 7 ist von einem Froschherz in situ gewonnen. *a* Ableitung vom Sinus und Herzspitze, *b* Ableitung von Kammerbasis zur Kammer Spitze. Aus diesen Elektrokardiogrammen ergibt sich zunächst die Identität der Zacke *P* mit der Vorkammerkontraktion. Der gleichzeitig suspendierte Vorhof zeigt nun in der Kurve, dass die Vorhofkontraktion ganz erheblich länger dauert als die Zacke *P* und ihr um einige Hundertstel Sekunden nachfolgt. Es entspricht der oben geäußerten Ansicht, dass auch die Zacke *P* nicht der Ausdruck der gesamten Muskelkontraktion ist, denn wenn dieses der Fall wäre, so müsste sie wenigstens so lange dauern wie vom Beginn der Vorhofkontraktion bis zum Beginn des absteigenden Kurvenschenkels, der dem Augenblick entspricht, in dem der Vorhof erschläft. Die geringe Muskelmasse der Vorhöfe lässt es erklärlich erscheinen, dass der „Aktionsstrom“ sehr schwach ist und in seinem weiteren Teile nicht zum

Ausdruck kommt. In Fig. 8 sieht man die Einwirkung des destillierten Wassers auf das ausgeschnittene Herz. Trotzdem die Kontraktion nicht nur am Suspensionshebel, sondern auch für das Auge immer kleiner und langsamer wird, werden die Ausschläge des Galvanometers nicht schwächer. Die sich kaum noch zusammenziehende Kammer, in der nur mit grösster Aufmerksamkeit noch leise Zuckungen bemerkbar sind, gibt noch kräftige Elektrokardiogramme. Bei weiteren Schädigungen durch destilliertes Wasser (Fig. 8 a, b, c, d) zeigen sich trotz stillstehender Kammer noch vereinzelte Ausschläge am Galvanometer.

Fig. 9 zeigt die Elektrokardiogramme von durch mechanische Reizung bei stillstehendem Herzen hervorgerufenen Systolen, die durch Berührung mit einem gespitzten Glasstab hervorgerufen wurden. Trotzdem die Kammerrevolutionen ausserordentlich schwach sind, zeigen sich wohlausgeprägte Kardiogramme, die auch, der Kammerzacke folgend, durch irreziproke Leitung erzeugte deutliche Vorhofzacken zeigen, obwohl der durch Wasser gequollene Vorhof gar nicht in Aktion tritt. Diese Versuche zeigen ein direktes Missverhältnis zwischen Elektrokardiogramm und der Muskeltätigkeit. Ein in seiner Muskulatur schwer geschädigtes Herz gibt unveränderte, gar noch grössere Ausschläge am Saitengalvanometer wie das vorher kräftig arbeitende. Ein weiterer Versuch wurde noch gemacht, indem das in situ befindliche Herz mit Paraffin von niedrigem Schmelzpunkt plötzlich überschüttet wurde. Die Herzbewegungen hörten sofort durch den mechanischen Druck des Paraffins auf, das Herz wurde vollkommen blutleer ausgedrückt; trotzdem gingen kräftige Elektrokardiogramme von diesem Herzen aus, bis auch diese endlich aufhörten. Auch Fano und Fayod¹⁾ fanden, dass, wenn der Vorhof des Schildkrötenherzens durch Spannung immobilisiert wurde, der „elektrische Puls“ des Vorhofes weiterbestehen, ja sogar zunehmen kann.

Weitere Resultate ergaben die Experimente mit Herznervengiften. Das Herz, welches mit Muskarin gelähmt wurde, gibt trotzdem beim Reizen vom Sinus aus eine deutliche Vorhof- und Kammerzacke im Elektrokardiogramm; es war hierbei nicht die geringste Bewegung am Herzen zu konstatieren (Fig. 4 b). Nach Injektion von Atropin

1) Fano und Fayod, Di alumi rapporti fra le proprietà contrattili es le electriche degli atri cardiaci. Mantova 1887.

belebt sich das Herz wider (Fig. 4c), aber es zeigt sich kein Anwachsen der Spitze *R* bei zunehmender Systolengrösse.

Da sich die Grundeigenschaften des Herzmuskels die ganze Wirbeltierreihe hindurch bisher als gleich erwiesen haben, so kommt diesen Versuchen eine weitergehende Bedeutung zu. Sie beweisen, dass der Verlauf des Elektrokardiogramms wenigstens teilweise vom Ablauf der Kontraktionen unabhängig ist. Ob der Muskel sich kontrahiert oder nicht, ist nicht ausschlaggebend für die Grösse der Zacken *R* des Elektrokardiogramms. Die Aufhebung der Kontraktilität bei noch erhaltenem Leitungsvermögen, welches ja auch das Bestehen einer gewissen Erregbarkeit voraussetzt — denn Leitung pflanzt sich von Punkt zu Punkt durch eine Alteration der leitenden Materie fort —, zeigt kein Schwinden der durch die Erregung entstehenden Potentialdifferenzen. Es ist deshalb anzunehmen, dass das, was das Elektrokardiogramm in dem Gruppe *R* genannten Teile schreibt, nicht die Kontraktionswelle, sondern die Erregungswelle ist.

Die Erregungswelle wird unter normalen Verhältnissen von einer Kontraktionswelle gefolgt; es sind aber in pathologischen Fällen wie im Experiment Verhältnisse denkbar, dass trotz normal verlaufender Erregungswelle die Kontraktionswelle nicht derselben folgt. Diese kann auch sonst verändert sein. So kann sie verlangsamt sein, sie kann gewisse Teile des Herzens unkontrahiert lassen. Diese Erregungswelle, deren Geschwindigkeit man bisher nur an der Geschwindigkeit des Fortschreitens der Kontraktion messen konnte, indem an zwei Punkten eines Muskels die Kontraktionszeit genau festgestellt und aus der Differenz die Geschwindigkeit der Leitung berechnet wurde, ist in ihrem eigentlichen Wesen unbekannt. Es handelt sich hier um den alten Streit, ob die Erregbarkeit resp. Reizbarkeit von der Kontraktilität verschieden ist. Hering hat eine gegenseitige Abhängigkeit der Reizbarkeit, der Kontraktilität und des Leitungsvermögens der Herzmuskelfasern angenommen, während Engelmann an der Selbständigkeit der verschiedenen Eigenschaften festhält. Es hiesse auf den Streit um die myogene oder neurogene Theorie eingehen, wollte ich hierzu weitere Ausführungen machen. Das ist aber nicht beabsichtigt. Jedenfalls wird das Elektrokardiogramm uns verständlich, wenn wir wenigstens für den instanten Teil, die Gruppe *R*, den Ablauf eines Reiz- oder Erregungsvorganges durch den Herzmuskel als Ursache ansehen.

Schwieriger werden die Verhältnisse der Gruppe *T* zu deuten sein. Die Gruppe *T*, welche ja im allgemeinen langsamer, träger verläuft als die Gruppe *R*, ist in ihren zeitlichen Verhältnissen zur Kammerkontraktion, wie es die Suspension zeigt, so gestellt, dass ihr Ende meistens mit dem Beginn des absteigenden Teils der Kammersuspensionskurve zusammenfällt, d. h. sie erreicht ihr Ende in dem Moment, wo die Herzkammer ganz erschlaft (Fig. 16). Die von Kahn¹⁾ veröffentlichten Kurven, bei welchem er mit einem Gad'schen Blutwellenschreiber die Druckverhältnisse in den Ventrikeln mit dem Elektrokardiogramm zugleich registrierte, zeigen, dass auch in den von ihm mitgeteilten Abbildungen das Ende von *T* mit dem Beginn des Abfallens der Ventrikeldruckkurve zusammenfällt. Dasselbe finde ich in den von Samojloff mitgeteilten Kurven, die mit dem Kapillarelektrometer geschrieben sind. Es scheint demnach *T* etwas anderes zu bedeuten wie die Gruppe *R*. Von nicht geringer Wichtigkeit scheint mir dabei die von Judin²⁾ mitgeteilte, mit dem Einthoven'schen Saitengalvanometer aufgenommene Kurve des *M. gastrocnemius* des Frosches zu sein, die ein dem typischen Elektrokardiogramm des Herzens ähnliches Aussehen zeigt. Auch hier fällt die ganze aufwärts gerichtete Zacke fast vollständig in das Latenzstadium hinein, während mit dem Beginn der Kontraktionskurve eine zweite gleichgerichtete langsam verlaufende Schwankung einsetzt, deren Ende in der Abbildung leider nicht wiedergegeben ist. Der ganze weitere Verlauf der Kurve bleibt etwas über der Abszisse.

In Fig. 10 sind zunächst unter *a* alternierende Kontraktionen, bei denen auf eine längere Kontraktion jedesmal eine kürzere folgt, dargestellt. Man sieht das Ende vom Elektrokardiogramm sich genau nach der Länge der Systolen richten; in *b* sind durch Kälteeinwirkung verlängerte Kontraktionen der Kammer aufgerechnet und in *c* Kontraktionen desselben Herzens (in situ) nach Einwirkung eines warmen Luftstroms. Den verkürzten Systolen entspricht ein verkürztes Elektrokardiogramm. Die nach abwärts gerichtete Zacke *T* fällt stets an das Ende der Kontraktion. Es hängt also die Entstehung

1) Kahn, Beiträge zur Kenntnis des Elektrokardiogramms. Pflüger's Arch. Bd. 126 S. 197.

2) Judin, Zur Erklärung der Form des Elektrokardiogramms. Zentrall. f. Physik 1908 S. 365.

der Zacke *T* sicher mit der Kontraktion des Herzmuskels zusammen.

Es zeigt sich nun in den von mir aufgenommenen Kurven, dass, wenn ein abgekühltes und wieder erwärmtes Froschherz verschieden lange Systolen zeigt, was sich aus der Länge der einzelnen Suspensionskurven erkennen lässt, auch die Zacke *T* in verschiedenen langen Abständen der Zacke *R* folgt. Je länger die Systole, um so später kommt *T*, während *R* ganz unbeeinflusst bleibt (Fig. 10 *a* und *b*). *T* ist beim Froschherzen sowohl bei Aufnahme der Kurve in situ als auch beim ausgeschnittenen Herzen meistens negativ. Dagegen fehlt *T* in den Kurven, in welchen sich an die Erregung keine Kontraktion anschliesst (Fig. 4 *b*).

Wenn man die Deutung der Zacken versuchen will an der Hand der über die Aktionsströme des Muskels bekannten Tatsachen, so ist man, da ausgiebige Untersuchungen der Aktionsströme der Muskeln mit dem Saitengalvanometer noch ausstehen, auf frühere mit unvollkommeneren Instrumenten angestellte Untersuchungen angewiesen. Leider sind dieselben nicht widerspruchsfrei. Vor allem ist das Verhältnis des Aktionsstroms zur Reizbewegung nicht sicher gestellt. In folgendem soll versucht werden, kurz einen Überblick über die hier interessierenden Untersuchungen zu geben.

Engelmann¹⁾ und Marchand²⁾ haben den zeitlichen Verlauf der elektromotorischen Schwankungen genauer festgestellt. Bei allen die Kammer treffenden Reizen tritt als erster Erfolg ein am Herzen vom Ort des Reizes weggerichteter Strom auf, es wird also bei einer Reizung jeder Teil des Kamtermuskels zunächst vorübergehend elektromotorisch wirksam. Diese Negativität breitet sich vom Ort der Reizung nach allen Richtungen durch die Kammer aus. Das elektromotorische Verhalten des Herzens entspricht in der Regel vollständig dem eines parallelfaserigen, quergestreiften, von zwei Längsschnittpunkten abgeleiteten Muskels und zwar werden die dem Reiz auch näher gelegenen Stellen zunächst negativ und dann positiv gegen die entfernteren. Dieses ist bei Ableitung von der äusseren Kammeroberfläche von zwei in der Ruhe unwirksamen Punkten, die ungleich weit vom Orte der Reizung entfernt sind, der Fall. Mitunter fehlt die zweite positive Phase an der Reizstelle, und es stellt

1) Engelmann, Pflüger's Arch. Bd. 61, 62, 66, 17.

2) Marchand, Pflüger's Arch. Bd. 16.

sich entweder der anfänglich indifferente Zustand direkt wieder her, oder es bleibt eine schwache Nachwirkung im Sinne der Negativität an der dem Reizorte näheren Stelle, die ja auch beim Beginn der Reizung negativ war. Engelmann fand, dass die elektrischen Schwankungen am Orte der Reizung ohne merkbare Latenzzeit beginnen, während die Kontraktion nicht früher als 0,1 Sekunden nach der Reizung beginnt. In 0,09 Sekunden erreicht die Negativität der gereizten Stelle ihren Höhepunkt, so dass also schon vor Beginn der Zuckung die Reizwelle ihren Höhepunkt überschritten hat. Dies sind wichtige Feststellungen, die sich durch meine Versuche bestätigen. Es geht daraus zur Genüge hervor, dass die Negativitätswelle, wenigstens in ihrem Anfang der Kontraktionswelle vorausseilt. Sanderson und Page¹⁾ berechneten die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizwelle auf 125 mm in der Sekunde, während Engelmann nur 20 bis 40 mm fand, sie fanden dabei eine Fortdauer der örtlichen Negativität bei 12 Grad Celsius von 2,1 Sekunden Zeitwert, welcher genau der Kontraktionsdauer des Herzmuskels entspricht.

Aus dem Gebiete der allgemeinen Elektrophysiologie hebe ich hier ferner folgende Untersuchungen hervor:

Bernstein²⁾ fand, dass in einer gereizten Muskelfaser die Reizwelle der Kontraktionswelle wenigstens teilweise voranläuft, was schon Helmholtz³⁾ durch seinen Versuch der indirekten Reizung des Nerv-Muskelpräparates nachweisen konnte. Nach v. Bezold⁴⁾ beginnt die elektrische Schwankung unter günstigen Verhältnissen unmittelbar nach dem Augenblick der Reizung und fällt daher in den Beginn des Latenzstadiums der Kontraktion.

Umgekehrt erlischt die elektrische Welle nicht früher als die Kontraktion aufhört. [Biedermann⁵⁾, Lee⁶⁾]. Dies beweist auch das elektromotorische Verhalten des Muskels bei der ideomuskulären Kontraktion. Dies ist eine bei lokal beschränkter Reizung in absterbenden Muskeln auftretende lokale Kontraktion der Fasern,

1) Sanderson und Page, Journal of Physiol. vol. 2.

2) Bernstein, Untersuchungen. I. Halle 1888.

3) Helmholtz, Ber. d. Berl. Akad. 1854.

4) Bezold, Ber. d. Berl. Akad. 1861.

5) Biedermann, Elektrophysiologie. Jena 1895. Elektrophysiologie in Ergebnisse der Physiologie 1902 u. 1903.

6) Lee, Arch. f. Anat. u. Phys., phys. Abt. 1887, S. 210.

die meist nicht mehr schwindet. Czermak¹⁾, Kühne²⁾ und Harless³⁾ zeigten, dass diese kontrahierte Stelle sich gegen alle übrigen Faserstellen negativ verhält. Auch Biedermann fand bei Dauerkontraktionen, welche einzelne Stellen des Frosch-Sartorius betrafen, negatives Verhalten dieser Stellen gegen nicht kontrahierte.

Was das Herz betrifft, so fand Dardus⁴⁾, dass die in einem Nerv-Muskelpräparat, dessen Nerv über die Kammer des schlagenden Kaninchenherzens gelegt war, entstehende sekundäre Zuckung zirka $\frac{1}{70}$ Sekunde früher auftrat als die Kontraktion des Herzens.

Alle diese Feststellungen sprechen für eine Trennung der elektrischen Kurve in zwei Abschnitte: Erregungswelle und Kontraktionswelle.

Über die Natur der Aktionsströme scheint insoweit Einigkeit der Anschauungen zu herrschen, dass man nach Hermann's⁵⁾ Vorgang jetzt annimmt, dass alle elektrischen Wirkungen lebender Gewebe auf chemische Veränderungen der Substanz zurückzuführen sind. Hering⁶⁾ erweiterte diese Anschauung dahin, dass er als Grund für die Stromlosigkeit unversehrter ruhender Muskeln annimmt, dass dieselben einen nach aussen ableitbaren Strom nicht entwickeln, so lange ihr Stoffwechsel, d. i. das innere chemische Bestehen, in allen Teilen derselben gleich ist. Jede Störung dieser Gleichheit bedingt das Entstehen ableitbarer Ströme. Aus dieser sogenannten Alterationstheorie müssen auch die Aktionsströme des Herzens erklärt werden. Biedermann nimmt an, dass, wenn als sicher gelten darf, dass die negative Schwankung, d. h. eigentlich das elektrische Geschehen an einer erregten Muskelstelle der Kontraktion grösstenteils vorausgeht und dieselbe sozusagen einleitet, die Vermutung nahe liegt, dass sie der elektrische Ausdruck desjenigen Prozesses ist, welcher die Quelle der Energie des Muskels darstellt. Bernstein nimmt ebenfalls an, dass die mechanischen Vorgänge in der Muskulatur die Kontraktionsprozesse, nur die Folge der vor-

1) Czermak, zit. nach Biedermann, Elektrophysiologie.

2) Kühne, zit. nach Biedermann, Elektrophysiologie. Untersuchungen aus dem physiol. Institut Heidelberg. III.

3) Harless, zit. nach Biedermann, Elektrophysiologie.

4) Dardus, zit. nach Biedermann, Elektrophysiologie.

5) Hermann, Pflüger's Arch. Bd. 4. u. 27.

6) Hering, Beiträge zur allg. Nerven- und Muskelphysiologie. Sttzungsber. d. Akademie. 1879 u. 1883.

ausgehenden chemischen Änderungen sein können. Der daraus vielleicht zu folgernde Umstand, dass die negative Schwankung sich mit der Arbeitsleistung des Muskels in gewissem Sinne ändert, ist bisher experimentell nicht sicher gestellt, zumal namentlich die Versuche von Amaya, Bernstein und Czermak dartun, dass die verstärkte mechanische Leistung mit einer Abnahme und auch Verkürzung der negativen Schwankung verknüpft sein kann. Diese Wirkung zeigt sich jedoch nicht in dem Teil, der vor der Kontraktion anhebt. Es bestehen demnach nur Beziehungen zwischen mechanischen Leistungen und dem abfallenden Teil der negativen Schwankung.

Aus der raschen Fortpflanzung der Negativität und weiter dem Beharren im negativen Zustande müssen bestimmte Schlüsse für das Elektrokardiogramm zu ziehen sein. Dass die Reizwelle der Kontraktionswelle vorausseilt, beweist, dass sie in ihrem ersten Teil nicht von der Kontraktion abhängig sein kann. Dass andererseits, solange die Kontraktion dauert, solange also tätige Materie vorhanden ist, sich Potentialdifferenzen, d. i. elektrische Erscheinungen, zeigen müssen, ist ebenfalls sicher, denn jedes kontrahierte Muskelstück verhält sich, solange die Kontraktion dauert, negativ gegenüber den noch oder schon wieder erschlafften. Aus dem Beharrungsvermögen in der Negativität durch die folgende Kontraktion folgt, dass die Reizwelle, die sich ja sehr schnell fortpflanzt, 125 mm in der Sekunde nach Sanderson und Page, ungefähr um das zehnfache an der Stelle der ersten Reizung von der Negativität überdauert wird. Die Froschkammer hat ja im erschlafften Zustande nur eine Länge von etwa 0,75—1 cm. Es genügt demnach eine Zeit von weniger als $\frac{1}{10}$ Sekunde, um die Erregungswelle von der Basis zur Spitze fortzuleiten. Es folgt aber die Kontraktion erst 0,4 Sekunden später. Danach kann die Reizwelle längst passiert sein, ehe die Kontraktionswelle anhebt. In der Zwischenzeit kann die Negativität der Basis auf kurze Zeit schwinden, da zwischen dem ersten chemischen Vorgang der Erregung und dem zweiten der Kontraktion eine genügend lange Pause liegt. Wenn während der ganzen elektrischen Systole die normal etwa 1,6 Sekunden beim Frosch beträgt, die Negativität der zuerst gereizten Stelle immer fortbestände, in zwischen aber alle anderen Stellen, die bereits in $\frac{1}{10}$ Sekunde in Erregung geraten sind, und da selbst, wenn wir einen zickzackmässigen Verlauf nach Nicolai annehmen wollten, doch immerhin

in etwa einem Drittel der Systolenzeit alle Teile erregt sein müssen, wäre nach der kurzen Zeit, die zwischen *R* und *S* liegt, eine Negativität der Spitze gegenüber der Basis nicht möglich, da diese doch noch erregt, also elektrisch wirksam geblieben sein müsste, und es könnte also kein diphasischer Strom entstehen. Deshalb muss, wenn die Spitze erregt wird, die Negativität, d. i. die Erregung der Basis, nachgelassen haben.

Wenn also die Kontraktion einsetzt, dann kommt rasch eine Zeit, in der sich das ganze Herz zwar peristaltisch zusammenzieht, eine Zeit, in der aber wenigstens kurze Zeit durch das bestehende isoelektrische Verhalten aller Teile das ganze Herz sich isoelektrisch verhält, d. h. keine Aktionsströme erzeugt. Erst wenn das Herz teilweise zu erschlaffen beginnt, werden die zuletzt aus der Kontraktion erschlaffenden, also noch tätigen Partien gegenüber den schon erschlafften nicht mehr tätigen wieder zinkartig reagieren, und so kann wieder eine ablenkbare Potentialdifferenz entstehen, falls diese Teile näher der Basis oder näher der Spitze gelegen sind. Diese Anschauung findet sich schon bei Bayliss und Starling¹⁾. Nach den Untersuchungen von Hering wissen wir, dass die Papillarmuskeln und damit die Spitze des Herzens sich zuerst kontrahiert, und dass die Kontraktion an der Basis zuletzt erschlafft. Dadurch ist es ermöglicht, dass auch zum Schluss des Kardiogramms des einzelnen Herzschlages sich wieder eine nach oben ausschlagende Welle finden kann. Diese Welle der durch langsame Erschlaffung der Muskeln allmählich entstehenden und vergehenden Potentialdifferenzen kann nun auch den langsamen Verlauf der Zacke *T* erklären. Hieraus geht also hervor, dass wir es mit zweierlei Dingen bei dem Elektrokardiogramm zu tun haben müssen: mit einer Reizwelle und mit einer Kontraktionswelle; die Reizwelle ist von der Kontraktion unabhängig. Die Kontraktionswelle setzt nach Ablauf der ersteren ein, nur ein Teil der letzteren tritt als eigentliche Welle bei *T* auf, da vorher alle Teile des Herzens eine kurze Zeit keine merkbaren Potentialdifferenzen zeigen. Erst wenn die Kontraktion [partiell] nachlässt, also bei Beendigung der Kontraktion, können wieder Potentialdifferenzen auftreten, die, da die Basisgegend zuletzt erschlafft, eine nach aufwärts gerichtete Zacke *T* erzeugen als Ausdruck

1) Bayliss und Starling, Intern. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. 9 S. 7.

dafür, dass zum Schluss die Basis wieder gegenüber der Spitze negatives Potential zeigt. Diese Erklärung würde auch am besten das mitunter beobachtete Negativwerden der Welle *T* erklären. Wie Salzmann¹⁾ fand, ist mitunter der Ablauf der Kontraktion anders als von der Spitze zur Basis. Dies ist vielleicht auch in Fällen eines negativen *T* der Fall.

Eine Analogie zu dem von mir angenommenen Verhalten, dass eine Erregungswelle der Kontraktion auf eine bestimmte Zeit vorausgeht, dass also die Erregung nicht identisch mit der Kontraktion ist, bietet die von Burdon-Sanderson²⁾ 1882 mitgeteilte Untersuchung über elektrische Erscheinungen am *Dionaea*-blatt. Er fand, dass bei dieser Pflanze gleich wie an den reizbaren Organen der Tiere jede Schliessbewegung der Blätter, welche durch mechanische oder auch elektrische Reizung hervorgerufen wird, von einer elektrischen Veränderung begleitet ist, und zwar fängt dieser Aktionsstrom frühestens 0,03 Sekunden nach der Reizung an, pflanzt sich mit der Geschwindigkeit von 200 mm in der Sekunde fort, während die mechanische Bewegung erst nach 1—1,5 Sekunden latenter Reizzeit beginnt und viel langsamer fortschreitet. Hier haben wir zwischen Aktionsstrom und mechanischer Bewegung (Kontraktion) also eine enorme Pause, wir sehen hier die Erregungswelle ganz isoliert von der Kontraktion verlaufen. Burdon-Sanderson setzt diese Erscheinungen direkt in Parallele zu den elektrischen Erscheinungen in gereizten tierischen Geweben, wenngleich die physikalischen Vorgänge bei der Bewegung andere sind.

Die von mir versuchte Erklärung des Elektrokardiogramms als einer Kurve der Erregbarkeit des Herzens plus dem Ende einer Kontraktionskurve erklärt also die bisher von früheren Beobachtern nicht recht unterzubringende Zacke *T*, die nicht nur in ihrem zeitlichen Verhalten zu den ersten Zacken, sondern auch in ihrer Form und ihrem verspäteten Auftreten durch alle bisher gegebenen Erklärungsversuche nicht einwandfrei untergebracht werden konnten. Für die klinische Bedeutung des Elektrokardiogramms halte ich die Auffassung desselben, wie sie hier gegeben, für aussichtsreicher als die bisherigen Erklärungen. Schon liegt eine Menge klinischen und

1) Salzmann, l. c.

2) Burdon-Sanderson, Die elektrischen Erscheinungen am *Dionaea*-blatt. Biolog. Zentralbl. Bd. 2. 1882, und Bd. 9. 1889.

experimentellen Materials vor, welche nicht recht in Ubereinstimmung gebracht werden konnte. Auch für Abweichungen des Verlaufes der Gruppe *R* trifft die szu. So beobachtete Hering¹⁾, dass bei Vagusstillstand auftretende Kammerelektrokardiogramme den Elektrokardiogrammen von Extrasystolen gleichen; Kahn²⁾ fand bei der Arbeit des linken Ventrikels unter isometrischen Bedingungen atypische Elektrokardiogramme, die dem von Kraus und Nicolai³⁾ angegebenen Schema für den linken Ventrikel entsprechen, während sie zeitlich als elektrischer Ausdruck des sich zu dieser Zeit dissoziiert schlagenden rechten Ventrikels aufzufassen sind. Es handelt sich aber dabei wohl nur um einen abnormen Gang der Erregungswelle. Auch fand er bei Vagusreizung ein Negativwerden von *T*, was durch Änderung des Kontraktionsablaufes resp. der Richtung der Erschlaffung des Herzmuskels zu erklären ist. Vor allen Dingen werden auch verständlich die bei Extrasystolen auftretenden atypischen Elektrokardiogramme, wie ich sie bei Dissoziation von Kammer und Vorhof klinisch und experimentell gesehen habe. Veränderungen des instanten Teils werden uns verständlich und erklärlich, wenn wir darin Veränderungen des Erregungsablaufes sehen. Es ist uns auch verständlich, dass die Erregbarkeit trotz erlahmender Kontraktilität gesteigert sein kann.

Sucht man sich nach diesen Ausführungen ein Bild davon zu machen, was im typischen Elektrokardiogramm des Herzens verzeichnet wird, und in welcher Weise die Form desselben zustande kommt, so wäre die Zacke *P* als Ausdruck der Erregung der Vorhöfe aufzufassen. Die folgende gerade Strecke wird von der Zeit ausgefüllt, in der die muskelschwachen Vorhöfe sich kontrahieren, und die die Erregung braucht, um durch die His'sche Muskelbrücke zu den Kammern zu gelangen. Diese Leitung erfolgt ja sehr langsam. Aber nicht zur Basis der Kammern geht die Leitung durch das His-Tawarasche Fasersystem, sondern direkt zum Ansatz der Papillarmuskeln. Über elektromotorische Vorgänge bei der Erregung glatter Muskelfasern ist nichts bekannt [Grützner⁴⁾]. Makenzie und Kühn

1) Hering, Experimentelle Studien an Säugetieren über das Elektrokardiogramm. Pflüger's Arch. Bd. 127 S. 155.

2) Kahn, l. c.

3) Kraus und Nicolai, Über die funktionelle, Solidarität beider Herzhälften. Deutsche med. Wochenschr. 1908 Nr. 1.

4) Grützner.

vermissten elektrische Erscheinungen an den bewegten Muskelmassen des Darms und der Uretra. Langsam bewegliche Muskeln sind nicht zur sekundären Erregung von Froschnerven geeignet (Biedermann). Es ist deshalb verständlich, dass in den Elementen des Vorhof-Kammerleitungssystem während des Durchganges der Erregung wirksame und messbare Potentialdifferenzen nicht auftreten.

Der instante Teil des Kammerelektrokardiogramms, die Gruppe *R*, setzt sich, wie man auch beim Menschen in vielen Fällen beobachten kann, aus drei Zacken, *Q*, *R*, *S*, zusammen; von diesen ist *Q* klein und nach abwärts gerichtet, *R* nach oben und *S* wieder nach abwärts. Man kann wohl mit Recht annehmen, dass die Erregungswelle in ihrer Verlaufsrichtung der ihr nachfolgenden Kontraktionswelle entspricht. Nach Hering¹⁾ und Salzmann²⁾ tritt die erste Kontraktion der Kammer in den Papillarmuskeln, und zwar an der Basis derselben auf. Es muss deshalb auch die erste Erregung die Basis der Papillarmuskeln treffen, von hier schreitet die Erregung nach dem Ende derselben also aufwärts fort. Es sind also zunächst der Spitze näher liegende Teile in Erregung, und damit gegenüber der Basis elektronegativ. Diesem Verhalten würde die initiale Zacke *Q* entsprechen, die meist klein ausfällt entsprechend dem kurzen Verlauf der Papillarmuskeln. Die Erregung schreitet dann rasch zur Basis fort, und zwar zu einer Zeit, in der die Kontraktion noch nicht eingesetzt hat. Dadurch entsteht die ausgesprochene Negativität an der Herzbasis, welche in der Zacke *R* sich kundgibt! Dann verbreitet sich die Erregungswelle von der Basis wieder zur Spitze, dieses würde der Welle *S* entsprechen. In diesem Moment setzt die Kontraktion ein, und die gesamten Herzkammernuskeln sind dadurch nach und nach in einen eine Zeitlang andauernden gleichmässigen elektrischen Zustand versetzt, bis dann, wie oben geschildert, in der Erschlaffungszeit die Zacke *T* entsteht. Ich bin mir wohl bewusst, dass eine so detaillierte Erklärung für den instanten Teil der Kammerelektrokardiogramme noch weiterer Untersuchungen und genaueren Studiums bedarf, und ich bin weit davon entfernt, diese Erklärung als eine abschliessende hinzustellen. Vor allem wird man dabei mit sich gegenseitig addierenden oder auch sich entgegengesetzt verhaltenden gleichseitigen Erregungen verschiedener muskulärer Teile des Herzen rechnen müssen. Es soll

1) l. c. 2) l. c.

hier nur der Versuch gemacht werden, den eigentümlichen Verlauf der Zacke *R*, die, wie oben nach gewiesen ist, der Kontraktion vorangeht, zu erklären oder doch darzulegen, dass nach Anordnung des Herzmuskels ein solcher Erregungsverlauf möglich ist. Bei allem muss man sich vor Augen halten, dass bei dem komplizierten Bau des Herzmuskels und Herznervensystems sich Erregungsvorgänge nach verschiedenen Stellen zugleich ausbreiten müssen, dass je nach Richtung der Fasern Subtraktionen und Summationen der elektrischen Ausschläge erfolgen müssen, und dass diese möglich sind, zeigen ja die von mehreren Menschen zu gleicher Zeit aufgenommenen Elektrokardiogramme. Je nachdem hier die Systole der Herzen von zwei Personen, die sich die rechte und linke Hand gegeben haben und mit der rechten und linken Hand in die Ableitungsfässer eintauchen, zusammenfallen oder nacheinander erfolgen, entstehen grössere oder kleinere Ausschläge. Daraus folgt, dass Summation und Subtraktion sich im Elektrokardiogramm ausdrücken müssen. Diese werden auch ganz wesentlich durch die Lage des Herzens im Körper beeinflusst. Es wird durch die üblichen Ableitungsstellen an den Extremitäten eine Summe von Potentialdifferenzen, welche den verschiedenen Teilen des Herzens entstammen, abgeleitet, und durch Drehung und Verlagerung des letzteren muss die Summe aus verschiedenen Teilen bestehen. Dass trotzdem die Form des Elektrokardiogramms so konstant ist, ermöglicht es vielleicht, gröbere Abweichungen der Form auf pathologische Verhältnisse zurückzuführen, während feinere Abweichungen durch unberechenbare Umstände schon hervorgerufen werden.

Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Kürzere und längere Systolen mit verschieden hohem *T* in derselben Kurve. Die kürzeren Systolen haben eine höhere Zacke *T* als die längeren.
- Fig. 2. Elektrokardiogramm und Suspensionskurve des Ventrikels einer Temporaria gleichzeitig übereinander geschrieben. Die Latenzzeit beträgt zwischen Beginn des Elektrokardiogramms und Beginn der Ventrikelsuckung 0,18 Sek.
- Fig. 3. Elektrokardiogramm und Spitzenstoss gleichzeitig mittelst zweier Galvanometer aufgezeichnet. Zeit 0,04 Sek. Der Spitzenstoss wurde mit dem Edelmann'schen Telephon aufgenommen und die Schwingungen wurden auf ein kleines Saitengalvanometer übertragen. Die Latenzzeit beträgt 0,08 Sek.

- Fig. 4. Muskarin-Atropinversuch. *Rana esculenta* schwach curarisiert. Elektrokardiogramm abgeleitet von Sinus und Herzspitze mit Neusilber Serres-fines. Kammerspitze suspendiert. *a*) Beginn der Wirkung von 0,25 mg Muskarin in den Lymphsack gebracht. *b*) Vollständiger Kammerstillstand. Es ist weder am Vorhof noch an der Kammer irgendeine Bewegung zu bemerken. Trotzdem entstehen spontan Kammer- und Vorkammer-Elektrokardiogramme. Die Zacke *T* fehlt dem Kammerelektrokardiogramm. Bei *c*) erste Wirkung von 0,0002 Atropin. Die Zacke *R* wird trotz zunehmender Grösse und Kraft der Systolen nicht grösser, sondern kleiner wie beim absoluten Kammerstillstand. Die Gruppe *T* erscheint wieder. Die Latenzzeit, welche bei der Muskarinwirkung 0,2 Sek. betrug, wird erheblich verlängert auf 0,28 Sek. *d*) *e*) Weitere Atropinwirkung: Suspensionskurve wird höher. *R* kleiner.
- Fig. 5. Gastrogene Extrasystolenirregularität beim Menschen. *R* 1 und *R* 3 sind in der Höhe gleich. *R* 2 ist, trotzdem Systole 2 kleiner ist wie *S* 1 und *S* 3, grösser als das zu 1 und 2 gehörige *R*. Obwohl *S* 3 grösser ist als *S* 1 und 2, ist doch *R* 2 nicht grösser. Die Latenzzeit der Extrasystole auf Carotispuls bezogen ist grösser.
- Fig. 6. Elektrokardiogramm der Bowditch'schen Treppe. *R. temporaria*.
- Fig. 7. Ableitung *a* von Sinus und Spitze *b* von Kammerbasis und Spitze. Bei *b* fehlt *P*.
- Fig. 8. *Rana esculenta*. Herz ausgeschnitten am Sinus auf Korkplatte im Trichter befestigt. Spitze suspendiert. Der Trichter wird mit destilliertem Wasser gefüllt. Beginn des Versuches 11 Uhr vorm. *a*) 11 Uhr 15 Min. *b*) 11 Uhr 25 Min. *c*) 11 Uhr 35 Min. Stillstand von Kammer und Vorhof. *d*) Dito mit grösserer Empfindlichkeit des Galvanometers gezeichnet. 11 Uhr 40 Min.
- Fig. 9. Extrasystolen des Stannius'schen Versuchs. *Rana temporaria*. Ligatur zwischen Atrium und Kammer. Elektrokardiogramme der mit einem spitzen Glasstab gereizten Kammern *a* an der Spitze *b* an der Basis.
- Fig 10. *a*) Ausgeschnittenes Herz von *Rana esculenta*. Durch Liegen auf Eis abgekühlt. In der Länge der Systolen alternierender Rhythmus. Zu jeder Systole gehört ein in der Länge gleichsinnig alternierendes Elektrokardiogramm. Zeit (unten) 0,2 Sek.
- Fig 10 *b*) Einwirkung der Kälte auf ein Herz von *Rana esculenta* in Situ. Elektrokardiogramm von der Kammer. Der Vorhof wurde durch Anlegen eines Schiebers immobilisiert. *a*) Einwirkung von Kälte. Das Kammerelektrokardiogramm abgeleitet von Kammerbasis und Herzspitze hat eine Dauer von 1,9 Sek. Die mechanische Systole dauert 1,7 Sek. *b*) Nach Einwirkung eines erwärmten Luftstroms auf das Herz. Die Dauer des Elektrokardiogramms der Systole ist 1,26 Sek., die der mechanischen Systole 1,8 Sek. Die Höhe von *R* ist bei *a*: 6 mm, bei *b*: 9,2 mm. Die Höhe der mechanischen Systole ist umgekehrt 26 bzw. 32 mm. Zeit 0,04 Sek.

Fig. 1.

0,18 Sec.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4a.

Fig. 4b.

Fig. 4c.

Fig. 4d.

Fig. 4e.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 8a.

Fig. 8b.

Fig. 8c.

Fig. 8d.

Fig. 9.

Fig. 10a.

Fig. 10b.