Die Base wird von Phosphormolybdänsäure mit grüngelber Farbe gefällt. Mercuronitratlösung wird von der schwefelsauren Lösung der Base nicht reduziert; Mercurichlorid wird erst nach längerem Kochen unter Ausscheidung eines halbfesten Doppelsalzes reduziert. Durch Übersättigung der Lösung mit Natronlauge und Ausschütteln mit Äther bekam man nur amorphe Produkte, welche keine krystallisierbaren Derivate lieferten. Silbernitratlösung wird durch die alkoholische Lösung der Base unter Abscheidung eines Silberspiegels reduziert. Die Base ist rechtsdrehend.

Platinsalz. Wird die Base, in verdünnter Salzsäure gelöst, mit überschüssiger wäßriger Platinchloridlösung versetzt, so scheiden sich zunächst Flocken aus, die beim Erwärmen krystallinisch werden. Das abfiltrierte Chloroplatinat wurde mit Alkohol und Äther gewaschen und bis zum konstanten Gewicht getrocknet.

0,822 g gaben 0,092 Pt.

Ber. für $C_{19}H_{24}N_2$, H_2PtCl_6		Gef.
Pt	28,31	28,58

Zur Kenntnis der Diäthylcarbobbenzonsäure;

von *Richard Anschütz* und *Oskar Motschmann*.

[Zweite Abhandlung.]

[Mitteilung aus dem chemischen Institut der Universität Bonn.]

(Eingelaufen am 7. Oktober 1914.)

Vor 23 Jahren veröffentlichte ich in Gemeinschaft mit meinem damaligen Schüler Wilhelm Berns ¹⁾ eine Abhandlung über die Diäthylcarbobbenzonsäure, ein Kondensationsprodukt von Desoxybenzoin mit alkoholischer Kali-

¹⁾ Diese Annalen 261, 298 (1891).

lauge. Wir bewiesen, daß die von Zagoumenny¹⁾ durch Schmelzen der Diäthylcarbobbenzonsäure mit Kalihydrat erhaltene, von ihm als Diäthylbenzoesäure bezeichnete Säure jedenfalls eine der zwölf denkbaren isomeren Phenylvaleriansäuren ist. Denn sie gab bei der Oxydation Benzoesäure. Wir zeigten ferner, daß diese Phenylvaleriansäure sicher verschieden ist von den beiden von Adolf Baeyer und O.R.Jackson²⁾ beschriebenen Phenylvaleriansäuren: der bei 58—59° schmelzenden δ -Phenylvaleriansäure und der flüssigen α -Äthyl- β -phenylpropionsäure oder Benzyläthyleessigsäure. Die Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbobbenzonsäure ist bei gewöhnlicher Temperatur ebenfalls flüssig wie die Benzyläthyleessigsäure, die wir aus Benzyläthylacetessigester darstellten. Allein die letztere gibt ein bei 88—89° schmelzendes Anilid, das völlig verschieden ist von dem bei 101—102° schmelzenden Anilid der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbobbenzonsäure. Beide Anilide untersuchte damals auf Veranlassung meines Freundes C. Hintze in Breslau dessen Schüler Stanislaus Jander krystallographisch.

Im Laufe der Jahre sind außer der Phenylvaleriansäure acht von den zwölf der Theorie nach denkbaren Isomeren bekannt geworden. Damals war ich aus theoretischen Gründen geneigt, in der aus Diäthylcarbobbenzonsäure erhaltenen Phenylvaleriansäure die β -Benzyl- β -methylpropionsäure zu sehen. Neuerdings habe ich das alte Thema im Verein mit Herrn Dr. Oskar Motschmann wieder aufgegriffen. Es ist uns gelungen, die β -Benzyl- β -methylpropionsäure synthetisch darzustellen und ihre Identität mit der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbobbenzonsäure einwandfrei zu beweisen. Dadurch ist ein neuer Gesichtspunkt gewonnen für die Auffassung der Konstitution der Diäthylcarbobbenzonsäure selbst und für die Erklärung des Kondensationsaktes, durch den sie entsteht.

¹⁾ Diese Annalen 184, 163 (1876).

²⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 13, 118 (1880).

Um die β -Benzyl- β -methyl-propionsäure zu bereiten, war nur die von Rudolf Fittig und Louis Liebmann¹⁾ durch Destillation der β -Methylphenylparaconsäure gewonnene β -Methyl- γ -phenylisocrotonsäure zu reduzieren:

Wir zogen es jedoch vor, einen anderen Weg zur Gewinnung der β -Methyl- γ -phenylisocrotonsäure einzuschlagen. Wir gingen vom Phenylacetone oder Benzylmethylketon aus, das wir zunächst mit Jodessigester und Magnesium behandelten. Durch Zersetzung der Magnesiumverbindung mit Salzsäure erhält man den β -Benzyl- β -methyl- β -oxypropionsäureester oder γ -Phenyl- β -methyl- β -oxybuttersäureester, der sich leicht in γ -Phenyl- β -methylisocrotonsäureester umwandeln läßt. Durch Anlagerung von Jodwasserstoff an die γ -Phenyl- β -methylisocrotonsäure entsteht eine jodsubstituierte Buttersäure, die durch Reduktion in die β -Benzyl- β -methylpropionsäure oder γ -Phenyl- β -methyl-n-buttersäure übergeht.

β -Benzyl- β -methyl- β -oxypropionsäure- oder γ -Phenyl- β -methyl- β -oxybuttersäure-äthylester,

Kp₁₅ 162°, wird in folgender Weise dargestellt. Man löst Phenylacetone (35 g) und Jodessigester (56 g) in Benzol (150 ccm) und versetzt die Lösung allmählich mit Magnesiumspänen (7 g). Die Reaktion tritt unter lebhaftem Sieden des Benzols ein und wird durch halbstündiges Erwärmen auf dem Wasserbade beendet. Man versetzt die dunkelbraune Lösung mit Eis und zerlegt die Magnesiumverbindung durch Salzsäure. Die mit Natriumthiosulfat, Natriumbicarbonat und Wasser durchgeschüttelte

¹⁾ Diese Annalen 255, 270 (1889).

Benzollösung hinterläßt nach dem Abdestillieren des Benzols den Oxysäureester als braungefärbtes Öl. Durch Destillation unter stark vermindertem Druck wird der Ester rein erhalten (32 g).

0,1403 g gaben 0,3581 CO₂ und 0,1014 H₂O.

	Ber. für C ₁₈ H ₁₈ O ₃	Gef.
C	70,27	69,75
H	8,17	8,09

γ-Phenyl-β-methyl-isocrotonsäureäthylester,

Kp.₁₂ 146—147°, entsteht, wenn man zunächst den *γ*-Phenyl-β-methyl-β-oxybuttersäureäthylester (50 g) mit Phosphorpentachlorid (46 g) mischt, wobei unter Salzsäureentwicklung die Reaktion sofort eintritt. Zur Beendigung der Bildung von *γ*-Phenyl-β-methyl-β-chlorbuttersäureäthylester erwärmt man die Reaktionsmasse im Paraffinbad auf 110—130°. Nach dem Abdestillieren des Phosphoroxychlorids unter vermindertem Druck steigt der Siedepunkt, Salzsäure spaltet sich ab und der *γ*-Phenyl-β-methyl-β-isocrotonsäureester (36 g) geht über.

0,2662 g gaben 0,7448 CO₂ und 0,1850 H₂O.

	Ber. für C ₁₈ H ₁₈ O ₂	Gef.
C	76,47	76,31
H	7,84	7,77

Durch Einwirkung von Natriumamalgam in sauer gehaltener alkoholischer Lösung wird der Äther nicht reduziert. Kocht man ihn mit einem Überschuß von Natronlauge, so geht er in das Natriumsalz der *γ*-Phenyl-β-methylisocrotonsäure über. Auf Zusatz von Salzsäure scheidet sich die Säure als Öl ab, das beim Abkühlen erstarrt. Aus verdünntem Alkohol krystallisiert sie, wie das R. Fittig und Louis Liebmann beschreiben, in flachen Täfelchen, die bei 111—112° schmelzen.

0,1891 g gaben 0,5210 CO₂ und 0,1200 H₂O.

	Ber. für C ₁₁ H ₁₂ O ₂	Gef.
C	75,00	75,14
H	6,82	7,10

Ebensowenig wie der Äthylester ließ sich die Säure selbst in wäßrig-alkoholischer Lösung mit Natriumamalgam reduzieren. R. Fittig und L. Liebmann hatten bereits gezeigt, daß sich Bromwasserstoff an die γ -Phenyl- β -methylisocrotonsäure anlagert, und man konnte erwarten, daß sich das Brom dann leicht mittels Natriumamalgam durch Wasserstoff würde ersetzen lassen. Wir zogen es vor, das Jodwasserstoffadditionsprodukt zu reduzieren zu

Kp.₁₃ 172°. Man schüttelt die γ -Phenyl- β -methylisocrotonsäure (20 g) mit einem Überschuß von konzentrierter wäßriger Jodwasserstoffsäure. Die Anlagerung von Jodwasserstoff erfolgt leicht und glatt. Man verdünnt mit Wasser und nimmt die γ -Phenyl- β -methyljodbuttersäure mit Äther auf, trennt von der verdünnten Jodwasserstoffsäure und verdunstet den Äther bei gewöhnlicher Temperatur. Ohne weitere Reinigung reduzierten wir die jodierte Säure in alkoholisch-essigsaurer Lösung mit einem Überschuß von 3prozentigem Natriumamalgam (250 g). Nach Beendigung der Reduktion neutralisiert man, verdampft den Alkohol und zerlegt das zurückbleibende Natriumsalz mit verdünnter Schwefelsäure. Die Säure nimmt man mit Äther auf, schüttelt die ätherische Lösung mit Wasser, trocknet sie, destilliert den Äther ab und dann den Rückstand unter stark vermindertem Druck. Die reine Säure (17 g) bildet ein farbloses dickes Öl, das auch beim Abkühlen in einer Kältemischung aus Eis und Kochsalz nicht erstarren wollte.

0,1104 g gaben 0,3013 CO₂ und 0,0782 H₂O.

	Ber. für C ₁₁ H ₁₄ O ₂	Gef.
C	74,16	74,43
H	7,87	7,92

Silbersalz, C₁₁H₁₃O₂Ag, wird in glänzenden Blättchen erhalten, wenn man die mit Natronlauge neutralisierte

alkoholische Lösung der Säure mit Silbernitratlösung fällt.

0,3332 g gaben 0,1256 Ag.

	Ber. für $C_{11}H_{13}O_2Ag$	Gef.
Ag	37,89	37,69

γ -Phenyl- β -methylbuttersäurechlorid, $C_{11}H_{13}OCl$, Kp.₁₄ 133—135°, wird in ziemlich guter Ausbeute — aus 12 g Säure 10 g Chlorid — erhalten durch Behandeln der Säure mit einem Überschuß von Thionylchlorid. Die freiwillig eintretende Reaktion führt man durch Erhitzen unter Rückflußkühlung zu Ende und reinigt das Chlorid durch einmalige Destillation unter vermindertem Druck.

0,1305 g gaben 0,0945 AgCl.

	Ber. für $C_{11}H_{13}OCl$	Gef.
Cl	18,07	17,93

γ -Phenyl- β -methylbuttersäureanilid,

Schmelzp. 101°, entsteht beim allmählichen Versetzen einer Lösung des Chlorids in trockenem Äther mit etwas mehr als der diäquimolekularen Menge Anilin. Man filtriert vom Anilinchlorhydrat ab und behandelt den Rückstand mit verdünnter Salzsäure. Aus Alkohol rasch krystallisiert, bildet das Anilid weiße, lange Nadeln, langsam krystallisiert meßbare, prismatische Krystalle.

I. 0,2517 g gaben 0,7479 CO₂ und 0,1669 H₂O.

II. 0,1653 g „ 9,6 ccm Stickgas bei 17° u. 760 mm Druck.

	Ber. für	Gef.	
	$C_{11}H_{13}NO$	I	II
C	80,63	81,04	—
H	7,51	7,42	—
N	6,33	—	6,71

Dieses Anilid ist, wie sich krystallographisch beweisen läßt, identisch mit dem früher von Anschütz und Berns beschriebenen Anilid der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbobbenzonsäure. Die beiden Anilide haben denselben Schmelzpunkt, der durch Mischen der Anilide nicht verändert wird.

Seinerzeit hatte, wie bereits eingangs erwähnt, C. Hintze in Breslau seinen inzwischen verstorbenen Schüler Stanislaus Jander veranlaßt, das von Anschütz und Berns dargestellte Anilid der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbобензonsäure zu messen. Die Hintze neuerdings von mir eingeschickten Krystalle des synthetischen γ -Phenyl- β -methylbuttersäureanilids ließ er durch seinen Schüler Siegfried Riedel krystallographisch prüfen. Wie ich nicht anders erwartete, war es identisch mit dem von Jander gemessenen Anilid. Allein es schien gewisser Unstimmigkeiten halber wünschenswert, besser ausgebildete Krystalle des von Jander untersuchten Anilids der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbобензonsäure darzustellen. Dieser Arbeit unterzog sich Hr. Motschmann, so daß Herr Riedel imstande war, das Anilid der Phenylvaleriansäure auch unmittelbar mit dem Anilid der γ -Phenyl- β -methylbuttersäure krystallographisch zu vergleichen. Herr Riedel stellte zunächst seine an dem synthetischen Phenylvaleriansäureanilid oder γ -Phenyl- β -methylbuttersäureanilid angestellten Beobachtungen in nachfolgender Art zum bequemen Vergleich den Janderschen gegenüber.

Krystallsystem: rhombisch.

Achsenverhältnis:

Riedel: $a:b:c = 0,69890:1:0,66168$,

Jander: $a:b:c = 0,68451:1:0,60844$.

Beobachtete Formen:

Riedel: $c\{001\}$, $m\{110\}$, $b\{010\}$, $o\{212\}$, $a\{100\}$,

Jander: $c\{001\}$, $m\{110\}$, $b\{010\}$, $o\{323\}$, $n\{130\}$.

Winkeltabelle:

	Riedel		Jander
	berechnet	gemessen	angegeben
$o:c = (212):(001)$	—	$45^{\circ} 5'$	$44^{\circ} 20'$
$m:m = (110):(\bar{1}\bar{1}0)$	—	$69^{\circ} 54'$	$68^{\circ} 47'$
$m:o = (110):(212)$	$47^{\circ} 1'$	$46^{\circ} 48'$	$46^{\circ} 29'$
$o:b = (212):(010)$	$76^{\circ} 29'$	$76^{\circ} 34'$	—
$o:a = (212):(100)$	$48^{\circ} 3'$	—	—

„Zu vorstehender Tabelle ist folgendes zu bemerken: Kaum ist die Identität der von Jander und von mir gemessenen Krystalle

zu bezweifeln, nur scheinen die Janderschen Krystalle weniger gut ausgebildet gewesen zu sein. Jander hat offenbar die Winkel $oc = 44^\circ 20'$ und Winkel $mm = 68^\circ 47'$ als Fundamentalwinkel genommen, aus denen genau das von ihm angegebene Achsenverhältnis folgt und $mo = 46^\circ 22'$ und weiter Winkel $ob' = 73^\circ 8'$ für $(323):(010)$, also sehr abweichend von den von mir gemessenen und berechneten Werten $ob = (212)(010)$. Da ersichtlich für $o = (212)$ die berechneten Werte om und ob befriedigend mit den gemessenen übereinstimmen, so ist das Symbol (212) dem Janderschen (323) vorzuziehen. Offenbar hat Jander den Winkel ob an seinen Krystallen nicht messen können, sonst wäre ihm sicher die starke, aus der Annahme $o = (323)$ folgende Abweichung aufgefallen.

Die mir vorliegenden farblosen, durchsichtigen, glasglänzenden Krystalle sind tafelförmig nach der Längsfläche $b\{010\}$ und nach der Vertikalachse c gestreckt. Neben $b\{010\}$ herrscht das Prisma $m\{110\}$ vor, sodann treten die Basis $c\{001\}$ und die Pyramide $o\{212\}$ als kleine Endflächen auf, wobei $c\{001\}$ vorherrscht, während von der Pyramide $o\{212\}$ meist nur wenige Flächen klein ausgebildet sind, die aber gute Reflexe geben. Die Querfläche $a\{100\}$ wurde nur äußerst selten beobachtet. Ein zweites Vertikalprisma, das Jander mit $n\{180\}$ bezeichnet hat, konnte ich nirgends nachweisen.

Die zur Basis genommene Fläche $c\{001\}$ ist ausgezeichnet als Ebene einer deutlichen Spaltbarkeit, sowie als Ebene der optischen Achsen. Die b -Achse ist die erste Mittellinie und Achse der kleinsten Elastizität; der optische Charakter ist daher positiv. Der scheinbare optische Achsenwinkel, in Cedernholzöl gemessen, beträgt für Na-Licht

$$2H_0 = 96^\circ 10',$$

während Jander $92^\circ 21'$ für ein offenbar anderes, nicht näher bestimmtes Öl angibt. In Luft treten die Achsen nicht mehr aus. In optischer Hinsicht stimmen meine Beobachtungen mit den Janderschen überein, wodurch die Identität der mir übersandten Krystalle mit den früheren, von Jander beobachteten, erwiesen ist.

Nachdem die Untersuchung soweit abgeschlossen war, erhielt ich die von Herrn Dr. Motschmann neu dargestellten Krystalle des von Jander gemessenen Anilids der Phenylvaleriansäure aus Diäthylcarbobbenzonsäure. Diese gut ausgebildeten Krystalle lieferten den Beweis, daß die früher von Jander gemessenen tatsächlich viel weniger gut gewesen sein müssen. Denn die jetzt neu dargestellten Krystalle stimmen auch in den Winkeln sehr genau mit den synthetisch dargestellten überein, wie folgende nur auf meinen eigenen Messungen beruhende Tabelle zeigt:

	synth. Anilid		Anilid, aus Diäthylcarbo- benzonsäure erhalten.
	berechnet	gemessen	gemessen
$o : c = (212) : (001)$	—	* 45° 5'	45° 3'
$m : m = (110) : (1\bar{1}0)$	—	* 69° 54'	69° 56'
$m : o = (110) : (212)$	47° 1'	46° 48'	46° 57'
$o : b = (212) : (010)$	76° 29'	76° 34'	76° 33'
$o : a = (212) : (100)$	48° 3'	—	48° 2'

Hierdurch ist also die Identität beider Substanzen einwand-
wandfrei erwiesen.“

Vor Ermittlung der Konstitution der bei der Spaltung der Diäthylcarbобензonsäure mit Kalihydrat entstehenden Phenylvaleriansäure als γ -Phenyl- β -methylbuttersäure oder γ -Phenylisovaleriansäure fehlte es für die Ableitung einer Konstitutionsformel der Diäthylcarbобензonsäure an jeder Grundlage. Nachdem nunmehr durch Synthese die Konstitution des Spaltungsproduktes festgestellt ist, kann man mit allem Vorbehalt, den eine so gewaltsame Reaktion wie die Kalischmelze beansprucht, den Versuch einer Erklärung der Entstehung der Diäthylcarbобензonsäure und damit ihrer Konstitution wagen.

Die Bildung der Diäthylcarbобензonsäure aus Desoxybenzoin und alkoholischem Kali erfolgt unter Oxidation von Äthylalkohol zu Acetaldehyd, wobei ein entsprechender Teil des Desoxybenzoins zu Toluylenhydrat reduziert wird. Desoxybenzoin und Acetaldehyd kondensieren sich dann zu der Diäthylcarbобензonsäure.

Man kann ferner annehmen, daß sich zunächst zwei Moleküle Acetaldehyd miteinander zu Aldol unter dem Einfluß des Alkalis kondensieren. Denn bereits bevor Wurtz¹⁾ Acetaldehyd mit Salzsäure zu Aldol kondensierte, hatte Aug. Kekulé²⁾ gefunden, daß bei der alkalischen Reduktion des Acetaldehyds mit Natriumamalgam Butylenglykol sich bildet. Für dieses Glykol hat Kekulé,

¹⁾ Bull. soc. chim. [2] 17, 289 (1872, 5. April).

²⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 5, 56 (1872, 3. Februar).

„da es sich um ein durch Kondensation von zwei Aldehydmolekülen entstandenes Produkt handelt“, drei Formeln in Betracht gezogen, von denen er durch Oxydation die Formel $\text{CH}_3\text{.CHOH.CH}_2\text{.CH}_2\text{OH}$ beweist. Die Formel kommt dem Reduktionsprodukt des Aldols zu, aus dem Kekulé's Butylenglykol auch in der Tat erhalten wurde. Die Vereinigung von Desoxybenzoin mit Aldol könnte sich nach folgendem Schema vollziehen:

Allein ein derartiges Aldehydketon hätte keine sauren Eigenschaften mehr. In der Tat ist die Diäthylcarbобензonsäure eine sehr schwache Säure, die sich weder in Sodalösung, noch in Ammoniumcarbonat, noch in Salmiakgeist auflöst. Wie sich zwei Benzaldehydmoleküle zu Benzoin kondensieren, so könnte hier unter Ringschluß eine cyclische Benzoinkondensation eintreten, entsprechend dem Schema:

Diese Formel I würde die Spaltung der Diäthylcarbобензonsäure in Benzoesäure und Phenylisovaleriansäure verständlich machen, auch könnte ein derartiges cyclisches Ketol schwach saure Eigenschaften haben, es wäre *1,2-Diphenyl-3-methylcyclopentan-1-ol-5-on*. Im Widerspruch mit dieser Auffassung steht es, daß es Anschütz und Berns weder gelang, die Diäthylcarbобензonsäure zu acetylieren, noch die Ketongruppe durch Oximbildung nachzuweisen, wohl aber erhielten sie mit Alkohol und Salzsäure einen Äthyläther.

Wollte man trotz der so schwach sauren Eigenschaften in der Diäthylcarbobenzonsäure eine Carbonsäure sehen, so wäre folgende Formel II zu berücksichtigen, die allerdings die Spaltung in γ -Phenylisovaleriansäure und Benzoesäure weniger gut erklärt:

Die Synthese der γ -Phenylisovaleriansäure oder γ -Phenyl- β -methyl-n-buttersäure hat uns veranlaßt, die Untersuchung der Diäthylcarbobenzonsäure selbst wieder aufzunehmen.

Studien in der Thiophenreihe.¹⁾ VI. Über die Kondensation von Thiophen mit Phthalsäureanhydrid;

von *Wilhelm Steinkopf*.

(Mitteilung aus dem chemischen Institut der technischen Hochschule Karlsruhe.)

(Eingelaufen am 21. Oktober 1914.)

Die Kondensation von Benzol und Phthalsäureanhydrid mit Hilfe von Aluminiumchlorid führt bekanntlich zur o-Benzoylbenzoesäure, aus der durch Wasserabspaltung Anthrachinon entsteht. Die analoge Reaktion mit Thiophen, die über die o-*Thenoylbenzoesäure* zu einem Thiophenanalogen des Anthrachinons führen müßte, sollte nach Versuchen von F. Ernst²⁾, die im

¹⁾ 1.—5. Mitteilung: diese Annalen **403**, 1 (1914).

²⁾ Ernst, Ber. d. d. chem. Ges. **19**, 3278 (1886).