4. Auf gerichtliche Chemie bezügliche Methoden.

Von

A. Czapski.

Zum Nachweis, zur Trennung und zur Bestimmung von Arsen und Antimon hält G. Bressanin¹⁾ das Verfahren von Blattner und Brasseur²⁾ in folgender, etwas abgeänderter Form für geeignet.

Die zu untersuchende Substanz wird mit Schwefelsäure von 50° Baumé gelöst und die Lösung auf ein bestimmtes Volumen gebracht. In einem aliquoten Teile der Lösung werden Arsen und Antimon gemeinsam mit Jodkalium gefällt und das verbrauchte Jod nach dem Auswaschen des Niederschlages malsanalytisch bestimmt. Ein anderer Teil der Lösung dient zur Bestimmung des Arsens allein, das nach Zusatz von $\frac{1}{3}$ Volumen Salzsäure wieder als Trijodid gefällt wird. Aus der Menge des zur Fällung nötigen Jods lässt sich dann der Arsengehalt und aus der Differenz der ersten und zweiten Bestimmung der Antimongehalt berechnen.

Zum Nachweis von Arsen, Phosphor und Antimon in Vergiftungsfällen empfiehlt Fr. Pedrazzini³⁾, die bei der Reduktion des Untersuchungsobjektes durch Zink und Schwefelsäure entstehenden Wasserstoffverbindungen in stark verdünnte Silbernitratlösung zu leiten. Das in dem eventuell gebildeten Niederschlag enthaltene Antimon kann mit Weinsäure gelöst und als Sulfid identifiziert werden. In der von dem Niederschlag getrennten Flüssigkeit weist man das Arsen als Arsenwasserstoff und den Phosphor mit Molybdänflüssigkeit nach.

Zum Nachweis von Blausäure. G. Venturoli und A. Finzi⁴⁾ haben gefunden, dass Senföl ähnlich reagiert wie Blausäure und Rhodanwasserstoffsäure, zu Verwechslungen also leicht Anlass geben kann.

Dass Guajak tinktur von Cyansäure blau gefärbt wird, beruht auf der Reduktion der Cyansäure durch Guajakonsäure zu Cyanwasserstoffsäure. Letztere wird durch den Sauerstoff der Luft wieder oxydiert und die Reaktion tritt von neuem ein. Diese katalytische Wirkung hat

¹⁾ Boll. chim. farm. **50**, 691; durch Zeitschrift f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel **23**, 692.

²⁾ Chemiker-Zeitung **28**, 211.

³⁾ Boll. chim. farm. **50**, 134; durch Zeitschrift f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel **23**, 692.

⁴⁾ Boll. chim. farm. **49**, 201; durch Zeitschrift f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel **23**, 608.

die Cyansäure mit Hämoglobin, Ferrosulfat und anderen Körpern gemein. Sie kann auch zur Erklärung der Schönbein'schen Reaktion auf Blausäure und der van Deen'schen Reaktion auf Rhodanwasserstoffsäure dienen, wie die folgenden beiden Gleichungen zeigen:

Die Verfasser haben auch festgestellt, dass im Blut entweder an und für sich Sulfoeyanat enthalten ist, oder dass das Hämoglobin eine Cyansäuregruppe besitzt.

V. Atomgewichte der Elemente.

Von

A. Czapski.

Das Atomgewicht des Neodyms. Als Ausgangsmaterial zur Bestimmung des Atomgewichts der seltenen Erden dienen einerseits die Oxalate derselben, andererseits die Sulfate und schliesslich die Chloride. Bei Anwendung der ersteren lassen sich annähernde Resultate auf ziemlich einfache Weise erreichen, auf grosse Genauigkeit können sie aber keinen Anspruch erheben.

Die Sulfate bieten wesentlich grössere Schwierigkeiten, weil sie beim Trocknen bei zu niedriger Temperatur Wasser und Schwefelsäure zurückhalten, bei hoher Temperatur dagegen leicht Schwefelsäure abgeben. Von der Analyse der Chloride hat man bisher wenig Gebrauch gemacht, weil diese beim Erwärmen gern unlösliche basische Verbindungen bilden. Nun hat aber Matignon¹⁾ gefunden, dass man beim Erhitzen in einem Strom von Chlorwasserstoffgas, selbst wenn man die Temperatur bis zum Schmelzen erhöht, vollkommen lösliche Produkte erhält.

Weil nun die Analyse der Halogenverbindungen bei Atomgewichtsbestimmungen immer noch zu den einwandfreiesten Resultaten führt, haben G. P. Baxter und H. C. Chapin²⁾ für Untersuchungen über das Atomgewicht des Neodyms das Neodymchlorid als Ausgangsmaterial gewählt.

Es waren ihnen von der Welsbach Light Company 3,5 kg Neodym-ammoniumnitrat überlassen worden, das, wie sie feststellten, noch beträchtliche Mengen Lanthan, Cer und Praseodym und Spuren Samarium enthielt.

¹⁾ Comptes rendus **133**, 289 (1901); **140**, 1182 (1905).

²⁾ Zeitschrift f. anorgan. Chemie **70**, 1.