8—9 mm longa; stamen vexillare praeter basin cum ceteris connatum; ovarium dense sericeo-villosum, ovulis 5—7 (?), stigmatibus capitellato. — Mexico: Oaxaca, Chinantla, Pinotepa (H. Galeotti, no. 3459).

Sehr eigentümlich durch die deutlichen schmalen Kelchzähne.

XCIII. H. Harms, *Selerothamnus*, eine neue Gattung der Leguminosae—Papilionatae aus Mexiko.

Selerothamnus Harms nov. gen. Calyx oblique cupulatus, pubescens, 4-dentatus, dentibus tubo fere aequilongis vel dimidio brevioribus, 3 inferioribus lanceolatis acuminatis vel ovatis acutis vel acuminulatis, summo saepius integro bifido lanceolato acuminato vel latissime ovato obtuso vel acuto. Corolla exserta parce adpresse pubescens vel glabra, petalis longiuscule unguiculatis; vexilli lamina obovata vel suborbiculari-obovata in unguiculum angustata, margine basi versus unguiculum inflexo, extus parce adpresse pilosa vel subglabra; alae carina angustiores, lanceolatae vel lanceolato-oblongae obtusae; carinae petala latere exteriore subrecta obtusa, basi versus unguiculum fere rectangula. Stamen vexillare praeter basin liberam cum ceteris connatum; antherae parvae. Ovarium $\pm$ stipitatum, lineari-lanceolatum, saepius villosum, ovulis saepe 5 (vel 4—6), stylo glabro $\pm$ curvato, stigmatibus minute capitellato. — Frutex (?) ramulis pallidis vel cinereis. Folia petiolata impari-pinnata, foliolis 5 breviter petiolulatis, 2-jugis, oblongis vel obovatis vel lanceolatis, saepe acuminatis vel acutis, pubescentibus, juvenilibus $\pm$ sericeis; stipulae elongatae lineari-lanceolatae, deciduae, stipellae longiuscula elineares. Flores breviter pedicellati fasciculati, fasciculis in inflorescentias elongatas racemiformes dispositis, bracteis bracteolisque linearibus.

1. *Selerothamnus pentaphyllus* Harms, nov. spec.; foliorum rhachis cum petiolo pubescens 6—12 cm vel ultra longa, foliola breviter (2—3 mm) petiolulata, petiolulis pubescentibus, oblonga vel obovato-oblonga vel ovato-oblonga, basi obtusa vel rotundata vel subemarginulata, apice acute acuminulata, supra adpresse puberula, subtus subsericeo-pubescentia, costa et nervis 10—15 parallelis subtus prominulis, 4—8 $\times$ 2—6 cm, stipellae deciduae, 3—4 mm longae; inflorescentiae densae et multiflorae, rhachi pubescente vel villosula, 10—17 cm vel ultra longa, pedicelli 2—3 mm longi, bracteolae ad basin calycis geminae lineari-lanceolatae 3 mm longae, deciduae; calyx 9 mm longus, dentibus 4 lanceolatis acuminatis tubo subaequilongis, summo paullulo latiore; vexillum tenuiter longe (4—5 mm) unguiculatum, 16—17 mm longum, lamina suborbiculari-obovata 11 $\times$ 9 mm, extus parce adpresse pilosa; ovarium villosum.

Mexico: Prov. Oaxaca, Distr. Cuicatlan, bei Salome (E. Seler, no. 61: VI. 1888). — Hierhin gehört wohl auch: Puebla, Limestone hills,

'tehuacan, 5000 ft. (Pringle, no. 6748. — VII. 1897; Blättchen dicker, oft stumpf.)

2. *Selerothamnus Purpusii* Harms, nov. spec.; differt a *S. pentaphyllo* calyce 7 mm longo brevius dentato, dentibus tubum dimidium fere aequantibus, inferioribus 3 ovatis acutis vel acuminulatis, supremo latissime ovato obtuso vel brevissime bifido, dente infimo circ. 3 mm longo, bracteolis 2—2,5 mm longis; vexillo 14 × 12 mm, parce adpresse puberulo vel subglabro.

Mexico: Puebla, El Riejo (C. A. Purpus, no. 1187; VI. 1906); Tlacuilaltepec (Purpus, no. 3897; 1909).

Ob sich diese Art neben *pentaphyllus* halten lässt, ist fraglich. Immerhin sind die Unterschiede in der Länge der Kelchzähne recht deutlich; doch ist zu beachten, daß das oben zu *pentaphyllus* gerechnete Exemplar von Pringle auch aus Puebla stammt.

3. *Selerothamnus Ehrenbergii* Harms, nov. spec.; foliola oblonga vel saepe oblongo-lanceolata vel lanceolata, 3—7 × 1—3,5 cm; inflorescentiae 7—10 cm longae; calycis pubescentis 6—7 mm longi dentibus tubum circ. dimidium aequantibus fere 3 mm longis, inferioribus ovato-lanceolatis acuminulatis, summo latiore ovato apice anguste subtruncatulo vel obtusiusculo vel levissime bifido; bracteolae 2 mm longae; ovarium ventre ± villosum, latere glabrum vel subglabrum, dorso ± villosulum, stipite villosulo.

Mexico: Mestitlan (Ehrenberg, no. 1304; 1839).

Hat etwas kleinere Blüten; die Kelchzähne sind nicht so lang wie bei *pentaphyllus*, der Fruchtknoten ist weniger behaart, die Blättchen oft schmaler. Auf die hier zu einer neuen Gattung gerechneten Pflanzen weist H. Pittier (in Contrib. U. S. Nat. Herb. XX. 2. [1917] 86) hin; er sagt: Die Pflanzen Pringle no. 5649 und 6748, Rose no. 5869 und 9923, Purpus no. 1187, die als *Lonchocarpus* bezeichnet sind, haben aufspringende Hülsen und Blättchen mit Stipellen; sie sollten vielleicht neben *Galactia* gestellt werden. In der Tat erinnert der Kelch mit seinen 4 Zähnen sehr an *Galactia*, und in die Nähe dieser Gattung der *Phaseoleae* möchte auch ich diese Pflanzen stellen; leider kenne ich nicht die Hülsen. Auch bei manchen *Galactia*-Arten haben wir Blätter mit 5 Blättchen, und somit würde sich *Selerothamnus* auch darin an *Galactia* annähern. Vielleicht handelt es sich nur um eine einzige, im Bau des Kelches veränderliche Art von *Selerothamnus*. — Die Beschreibung von *Lonchocarpus littoralis* T. S. Brandegee in Zoe V. (1903) 157 (Cape Region, Lower California) erinnert etwas an *Selerothamnus*. Pittier schließt die Art von *Lonchocarpus* aus, da die Hülsen aufspringen und Stipellen vorhanden seien (in der Diagnose heisst es aber, die Hülse sei „indehiscent, slightly constricted between the seeds“).