müßte ein Pendel, an dem eine radioaktive Substanz befestigt ist, langsamer schwingen als ein Pendel, bei dem die radioaktive Substanz durch eine der inneren Energie oder Masse der radioaktiven Substanz entsprechende nichtradioaktive Substanz ersetzt ist. Ein entsprechender Unterschied hat sich aber aus den Versuchen *Southern's* nicht ergeben (7). Auch die von der Quantentheorie geforderte Nullpunktsenergie folgt aus diesen Betrachtungen.

9. *Ergebnis.* Überblickt man die angegebenen Beweise, so ist zunächst hervorzuheben, daß es *keine* Tatsachen gibt, die der Theorie widersprechen, und umgekehrt auch keine Folgerungen aus der Theorie nachweisbar den Erfahrungen widersprechen. Andererseits sind viele Tatsachen vorhanden, die sich bis heute zwanglos *nur* mit dieser Theorie erklären lassen. Die Hauptargumente liegen in der von ganz allgemeinen Voraussetzungen ausgehenden mathematischen Theorie und der strengen Durchführung des Relativitätsprinzips, das für unser Denken etwas Selbstverständliches hat. Es lassen sich dafür eine Reihe von erkenntnistheoretischen und philosophischen Beweisen erbringen (11). Es liegt geradezu im Wesen aller physikalischen Messungen, daß immer hin- und zurücklaufende Signale benutzt werden, so daß eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit mit der Richtung von vornherein nicht berücksichtigt wird. Allerdings wird man einen *direkten* Beweis für die Richtigkeit der Theorie erst darin sehen, wenn die geforderte Änderung der Längen- und Zeitmaßstäbe experimentell beobachtet ist. Nun hängt die *Zeitverschiebung* von der Größe v/c ab und die *Maßstabsänderung* von der Größe $\left(\frac{v}{c}\right)^2$. Beobachtbar werden also die Abweichungen nur sein, wenn man sich große Werte dieser Brüche verschaffen kann. Daß das schwer ist, liegt an der Größe der Lichtgeschwindigkeit c , die in alle Messungen eingeht. Befänden wir uns z. B. in einer Welt, die akustische Signale zur Zeit- und Längenbestimmung benutzt, so würde der Beweis leichter zu erbringen sein. Vergleicht man aber die Beweise z. B. mit denen der Atomtheorie, die auch nicht zu einer direkten Wahrnehmung der Atome führen konnten, so sieht man, daß wir auch bei der Relativitätstheorie auf dem besten Wege sind, zumal man bedenken muß, daß es sich hier um die Grundlagen des physikalischen Denkens handelt, die Beweise also viel schwerer zu erbringen sind. Vor allem scheint es nötig, diese Grundlagen, d. h. die Raum- und Zeitgrößen sowie die von ihnen abhängigen Begriffe, d. h. Geschwindigkeit, Beschleunigung usw., einer eingehenden Revision zu unterziehen. Wenn sich vorläufig die Theorie auf rein *negative* Versuche stützt, so ist sie darin mit der Thermodynamik zu vergleichen, deren Hauptsätze ebenfalls aus negativen Resultaten (Unmöglichkeit des perpetuum mobile 1. und 2. Art) abgeleitet werden.

10. *Alphabetisches Literaturverzeichnis.*

1. O. Berg, Das Relativitätsprinzip der Elektrodynamik. Göttingen 1910.
2. E. Cohn, Physikalisches über Raum und Zeit. Leipzig 1911.
3. A. Einstein, Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. Leipzig 1913.
4. A. Einstein, Zur allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte der Kgl. Pr. Akademie der Wissenschaften 1914 und 1915.
5. A. Einstein, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte 1915.
6. M. Laue, Das Relativitätsprinzip. Braunschweig 1911.
7. H. A. Lorentz, Das Relativitätsprinzip (3 Vorlesungen). Leipzig 1914.
8. Lorentz-Einstein-Minkowski, Das Relativitätsprinzip. Leipzig 1913.
9. P. Riebesell, Die geometrischen Deutungen der Relativitätstheorie. (Mitteilungen d. math. Ges. in Hamburg Bd. 5, Heft 3, 1914.)
10. V. Varicak, Über die nichteuklidische Interpretation der Relativitätstheorie (Jahresberichte d. d. Math.-Vereinigung Band 21, 1912).
11. H. Witte, Raum und Zeit im Lichte der neueren Physik. Wolfenbüttel 1914.

Moderne Probleme der Tierphysiologie.

Von Dr. Albert Koch, Münster i. W.

I.

Die Funktion der pulsierenden Vakuole.

Nachdem man in der zoologischen Forschung die Notwendigkeit und den Wert physiologischer Untersuchungen neben den rein morphologisch-anatomischen Studien erkannt hat¹⁾, mehrten sich begreiflicherweise die zoologischen Spezialarbeiten rein physiologischer Natur, und das, was bisher gelegentliche Einzelbeobachtung gewesen ist, tritt in den Mittelpunkt einer exakten experimentellen Studie. Und auch nur auf diese Weise ist es natürlich möglich, ganz allmählich an das ideale Ziel der *vergleichenden* Physiologie zu gelangen, d. h. die allgemeinen Grundprobleme zu erforschen, die für das Leben aller Tiere gelten, und deren Gesamtergebnis uns eben als das Wesen des Lebens erscheint.

Ein Blick in die tierphysiologische Literatur unserer Tage zeigt, wie weit wir noch von dem Endziele dieser Forschungen entfernt sind, aber trotzdem dürfte es eine lohnende Aufgabe sein, einige der Wege, auf denen man diesem Ziele näher zu kommen sucht, zu besprechen. Es kann sich dabei natürlich nur um eine zwanglose Zusammenstellung einer Reihe „moderner“ Probleme der vergleichenden Physiologie²⁾ handeln.

¹⁾ Vor allem das im Erscheinen befindliche „Handbuch der vergl. Physiol.“. Herausgegeben von Winterstein (G. Fischer, Jena). Kleinere Sammelwerke von hervorragender Bedeutung sind: Verworn, Allgemeine Physiologie; Pütter, Vergleichende Physiologie; Jordan, Vergl. Physiol. wirbelloser Tiere, I. Bd.: Ernährung (sämtlich bei Gustav Fischer, Jena).

²⁾ Eine ausführliche Besprechung und methodische Darstellung dieser Probleme findet man in den dem-

„Der Elementarbestandteil *aller* lebendigen Substanz und das Substrat aller elementaren Lebensäußerungen ist die Zelle. Wenn daher die Physiologie in der Erklärung der Lebensäußerungen ihre Aufgabe sieht, so kann — das liegt auf der Hand — die *allgemeine* Physiologie nur eine Zellulärphysiologie sein.“ Dieser Forderung *Verworn's* kommen natürlich alle die Arbeiten nach, die sich mit dem Studium der Einzelligen befassen. Und gerade diese Untersuchungen haben auch ein besonderes Interesse, weil einmal bei den Protozoen die Verhältnisse — in vielen Beziehungen wenigstens — am einfachsten liegen, und weil zum anderen die Beschäftigung mit den Einzelligen gewissermaßen eine Einführung und Inhaltsübersicht über die Probleme und Tatsachen, Hypothesen und Theorien gibt, denen man in der Physiologie der Vielzelligen begegnet¹⁾.

Ein Problem aus der Physiologie der Protozoen ist

die Funktion der pulsierenden (oder kontraktilen) Vakuole.

Bis nahezu ans Ende des vorigen Jahrhunderts galt die kontraktile oder — wie man heute richtiger sagt — die pulsierende Vakuole²⁾ als eine Einrichtung im Dienste der Exkretion und Respiration des Protozoons. Daß diese Aufgabe die physiologische Bedeutung jenes Organells nicht erschöpfen kann, geht aus den verschiedensten Beobachtungen hervor. So hat man z. B. berechnet, daß ein dem Körper des Protozoons gleiches Wasservolumen durch die pulsierende Vakuole entleert wird in einer Zeit, die — für die beobachteten Arten³⁾ — zwischen 2 und 46 Mi-

nächst im Verlage von Gustav Fischer, Jena, erscheinenden „*Elementen der Tierphysiologie*, ein Hilfsbuch für Vorlesungen und praktische Übungen“ von Prof. Dr. Stempel, Münster, und dem Verfasser.

¹⁾ Die Physiologie der Protozoen ist daher auch einer der Zweige der Tierphysiologie, der bisher am eifrigsten bearbeitet worden ist. Werke von *Jennings*, Die niederen Organismen, ihre Reizphysiologie und Psychologie, Übersetzung von *Mangold, v. Provazek*, Einführung in die Physiologie der Einzelligen, *Doflein*, Lehrbuch der Protozoenkunde, *Lühe* (s. u.), enthalten zusammenfassende Darstellungen dieser Forschungen.

²⁾ Die pulsierende (kontraktile) Vakuole ist ein — gewöhnlich in der Einzahl vorhandenes und bei formbeständigen Einzelligen an bestimmter Stelle gelegenes — rhythmisch funktionierendes Gebilde im Protoplasma der Süßwasser-Einzelligen. Es handelt sich um eine tropfenförmige Flüssigkeitsansammlung, die ihr Volumen — teils durch Zufluß aus kleineren Bildungsvakuolen oder zuführenden Kanälen — allmählich vergrößert und nach Erreichung einer Maximalgröße sich plötzlich nach außen entleert. Nach der Entleerung bildet sich an Stelle der verschwundenen Vakuole eine neue, so daß ein regelmäßiges „Vakuolenspiel“ entsteht.

³⁾ Ein dem Körpervolumen gleiches Wasservolumen wird entleert:

	bei 28° C. in	2 Min. — Sek.
bei <i>Uronema nigricans</i>		
„ <i>Lembus pusillus</i>	26° C. „	2 „ 27 „
„ <i>Euplotes patella</i>	25° C. „	14 „ 16 „
„ <i>Stylonychia pustulata</i>	24° C. „	20 „ 28 „
„ <i>Stylonychia mytilus</i>	18° C. „	45 „ — „
„ <i>Paramecium aurelia</i>	27° C. „	46 „ — „

(Aus *Max Lühe*, Protozoa, in Hdb. d. Morph. d. wirbell. Tiere, herausgeg. von *Arnold Lang*.)

nuten liegt. Natürlich muß dieses abgegebene Wasser — bis auf einen kleinen Prozentsatz, der beim Stoffwechsel aus der aufgenommenen Nahrung durch Oxydation gebildet wird — vorher in den Körper aufgenommen worden sein. Schon deshalb ist die Annahme wenig einleuchtend, daß eine solche, relativ sehr große Wassermenge allein zur Beschaffung des Sauerstoffes („Atemwasser“) und zur Ausschwemmung von Stoffwechselendprodukten (vor allem Kohlensäure) dienen soll, zumal man bei vielen Einzelligen voraussetzen muß, daß auch eine Oberflächenatmung stattfindet. Eine rein exkretorische und respiratorische Tätigkeit dieses beim Spiel der Vakuole verbrauchten Wassers würde einen

Vordere pulsierende Vakuole, kurz nach der Entleerung; die Zuführungskanäle sind als „Bildungsvakuolen“ kolbig angeschwollen.

Hintere pulsierende Vakuole, kurz vor der Entleerung; während der osmotischen Vorgänge.

Fig. 1. *Paramecium aurelia* (nach *Stempel* und *Koch*, verändert).

„Wasserwechsel“ des Protozoons bedeuten, wie man ihn als Unterabteilung des Gesamtstoffwechsels in diesem Maße sonst nirgends wiederfindet. Doch wenn sich auch dieser Einwurf schließlich noch entkräften ließe, so bieten ganz andere Schwierigkeiten folgende Punkte, die bei Annahme einer einseitigen „Exkretions-Respirations-Funktion“ gar nicht zu erklären sind. Diese Beobachtungen sind aber andererseits gerade die Hauptstützen der modernen Theorie, die in der pulsierenden Vakuole in erster Linie einen Apparat zur Regulierung des osmotischen Druckes sieht.

Es handelt sich um folgende beobachteten und experimentell erwiesenen Tatsachen:

1. Pulsierende Vakuolen kommen ganz all-

- gemein vor bei den Süßwasserprotozoen, dagegen fehlen sie den allermeisten marinen und sehr vielen parasitischen Formen.
2. Die zwischen zwei Pulsintervallen liegende, für jedes Protozoon — unter gleichen äußeren Bedingungen — nahezu konstante Zeit (das sogenannte „durchschnittliche Pulsintervall“ oder die „Pulsationsfrequenz“) ist abhängig von dem Salzgehalt des umgebenden Mediums, und zwar zeigt sich, „daß die Frequenzzahl der pulsierenden Vakuole meist direkt proportional dem osmotischen Druck der Außenflüssigkeit¹⁾, also umgekehrt proportional dem Molekulargewicht der in dieser Außenflüssigkeit gelösten Substanz ist“ (*Stempell*²⁾). Das Pulsintervall (*Stempells* Versuche mit *Paramécium*) ändert sich also nicht in isosmotischen Lösungen (z. B. 0,25-prozentiger NaBr-Lösung und 0,14-prozentiger NaCl-Lösung).
 3. Bei langsamer (20 Tagen) Gewöhnung eines Süßwasserprotozoons (*Amoeba verrucosa*) an das Leben im Meerwasser (1½-prozentige NaCl-Lösung) verschwindet allmählich die pulsierende Vakuole; sie entsteht wieder bei langsamer (24 Stunden) Aussüßung des Salzwassers (*Zülzer*³⁾).
 4. Beim thigmotaktischen⁴⁾ Stillstehen oder beim Festlegen eines Protozoons zwischen Objektträger und Deckglas wird das Pulsintervall verlängert⁵⁾, im destillierten Wasser und bei Temperaturerhöhung verkleinert⁶⁾).

Alle diese Befunde, zu denen bei eingehenderer Darstellung noch weitere hinzutreten hätten, sprechen für eine osmotische Funktion der pulsierenden Vakuole. Diese Theorie wurde — nach *Stempell* — zuerst von *Hartog* (1888) aufgestellt, dann von *Degen*⁷⁾ eingehend begründet. Sie hat, wie alle neuen Theorien, Anhänger und Gegner

¹⁾ Dies Gesetz gilt nur für solche Salzgehalte, die keine „Giftwirkungen“ auf das Tier ausüben. Physiologische Erklärungsversuche dieser „Giftwirkungen“ von Salzlösungen bestimmter Konzentration sind bisher nur in den ersten Ansätzen vorhanden.

²⁾ Beiträge z. Physiol. d. puls. Vakuole (Vorl. Mitt.) S. B. med. nat. Ges., Münster 1913.

³⁾ Der Einfluß d. Meerwassers auf d. puls. Vakuole. A. Ent. Mech. XXIX.

⁴⁾ Unter „Thigmotaxis“ oder „Thigmotropismus“ versteht man eine auf Berührung hin erfolgende Reaktion, die sich durch Festhaften an der betreffenden Stelle äußert.

⁵⁾ Diese Erscheinung erklärt sich nach *Stempell* so, daß „ein Teil der Oberfläche der Osmosewirkung entzogen wird“, daß ferner „die Osmosewirkung durch Bildung osmotisch wirksamer Oxydationsprodukte unterstützende O-Aufnahme behindert“, und daß endlich „durch den mechanischen Druck zunächst ein Gegenweight gegen den osmotischen Druck geschaffen wird“.

⁶⁾ Temperaturerhöhung bewirkt Beschleunigung der Oxydationsprozesse und dadurch indirekt schnelleren Verlauf der osmotischen Prozesse.

⁷⁾ Untersuchungen über die kontr. Vakuole und die Wabenstruktur d. Protoplasmas. Bot. Ztg. Jg. 63, 1905.

gefunden. Zu den ersteren gehören u. a. *Zülzer* (l. c.), *Burian*¹⁾, *Stempell*²⁾, zu den letzteren *Khainsky*³⁾ u. a.

Die Grundgedanken der Theorie selbst sind etwa folgende: Das Protoplasma des Zellkörpers bildet der umgebenden Außenflüssigkeit gegenüber eine hypertonische Lösung, und ebenso die in der Vakuole angesammelten Exkretstoffe gegenüber dem Protoplasma. Vom biochemischen Standpunkt aus ist diese Annahme berechtigt; denn die Stoffwechselendprodukte haben im Vergleich mit den das Protoplasma bildenden Substanzen, den Eiweißkörpern, Kohlehydraten und Fetten, viel kleinere Moleküle, da sie ja Zerfallsprodukte jener Stoffe sind. Und infolge dieser einfacheren chemischen Konstitution müssen sie einen höheren osmotischen Druck als die Körperflüssigkeit entfalten. Den Mechanismus, der sich nun auf Grund dieser „osmotischen Beziehungen“ der drei Medien (umgebende Flüssigkeit, Protoplasma, Exkretstofflösung) zueinander im Protozoonkörper ausgebildet hat, erklärt *Stempell* für *Paramécium*, das als eines der höchststehenden Einzelligen auch in dieser Beziehung weitgehendst differenziert ist, folgendermaßen: „Die Endprodukte des Stoffwechsels sammeln sich in gelöster Form an bestimmten Stellen des Protoplasmas, nämlich in einem — vielleicht überall verästelten — Kanal- oder Lückensystem an, dessen Ausführungsgänge nach den beiden pulsierenden Vakuolen zusammenlaufen. Sobald die Vakuole sich entleert, schwellen die Enden dieser Zuführungskanäle kolbig als „Bildungsvakuolen“ an, da die Flüssigkeit hierhin als den Ort jetzt geringsten Druckes zusammenströmt und sich hier staut. Dadurch öffnen sich feine, aus Protoplasma gebildete Rückschlagsventile und lassen die in den Kanalenden angesammelte Flüssigkeit in den Vakuolenraum zusammenfließen, um sich nach Füllung desselben alsbald wieder zu schließen.“ In diesem Augenblick ist das oben beschriebene, aus drei — in bezug auf ihren Salzgehalt verschiedenen — Medien bestehende „osmotische System“ funktionsfähig. Alle weiteren Stadien im einmaligen Vakuolenspiel werden nun allein durch osmotische Vorgänge bewirkt: Es folgt jetzt „dadurch, daß die in der Vakuole angesammelte Lösung einen hohen osmotischen Druck hat, aus dem Protoplasma ein dauernder Zufluß von Wasser zu dieser abgeschlossenen Flüssigkeitsmenge durch die ad hoc gebildete semipermeable Vakuolenwand hindurch. Sobald der Druck des Vakuoleninhalts dann eine bestimmte Höhe erreicht hat, d. h. größer geworden ist als der äußere Wasserdruck, öffnet sich unter gleichzeitiger Durchreißung der dünnen Alveolarschicht

¹⁾ Die Exkretion in *Winterstein*, Hdb. d. vgl. Ph. Liefg. 5, Bd. 2.

²⁾ l. c. und Die Funktion d. puls. Vakuole u. einen Apparat zur Demonstration derselben. Zool. Jahrb., Abt. f. Allg. Zool. u. Physiol., Bd. 34, 1914.

³⁾ Zur Morph. u. Physiol. einiger Infusorien (*Paramécium caudatum*). Arch. Prot. Kunde, Bd. 21.

an der Spitze einer papillenförmigen Vorwölbung der Pellicula ein zweites Rückschlagsventil, und es erfolgt unter dem Druck des Protoplasmas und der Oberflächenspannung des Vakuolentropfens die vollständige Entleerung der Vakuole⁴⁾, und zwar „ohne aktive Kontraktion des Protoplasmas“. Darauf wiederholt sich der ganze Vorgang in derselben Weise.

Das neue Moment, das *Stempell* in diesen Erklärungsversuch hineinbringt, besteht in der Hauptsache in der Ventilwirkung¹⁾; denn ohne diese ist die ganze Apparatur schlechterdings nicht funktionsfähig. Die Untersuchungen von *Khainsky* an Querschnitten durch *Paramäcium* senkrecht zur Oberfläche der pulsierenden Vakuole scheinen nun auch anatomisch das Vorhandensein einer Art Ventil, wenigstens einer präformierten Stelle in der dünnen, die Vakuole von der Außenwelt trennenden Ektoplasmaschicht²⁾, die bei „Öffnung des Ventils“ offenbar berstet, nachgewiesen zu haben. Ebenso läßt sich vielleicht eine Beobachtung *Pütters*, daß nach der ersten Füllung der Vakuole die Verbindung zwischen den Enden der Zuführungskanäle und der Vakuole unterbrochen sei, als anatomischer Nachweis dafür deuten, daß in diesem Stadium — d. h. nach Schließung des Rückschlagventils an der Mündung der Zuführungskanäle in die Vakuole — die Enden der Bildungskanäle vollständig kollabiert sind. Wie weit und ob es überhaupt bei der Natur der Sache möglich sein wird, diese in physiologischer Hinsicht notwendige Voraussetzung von Ventilen völlig einwandfrei anatomisch zu begründen, müssen wir vorläufig noch dahingestellt sein lassen.

Daß bei den verschiedenen Protozoen, die im Besitze von pulsierenden Vakuolen sind, die Verhältnisse in dieser Hinsicht sicher verschieden liegen, daß auch bei ein und derselben Art starke Schwankungen im Spiel der Vakuole auftreten können, die durch Nahrungsaufnahme, Rasse-eigentümlichkeiten usw. bedingt sind, kann die Gültigkeit der Osmosetheorie an sich wohl kaum mehr in Frage stellen.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die „Osmosetheorie“ die frühere Ansicht, in der pulsierenden Vakuole ein exkretorisch-respiratorisches Organell zu sehen, nicht a priori verdrängen will, sondern daß sie im Gegenteil eine solche Funktion als Grundlage (Anwesenheit der Exkretstofflösung) für ihre Theorie benutzt. Die „Osmosetheorie“ ist nur insofern Gegnerin der

alten Hypothese, als sie die Hauptaufgabe der pulsierenden Vakuole zweifellos in der Hinausbeförderung des osmotisch in den Protozoenkörper eingedrungenen Wassers sieht.

Daß unter den für die Osmosetheorie angenommenen Voraussetzungen tatsächlich ein Zustandekommen des Vakuolenspiels möglich ist,

Fig. 2. Schema des Stempellschen Apparates.

- A Äußeres Gefäß, Wasser enthaltend („Medium“);
- B mittleres Gefäß, 5-prozentige KNO_3 -Lösung enthaltend, unten durch Membran (punktiert) abgeschlossen („Protoplasma“);
- C inneres Gefäß, unten durch membranöse Blase D abgeschlossen, 25-prozentige KNO_3 -Lösung enthaltend („pulsierende Vakuole“);
- K „Exkretstoffreservoir“, 25-prozentige KNO_3 -Lösung enthaltend, füllt durch den Heber E („Zuführungskanäle“, im Text Heber II) die Vakuole. Der Heber besteht bei N aus einem Stück Gummischlauch. Die Zufuhr der Exkretstofflösung zu der Vakuole kann durch Schließung des an dieser Stelle befindlichen Elektromagneten unterbrochen werden;
- H Überlaufheber, der infolge des in der Vakuole entstehenden Füllungsdruckes eine Entleerung der Vakuole gestattet (im Text: Heber I);
- G „Rückschlagsventil“, das die Unterbrechung der Exkretstoffzufuhr bewirkt durch Schließung des elektrischen Stromes in der Apparatur M (nach *Stempell*).

zeigt ein Modell, das *Stempell* am Schlusse seiner Untersuchungen beschreibt¹⁾. Die Apparatur, die auf den ersten Blick allerdings wenig Ähnlichkeit mit einer pulsierenden Vakuole verrät, besteht im Prinzip aus drei ineinander sitzenden

¹⁾ Außerdem stammt die Erklärung der Funktion der Zuführungskanäle von *Stempell*.

²⁾ „Ektoplasma“ (= Ektosark): der nach außen gelegene Teil des Protoplasmas vieler Protozoen, der sich von dem das Innere des Zellkörpers bildenden „Endoplasma“ (= Endosark) meist durch größere Festigkeit oder Zähigkeit unterscheidet. Die Differenzierung in Ekto- und Endoplasma ist mikroskopisch infolge des verschiedenen optischen Verhaltens der beiden Medien leicht nachzuweisen: das Ektoplasma erscheint meist als heller Saum einer dunkleren, das Endoplasma bildenden Innensubstanz.

¹⁾ Eine ausführliche Beschreibung des Apparates findet sich außerdem noch in den eingangs (Fußnote) erwähnten „Elementen der Tierphysiologie“.

Glasgefäßen, von denen das mittlere nur seitlich aus Glas und an der Unterfläche aus einer tierischen Membran, das innerste in seinem ganzen unteren Teile aus einer solchen Blase gebildet wird. Das äußere Gefäß wird mit Wasser, die beiden inneren werden mit verschiedenprozentigen Salzlösungen (KNO_3) gefüllt. Das Wasser im äußeren Gefäß stellt das Medium dar, in dem das Protozoon lebt, das salzhaltige Wasser (5-prozentige KNO_3 -Lösung) im mittleren Gefäß entspricht dem Tier selbst, resp. dem Protoplasma desselben, die stärkere Salzlösung (25-prozentige KNO_3 -Lösung) im innersten Gefäß dem Vakuolenapparat. Ein aus dem inneren Gefäß herausführender Heber (I) stellt den äußeren Porus „mit dem an diesem angebrachten, sich bei einem bestimmten Druck des Vakuoleninneren öffnenden Ventil“ dar. Außerdem ist noch ein die Zuführungskanäle nachbildender Heber (II) vorhanden für die Zufuhr neuer „Exkretstofflösung“ (25 % KNO_3) in die „Vakuole“. Ein an diesem Heber angebrachtes Ventil¹⁾ entspricht dem Rückschlagsventil an der Mündung der Zuführungskanäle.

Das Modell gibt — bei richtiger Behandlung — genau das Spiel der Vakuole wieder: Füllung derselben (inneres Gefäß) bis zu einer gewissen Grenze, an der die Schließung des „Rückschlagsventiles“ erfolgt, wodurch eine weitere Zufuhr von „Exkretstofflösung“ durch die Zuführungskanäle (Heber II) unterbunden wird. Dann folgt weitere Füllung der Vakuole auf osmotischem Wege infolge Wassereintritts (durch die betreffenden tierischen Membranen hindurch) aus dem äußeren (Medium) ins mittlere (Protoplasma) und aus diesem ins innere Gefäß (Vakuole), bis schließlich durch den in der Vakuole entstehenden Füllungsdruck eine Öffnung des nach außen führenden „Ventils“ und somit eine „Entleerung der Vakuole“ eintritt (Überlaufen des Hebers I und Zusammenfallen der Blase am innersten Gefäß). Gleichzeitig wird aber dadurch das die Zuführungskanäle sperrende „Rückschlagsventil“ geöffnet, und die Füllung der „Vakuole“ beginnt von neuem.

Die große Überlegenheit dieses Stempellschen Modells über die frühere Rhumblersche Nachbildung der pulsierenden Vakuole, die bekanntlich auf Grund der Oberflächenspannungsverhältnisse zwischen Alkohol, Chloroform und Wasser zustande kommt, ist wohl sofort einleuchtend. Während bei *Rhumbler* nur eine der Vakuolentleerung rein äußerlich ähnliche Form der Ausstoßung einer von außen bezogenen Wassermenge, die mit „Stoffwechselendprodukten“ (Alkohol) beladen ist, aus dem Chloroform stattfindet, hat

Stempell in seiner Apparatur ein den natürlichen Bedingungen weit mehr entsprechendes Nachbild der Wirklichkeit geschaffen. Und darin besteht doch einzig und allein der Wert dieser Modelle, oder besser: physiologischer Nachbildungen, über deren Berechtigung die Meinungen ja allerdings manchmal geteilt sind. Geschieht die wissenschaftliche Verwertung eines solchen Apparates nach dem Grundsatz: „weil ich einen beliebigen in der Natur beobachteten Vorgang (also hier das Vakuolenspiel) irgendwie auf künstlichem Wege nachbilden kann, deshalb müssen die natürlichen Grundlagen, d. h. die im Leben geltenden Bedingungen für die betreffende Beobachtung, genau dieselben sein wie meine künstlich angewandten Mittel, mit denen ich äußerlich das gleiche Ergebnis erreichte habe“, so kann man von vornherein mit einem oder mehreren Fehlschlüssen rechnen. Und aus diesem Grunde verliert der Rhumblersche Versuch sehr an Bedeutung. Geht man aber so vor, daß man die im Leben beobachteten und als wesentlich erkannten Grundlagen nachzubilden und auf ihnen eine solche Versuchsanordnung aufzubauen versucht, daß schließlich auch das Endergebnis der in der Natur beobachteten Erscheinung entspricht, so kann das so entstandene Modell als Probe auf die Richtigkeit und physiologische Möglichkeit unserer Anschauung über das betreffende Problem dienen, — und so angewandt, ist die „Modellkonstruktion“ vielleicht keine schlechte Forschungsmethode zur Lösung tierphysiologischer Probleme.

Wie kann man schwachsichtig gewordenen Patienten (Soldaten) das Lesen wieder ermöglichen? ¹⁾

Wie schon der Titel andeutet, gaben dem Verfasser die jetzt infolge der Kriegsverletzungen gehäuftten Fälle von Schwachsichtigkeit Veranlassung, sich zu einem Thema zu äußern, das früher zwar schon behandelt worden ist (*Wagenmann*), das aber zurzeit für weitere Kreise lebhafteres Interesse und eine besondere praktische Bedeutung besitzt. Ein genaueres Eingehen auf die Mitteilung erscheint daher auch an dieser Stelle gerechtfertigt.

Fast die ganze Netzhaut mit Ausnahme eines kleinen Fleckes in der Mitte, der nur wenige Grad umfaßt, dient lediglich der Orientierung, und zwar vermittelt recht wenig deutlicher Bilder. Das feinere Unterscheidungsvermögen geschieht einzig mit Hilfe der Netzhautmitte. Dinge, deren Aussehen wir genau zu erkennen wünschen, bilden wir Punkt für Punkt im Netzhautzentrum ab, indem wir unser Auge von einem Punkt zum andern richten, die Dinge, wie wir sagen, Punkt für Punkt fixieren. Große Stücke des Gesichtsfeldes können ausfallen, ohne daß wesentliche Störungen sich bemerk-

¹⁾ W. Stock, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1915, 55, S. 217—229. M. 8 Textabb.

Das gleiche Thema behandelt ein Vortrag desselben Verfassers vom 3. Juni 1915 vor der mediz.-naturwiss. Gesellschaft zu Jena, Sektion f. Heilkunde. Münch. mediz. Wochenschr. 1915, 62, S. 964—966 (13, VII).

¹⁾ Es handelt sich um ein — in Zusammenhang mit elektrischen Hilfsapparaten angebrachtes — elektrisches Ventil, da sich aus rein technischen Gründen ein der Wirklichkeit mehr entsprechendes mechanisches Ventil, das auf die kleinsten Druckdifferenzen unter allen Umständen sicher reagiert, nicht oder doch nur mit sehr großen Schwierigkeiten konstruieren läßt.