Über Bastardierungsuntersuchungen in der *Veronica*-Gruppe *agrestis*.

Von **Ernst Lehmann.**

Botanisches Institut der Universität Tübingen.

Hierzu Tafel 1.

(Eingegangen am 15. März 1914.)

Als ich vor zehn Jahren in der Umgegend von Straßburg zumeist gemeinsam mit meinem Freunde LUDWIG Pflanzen sammelte, erregten die *Veronicae* der Gruppe *agrestis* unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir suchten sie nach den verschiedensten Floren zu bestimmen, kamen aber dabei in immer größere Schwierigkeiten. Nach einer Flora schien es immer unmöglicher als nach der anderen diesen Arten gerecht zu werden. Auch früher schon hatte ich dieselben immer im Auge gehabt, war aber auch damals nie recht mit ihnen fertig geworden. Ich beschloß deshalb, ihnen nun meine ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es wurde also möglichst reichlich lebendes Material beschafft, von überallher, wo ich solches erlangen konnte. Weiter wurden die Arten dieser Gruppe in beinahe allen größeren und vielen kleineren Herbaren eingehend durchstudiert und schließlich wurde die Literatur, welche sich mit ihnen beschäftigt, sorgfältig durchgearbeitet. Sowohl Herbar- als Literaturstudien zeigten gar bald, daß die Botaniker im allgemeinen nicht in der Lage waren, die Arten dieser Gruppe recht zu unterscheiden. Die Nomenklatur war aufs höchste verwirrt, das Herbarmaterial war auch in sonst erstklassigen Exsikkatenwerken, wie beispielsweise den KERNERSchen Exsikkaten nicht richtig bestimmt. Lange Zeit war über die Anerkennung der einzelnen sehr nahe verwandten Arten in vielen Spezialarbeiten gestritten worden und dennoch ließ die Klarheit noch so viel zu wünschen übrig.

So ergab also die Betrachtung von Herbaren und Literatur, daß hier mancherlei aufzuklären war. Aber auch die Untersuchung des lebendigen Materials, welches ich in Kulturversuchen zu studieren begann, ließ erkennen, daß es sich hier sicher nicht um einfache Verhältnisse handelte. Es zeigte sich vielmehr, daß die Arten der Gruppe *agrestis* in verschiedenen Richtungen sehr stark variieren. Alle diese Voruntersuchungen zusammen stellten mich vor die folgende doppelte Aufgabe. Einmal war an der Hand der Literatur und der Herbarien die Geschichte und die geographische Verbreitung der Arten genau zu studieren, weiter aber wurde es nötig die Variabilität in dieser Gruppe eingehend zu untersuchen.

Der erste Teil der Aufgabe wurde sofort in Angriff genommen. Ich habe in den Jahren 1906—1908 in hauptsächlich drei Abhandlungen die geographische Verbreitung und die Geschichte dieser Arten abgehandelt. So weit die dort erzielten Ergebnisse für das Folgende von Interesse sind, mögen sie hier kurz zusammengestellt werden. Die *Veronica*-Gruppe *agrestis* enthält sechs wohlgeschiedene Arten. Von denselben stehen sich einige näher, andere wieder ferner. So sind die drei Arten *V. polita* Fr., *opaca* Fr. und *agrestis* L. untereinander weniger verschieden, als alle zusammen von *V. Tournefortii* Gm. und *filiformis* Sm., welche wieder ihrerseits besonders nahe Beziehungen zueinander haben. Die sechste Art, *V. siaretensis* LEHMANN mit sehr beschränktem Verbreitungsgebiete, vereinigt Charaktere der beiden Untergruppen in sich. Den einzelnen Arten kommen, trotz ihrer völlig gleichen Verbreitungsmöglichkeiten durch die Kultur durchaus verschiedene, an vielen Stellen allerdings weithin übereinandergreifende Verbreitungsgebiete zu. *V. Tournefortii* hat ihr weltumspannendes Verbreitungsgebiet erst im Laufe des 19. Jahrhunderts schrittweise eingenommen.

Es blieb nun noch der zweite Teil der Aufgabe zu erledigen, nämlich das Studium der Variabilität der einzelnen Arten, ihrer Formenmannigfaltigkeit usw. Auch in dieser Richtung sind allerdings schon einige Schritte unternommen worden. Einmal war es gelungen, durch Kulturversuche sowohl innerhalb der Art *Veronica polita* als innerhalb der *Veronica Tournefortii* je zwei distinkte Unterarten herauszulösen¹⁾. Weiter konnte in Übereinstimmung mit anderen Autoren festgestellt werden, daß eine Reihe von Merkmalen in hohem Maße der Variabilität

¹⁾ Bei *V. Tournefortii* waren es *Subsp. Aschersoniana* und *Corrensiana* bei *V. polita Ludvigiana* und *Thellungiana*.

durch äußere Einflüsse unterworfen ist (z. B. relative Blütenstiellänge, Blattgröße, Gesamthabitus usw.). Dann aber forderte auch eine ganze Anzahl von Anomalien zum Studium heraus. Sie wurden in ihrer Verteilung über die verschiedenen Formen als auch über die einzelnen Individuen untersucht. Auch hierüber liegt eine ziemlich abgeschlossene Darstellung vor (1909). Trotzdem aber blieb noch gar viel zu tun, um die Formenmannigfaltigkeit innerhalb dieser Arten wirklich zu verstehen. Immer neue Formen traten mir draußen entgegen, deren Konstanz sich teilweise auch in der Kultur mehr oder weniger feststellen ließ. Je mehr solcher Formen ich aber beobachtete, umso mehr erhob sich dann die Frage, ob es wohl zweckmäßig sei, auf diese Weise weiter vorzugehen. Das Ziel, welches so zu erreichen war, konnte ja kein anderes sein, als, wie in so vielen Fällen, zahlreiche wenig unterschiedene erbliche Untersippen der einzelnen Arten festzustellen. Der Wert einer neuen solchen Feststellung erschien mir aber äußerst problematisch.

Dagegen lag eine andere Fragestellung direkt in der Luft; die Frage nämlich, ob und inwieweit eventuell Bastardierungen beim Zustandekommen der Formenmannigfaltigkeit in dieser Gruppe mitwirkten. Bei der nahen Verwandtschaft der einzelnen Arten, bei dem Vorkommen von Unterarten, weiter bei der sonst in verschiedener Richtung zu Bastardierungsversuchen so günstigen Beschaffenheit der *agrestis*-Arten war anzunehmen, daß sich hierbei nicht uninteressante Ergebnisse würden erzielen lassen. Solche Versuche wurden dann aber auch dadurch noch nahe gelegt, daß vor einigen Jahren wiederholt Bastarde zwischen den einzelnen Arten der Gruppe *agrestis* beschrieben wurden. Eine experimentelle Begründung solcher Bastarde, eventuell ein Studium ihrer Nachkommenschaft war aber zur Klärung der Formenmannigfaltigkeit durchaus erwünscht.

So führte schon der Wunsch, die Arten und Formen der *Veronica*-Gruppe *agrestis* wirklich zu verstehen, zu Bastardierungsversuchen. Naturgemäß aber mußten sich bei einer exakten Behandlung solcher Bastardierungen auch Resultate erzielen lassen, welche vom Standpunkte der Vererbungslehre von Interesse sein würden. Zu der Zeit, zu welcher ich diese Arbeit begann, lagen einmal noch kaum weiter durchgeführte Bastardierungsversuche zwischen spezifisch verschiedenen Sippen vor. Die gesamte Aufmerksamkeit war damals noch den Varietätsbastarden zugewandt. Heute hat das schon begonnen anders zu werden. Die bis in die dritte Generation durchgeführten Bastardanalysen spezifisch verschiedener Sippen sind aber noch durchaus vereinzelt. Ich werde

gegebenenorts darauf näher einzugehen haben. So versprach also ein Studium der Bastarde zwischen verschiedenen Arten und Unterarten dieser Gruppe für die Vererbungslehre wichtige Aufschlüsse zu erbringen. Es war vor allem zu untersuchen, welcherlei Bastarde sich überhaupt herstellen ließen und welchen Gesetzen ihre Bildung und das Verhalten ihrer Nachkommenschaft unterworfen ist.

Weiter interessierte mich die Frage, wie sich die schon erwähnten Anomalien nach Bestardierung verhalten würden. Ich hatte ja 1909 gezeigt, daß eine ganze Reihe erblich differenter, auf Anomalien begründeter Zwischenrassen in dieser Gruppe vorkommen. Das Verhalten solcher Zwischenrassen nach Bastardierung ist aber bisher nur wenig studiert worden. Es bietet aber großes Interesse und ist gerade in unserer Gruppe recht gut möglich zu untersuchen.

Ein weiteres Problem der modernen Erblchkeitslehre besteht in der Feststellung des Verhaltens quantitativ differierender Merkmale bei Bastardierungen. Mein Material bot mir auch in dieser Richtung günstige Angriffspunkte und so wurden auch derartige Untersuchungen in größerem Maßstabe angestellt. Gerade auf diesem Gebiet liegen zwar aus den letzten Jahren recht zahlreiche Versuche vor. Dennoch glaube ich, daß die hier vorzubringenden Resultate mancherlei Neues bieten werden.

Waren so im streng exakten Vererbungsversuche einzelne Merkmale durch verschiedene Generationen verfolgt, so boten sich auch Angriffspunkte für das Studium von Korrelationserscheinungen. Ich werde wenigstens auf einen solchen Fall im Rahmen dieser Arbeit zu sprechen kommen.

Bisher ausgeführte Bastardierungen innerhalb der Gattung
Veronica.

Bastardierungen innerhalb der Gattung *Veronica* unter exakt wissenschaftlichen Gesichtspunkten wurden bisher nur sehr wenige ausgeführt. FOCKE (1881, S. 325) stellt die *Veronica*-Bastarde, welche bis dahin entweder in der Natur gefunden oder aber künstlich hergestellt wurden, zusammen. Von den europäischen Arten weiß er nur von in der freien Natur aufgefundenen zu berichten. Dagegen werden einige künstliche Kreuzungen aus der neuseeländischen Sektion *Hebe* ausgeführt. Solche sind vor allem in England hergestellt worden. Besonderes Interesse dürfte *V. salicifolia* Forst. $\times$ *speciosa* A. Cunn. beanspruchen, welche als *V. Andersonii* Lindl. beschrieben ist. Sie hält nach FOCKE die Mitte zwischen den Stammarten. Die Blüten sind blau, in weiß verbleichend

(*V. speciosa* hat violette, *V. salicifolia* weiße oder blaßblaue Blüten) *V. Andersonii* soll fruchtbar und samenbeständig sein.

Sodann hat DE VRIES (1900, S. 87) festgestellt, daß bei Kreuzung einer weißblütigen Sippe *V. longifolia* mit der blaublütigen typische Mendelspaltung vorkommt mit blau dominierend.

Wenden wir uns nun nach diesen einleitenden Bemerkungen der Besprechung des Materials und der Versuche selbst zu.

Versuchsmaterial und Methoden.

Zu den Bastardierungsversuchen wurden ausschließlich die vier Arten: *V. agrestis* L., *polita* Fr., *opaca* Fr. und *Tournefortii* Gm. verwendet. Von *V. siaretensis* bin ich nicht im Besitze keimfähigen Samens. *V. filiformis* Sm. soll erst in Zukunft zu den Bastardierungen herangezogen werden. Ich konnte erst in diesem Jahre wieder Samen davon erhalten. Von *V. Tournefortii* kamen die beiden Unterarten *Corrensiana* und *Aschersoniana* zur Verwendung. Von *V. polita* subsp. *Ludwigiana*, von *opaca* die var. *phuricarpellata*.

Das Ausgangsmaterial lag mir aus meinen bisherigen Untersuchungen in jahrelang rein kultivierten Sippen vor. Ich habe die einzelnen Sippen dauernd seit 1906 oder 1907 in Beobachtung. Sie haben sich stets, wie bei den einzelnen Merkmalen erörtert werden wird, konstant erwiesen.

Die Isolation wurde in früheren Jahren durch Gazestürze besorgt. Da mir diese Form der Isolation aber nicht für alle Fälle völlig ausreichend zu sein schien, benütze ich jetzt seit 1911 mit engmaschiger Gaze bespannte Klappschränken. Alle Fugen sind durch doppelten Boden oder vorspringende Leisten sorgfältig verschlossen. Es wurde stets die größte Aufmerksamkeit auf dauerndes Intaktbleiben der Gaze an allen Stellen gerichtet. Versuche, welche in schadhaft gewordenen Gazeschränken gehalten waren, wurden verworfen. Die Kulturpflanzen wurden stets nebeneinander in Töpfen erzogen. Jede Versuchspflanze erhielt einen eigenen Topf. Die Töpfe wurden in die Erde eingelassen. Bei der Isolation konnte der Topf im ganzen in das Klappschränken gesetzt werden bezw. in früherer Zeit unter eine Gazestürze. Es kam stets nur ein Topf in ein einzelnes Isolationsbehältnis. Die Gewinnung von sehr zahlreichem Samen und damit einer sehr umfangreichen Nachkommenschaft gestaltete sich auf diese Weise außerordentlich einfach. Da alle die in Frage kommenden Arten entweder durchaus oder doch fakultativ autogam sind, so war es nur nötig, die

zu isolierenden Pflanzen unter ihrem Isolationsbehältnis sich selbst zu überlassen. Die Bestäubung erfolgte dann ganz regelmäßig. Allerdings muß wenigstens bei *V. Tournefortii* und *polita* darauf gesehen werden, daß die Pflanzen nicht an schattigen Stellen oder an trüben, feuchten Tagen unter die Isolationsbehältnisse gebracht werden. Dann blühen nämlich die Blüten nicht mehr auf. Sie bleiben ganz klein und zwar verhalten sich nicht nur die Blüten so, welche sich gerade zur Zeit der Isolation entwickeln wollen. Sehr häufig ist vielmehr die Stimmung der Pflanzen ihre Blüten zu entfalten, dann auch nach der Entfernung aus dem Isolationsbehältnis noch auf lange Zeit sehr stark herabgesetzt oder auch, wenn die Bedingungen besonders ungünstig sind, völlig unterdrückt. Auf diese Weise kann man wichtige Samenträger verlieren oder doch zur vergleichenden Betrachtung unbrauchbar machen. Die erzielten Samen wurden ab 1912 in Töpfe mit im Autoklaven sterilisierter Erde ausgesät.

Die Messung von Blüten- und Blattdimensionen wurde in der Weise vorgenommen, daß sowohl Blüten als Blätter auf eine weiße Unterlage gelegt wurden und durch den darüber gelegten Glasmasstab abgelesen werden konnte. Das ließ sich hier auch bei den flachen, leicht abfallenden Blüten, vorzüglich durchführen. Alle Messungen der Blüten und Zählungen der Kelche wurden persönlich ausgeführt. Nur bei den Blattmessungen unterstützte mich z. T. in dankenswerter Weise Herr Dr. FROHNMEYER.

Auf die Vorteile und Nachteile meiner Versuchspflanzen habe ich schon 1909, S. 149 hingewiesen. Ich brauche hier im allgemeinen nicht wieder darauf zurückzukommen. Einige Einzelheiten werden bei der Besprechung der Merkmale noch eingehender berücksichtigt werden, desgleichen wird über die Kastration, die mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft war, alsbald noch einiges zu sagen sein. Die bestäubten Narben wurden stets mikroskopisch mit Hilfe von Zeiß A auf ihre Pollenreinheit abgesucht. Es war das bei dem großen Fokalabstand dieser relativ starken Linse keine schwierige Aufgabe. Nur in Ausnahmefällen wurden einige wenige Pollenkörner übersehen. Die Versuche, bei denen solche fehlerhafte Bestäubung eingetreten war, wurden ausgeschieden. Die Übertragung des Pollens selbst war sehr einfach. Es wurde ein Staubgefäß mit der Pinzette gefaßt und die geöffnete Anthere mit der zu bestäubenden Narbe in Berührung gebracht. Die Narbe wurde dann stets mit einer großen Menge von Pollen bedeckt.

Die wichtigsten Untersuchungen der letzten Jahre wurden sämtlich im botanischen Garten zu Tübingen ausgeführt, wo mir Platz im großen

Umfange zur Verfügung stand. Die Bastardierungen selbst wurden 1911 in einem kleinen Versuchsgarten in Ventnor (Insel Wight) ausgeführt. Über die Erziehung der früheren Generationen (vgl. 1909, S. 147).

Die Kastration.

Die Kastration der Blüten aller Arten wird dadurch ganz erheblich erschwert, daß die Antheren sich schon sehr zeitig, zumeist in der geschlossenen Blüte öffnen oder doch schon reifen Pollen enthalten, der bei der geringsten Berührung austritt. Da in unseren Fällen die Antheren ungefähr gerade so hoch stehen, wie die Narbe, so führt dies sehr häufig zur Selbstbestäubung. Auch ein einfaches Herausziehen der sehr lose am Filament sitzenden Antheren führt in solchen Fällen zum gleichen Erfolg.

Der einfachste Weg, diese Schwierigkeit zu vermeiden, schien da naturgemäß der zu sein, die Blüte eben zu einer früheren Entwicklungszeit zu kastrieren, zu einer Zeit, zu welcher die Antheren noch nicht so weit entwickelt sind. Waren beispielsweise bei *V. Tournefortii* die Antheren schon am Nachmittage vor der Eröffnung der Blüten für die Kastration in ungünstigem zuweit fortgeschrittenem Zustande, so konnte man daran denken, die Blüten etwa zwei Tage vor der Eröffnung zu kastrieren. Ich bin auch so vorgegangen und habe die Kastration zu den verschiedensten früheren Zeitpunkten vorzunehmen versucht. Ich bin aber sehr lange aus folgendem Grunde nicht zum Ziele gelangt. Versucht man nämlich die Kastrierung am Vormittage vor der am nächsten Morgen erfolgenden Eröffnung oder gar zwei Tage vor dieser auszuführen, so sind die Blüten noch sehr klein. Das erschwert zwar die Kastration selbst gar nicht. Im Gegenteil, auf diesem Stadium kann man die Antheren im geschlossenen Zustande nach einiger Übung sehr leicht entfernen. Der Erfolg ist aber dann weitaus in den meisten Fällen der, daß die Blüten durch diese Kastration im weiteren Wachstum gehemmt werden. Ihre Blumenblätter bleiben klein und weißlich, sie öffnen sich nicht mehr; auch die Narbe und der Fruchtknoten kommen dann in der Regel nicht mehr in den Zustand, daß sich eine normale Befruchtung ausführen ließe. Ja sogar der Blütenstiel, zu dieser Zeit noch kurz, pflegt dann nach dieser Verletzung klein zu bleiben, während er im normalen Verlauf der Dinge auch nach der Befruchtung noch heranwächst. Er führt je nach stattgehabter Befruchtung die für die *Veronicae* der Gruppe *agrestis* charakteristische Abwärtskrümmung aus,

die ohne erfolgte Bestäubung und bei ausbleibendem Fruchtausatz nicht zustande kommt¹⁾.

Schon GÄRTNER hatte die Erfahrung gemacht, daß die *Veronica*-Blüten sehr leicht durch Verletzungen in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Nach ihm soll auf gewissen Entwicklungsstufen schon eine Verletzung des Kelches genügen, um die Entwicklung der Blüten zu unterbinden. Über diese blütenbiologisch höchst interessanten Wechselbeziehungen kann ich mich aber hier nicht weiter verbreiten. Ich werde nach Beendigung meiner Versuche hierauf an anderer Stelle zurückkommen. Für uns sind diese Vorgänge ja nur deshalb von Wichtigkeit, weil sie eine frühere Kastration unwirksam machen.

Schließlich fand ich aber doch Mittel und Wege, die Kastration bei *V. Tournefortii* auszuführen. Einmal gelang es mir in einigen Fällen nach langen vergeblichen Versuchen doch, am Vorabend die Antheren im geschlossenen Zustand ohne Bestäubung der Narbe zu entfernen. Dann aber bot sich noch ein anderer Weg. Die Blüten von *V. Tournefortii* brechen, je nach der Beleuchtung und der Temperatur früher oder später am Morgen auf. Kurz vor der Eröffnung wird nun häufig, besonders bei *Aschersoniana*, an der Spitze der Knospe die Narbe sichtbar. Sie steht also etwas aus der im übrigen noch völlig geschlossenen Knospe heraus. Die etwas kürzeren Antheren sind zu dieser Zeit im Inneren der Knospe noch eingeschlossen. Diese hervorschauende Narbe wurde schnell mikroskopisch auf ihre Pollenreinheit untersucht, und hiernach bestäubt. Ich wartete dann das Öffnen der Blüten ab, welches bei intensiver Beleuchtung kurze Zeit später erfolgte.

Was nun in der geschlossenen Blüte nicht möglich war, konnte in der geöffneten leicht zustande gebracht werden. Die Antheren konnten geschlossen und unbeschädigt entfernt werden. Als diese Beobachtung einmal gemacht war, stellte sich auch bald heraus, daß die Antheren in manchen Fällen nach der Entfaltung der Blüten noch eine viertel oder auch halbe Stunde geschlossen bleiben. Es wurden in diesen Fällen die Antheren in der geöffneten Blüte entfernt, darauf wurde die Narbe auf Pollenreinheit mikroskopisch untersucht und sodann die Bestäubung vollzogen. Auf diese Weise konnte eine Bestäubung von *V. Tournefortii* unter völligem Ausschluß von Selbstbestäubung erzielt werden.

¹⁾ Wie ich nachträglich aus der Kieler Dissertation von HARS ersehe, hat auch dieser auf die Erfolge einer frühen Kastration von *Veronica*-Arten (*Tournefortii*, *Chamaedrys*) hingewiesen.

Bei *V. Aschersoniana* liegen all diese Verhältnisse etwas günstiger als bei *Corrensiana*. Deshalb gelangen die Bastardierungen aus den dargelegten technischen Gründen leichter, wenn *Aschersoniana* als Mutter fungierte, als wenn *Corrensiana* bestäubt werden sollte. Ich erzielte aber auch Kreuzungen mit *Corrensiana* als weiblichem Elter.

Die Schwierigkeiten, die übrigen verwandten Arten unserer Gruppe zu kastrieren, habe ich bis heute noch nicht überwinden können. Da hier die Antheren durchaus auf gleicher Höhe mit der Narbe stehen, dabei der Narbe im geschlossenen Zustande eng anliegen und sich schon vor dem Öffnen der Blüte ihrerseits öffnen, so ist die Kastrierung hier sehr schwer auszuführen. In einzelnen Fällen konnte ich Blüten benützen, in denen die Antheren aus irgendwelchen unbekannten Gründen von vornherein rückgebildet waren, die Narbe sich aber in gutem Zustande befand. Ich erzielte indessen in diesen Fällen keine Resultate. Natürlich hinderte aber die bisher unmögliche Kastration von *polita*, *agrestis* usw. ganz und gar nicht, eine Bestäubung der Blüten von *Tournefortii* mit dem Pollen jener Pflanzen auszuführen, da ja deren Blüten, wie wir gesehen haben, kastriert werden konnten. Derartige Bestäubungen sind denn auch häufig vollzogen worden.

Im Freien beobachtete Bastarde in der *Veronica*-Gruppe *agrestis*.

Es ist natürlich, daß gerade die Angabe des Vorkommens von Bastarden zwischen den verschiedenen Arten unserer Gruppe in der freien Natur besonders dazu auffordern mußte, solche Bastarde auch künstlich herzustellen. Ehe ich dazu schritt, habe ich natürlich diesen als spontan beschriebenen Bastarden meine spezielle Aufmerksamkeit zugewandt. Mir sind die folgenden Bastardbeschreibungen aus unserer Gruppe bekannt geworden.

HALLIER (in Fl. v. Deutschl. 1884, 17, S. 176) beschreibt einen Bastard *opaca* × *polita*. Das Material dieses Bastardes habe ich nicht gesehen.

Weiter aber beschreibt vor allem SCHUSTER eine ganze Reihe solcher Bastarde. 1905, S. 455 ff. werden beschrieben: *V. Wiesbauriana* nov. hybr. (*V. agrestis* L. × *V. Tournefortii* Gm.), *V. Vollmanni* nov. hybr. (*V. polita* Fr. × *V. Tournefortii* Gm.), *V. macrosperma* nov. hybr. (*V. opaca* Fr. × *V. Tournefortii* Gm.). 1907, S. 387 wird beschrieben: *V. Wildtii* hybr. nov. (*V. opaca* Fr. × *V. polita* Fr.).

Das Material seiner sämtlichen Bastarde wurde mir von Herrn Dr. SCHUSTER mit großer Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt. Auch war Herr Bergingenieur WILDT in Brünn so freundlich, mir Material der *V. Wildtii* zuzusenden. Ich habe all dies Material in der eingehendsten Weise durchstudiert und konnte schon 1908, S. 347 meiner Überzeugung dahin Ausdruck geben, daß es sich in all diesen als Bastarde beschriebenen Pflanzen nicht um Bastarde handelt, sondern um Varianten der reinen Arten. Ich möchte das hier nicht im einzelnen zu beweisen versuchen. Es wäre an sich nicht schwer. Die Leser dieser Zeitschrift aber dürften schon daran gewöhnt sein, daß man auf spontane Bastarde niemals einen allzugroßen bindenden Wert legen darf. Es sei in diesem Zusammenhange nur an COMPTONS Erfahrungen mit HAUSKNECHTS *Epilobium*-Bastarden erinnert. Ich möchte aber auf einige Punkte hinweisen, welche diese fälschliche Aufstellung der genannten Bastarde einigermaßen verständlich machen.

Ich habe oben ausgeführt, daß die *agrestes* eine große Formenmannigfaltigkeit aufweisen. Diese Formenmannigfaltigkeit kannte nun SCHUSTER sicher nicht genügend, als er seine Bastarde aufstellte. Das geht schon aus den Bemerkungen hervor, welche er über die reinen Arten machte. Dieselben sind in verschiedener Hinsicht durchaus unzutreffend. Ganz fehlerhaft ist beispielsweise die Bewertung eines Hauptunterscheidungsmerkmals der Arten, nämlich der Kapselbehaarung. Auch die Angaben über die Samenzahl sind ungenügend (vgl. dazu LEHMANN 1907, S. 469). Dann wird dem Abortieren der Samen ebenso wie dem Fehlschlagen des Pollens große Bedeutung für den Bastardcharakter beigelegt. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß beides unter bestimmten äußeren Bedingungen, die nicht das geringste mit Bastardierung zu tun haben, ebensowohl, und zwar gar nicht selten, vorkommt. Zu alledem bin ich heute in der glücklichen Lage, auf Grund brieflicher Mitteilung SCHUSTERS vom letzten Jahre bemerken zu können, daß auch er selbst die Bastarde zwischen *V. Tournefortii* und den drei anderen Arten nicht mehr aufrecht erhält. Dagegen möchte er an die Bastarde zwischen den letzteren noch glauben.

Bastardierungsversuche zwischen *V. Tournefortii* und *V. agrestis*, *polita* und *opaca*.

Ich habe hier die Protokolle über diejenigen meiner Kreuzungsversuche zwischen verschiedenen Arten der Gruppe *agrestis* wörtlich beigefügt, von denen ich über solche verfüge. Es sind natürlich auch sonst

noch sehr zahlreiche Bestäubungsversuche angestellt worden, bei denen ich mir nur kurz die Erfolglosigkeit notiert habe.

Versuchsprotokoll.

1. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 2) 5. Juli. Eine geschlossene blaue Knospe abgezogen. Die Staubblätter waren ganz anomal, offenbar parasitisch zerstört. Es wurde deshalb sogleich eine Bestäubung mit *V. polita Ludwigiana* vorgenommen. Die Kapsel war auch etwas herangewachsen, aber stark vergilbt und klein geblieben (28. Juli).

2. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 2) 23. Juli. Die Korolle war geöffnet, aber ganz klein; die Staubblätter waren obliteriert (kürzer als der Griffel). Unbestäubte Narbe (Mikroskop) belegt mit Pollen von *V. polita*. Am 23. Juli hatte die betreffende Kapsel sicher angesetzt, war aber ganz erheblich hinter den darüber befindlichen Kapseln zurückgeblieben. (Keine Samenbildung.)

3. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 2) 6. Juli. Die Korolle war geöffnet, aber klein geblieben. Die Staubblätter waren obliteriert (kürzer als der Griffel). Narbe unbestäubt (Mikroskop) belegt mit Pollen von *V. polita*. (13. Juli Fruchtknoten nicht geschwollen.)

4. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 8). In der offenen Blüte emaskuliert. Narbe ohne Pollen (Mikroskop). Dann belegt mit Pollen von *V. polita Ludw.* Am 13. Juli sicher angesetzt. (Weitere Nachrichten fehlen.)

5. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 7) 25. Juni. Eine Knospe vor dem Aufbrechen der Antheren vorsichtig beraubt. Mikroskopische Untersuchung ergab, daß die Narbe nicht von Pollen belegt war. Dann wurde die Narbe am selben Vormittag mit Pollen von *V. agrestis* blau belegt. Es wurde die stattgehabte Bestäubung mikroskopisch kontrolliert (29. Juni). Die Narbenpapillen waren lang herangewachsen, es wurde eine Nachbestäubung mit *V. agrestis* blau vorgenommen. Es wurde mikroskopisch kontrolliert, daß die Bestäubung von Erfolg war. Bis zum 13. Juli kein Ansatz.

6. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 8). 14. Juni emaskuliert, nicht ganz sicher, ob rein, da ziemlich weit. Öffnung wohl am nächsten Tag. Am 15. Juni mit Pollen von *V. polita* belegt. Am 4. Juli scheint eine Fruchtknotenanschwellung vorhanden, die aber sistiert ist. Am 13. Juli wird kein sicherer Fruchtansatz festgestellt.

7. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 9) 8. Juli. In der offenen Blüte emaskuliert. Mikroskopisch kontrolliert, daß die Narbe keinen Pollen besaß. Dann bestäubt mit *opaca pluricarpellata*. 13. Juli Frucht etwas angesetzt. Keine Samenbildung.

8. 3. Juli Staubfäden in der geöffneten Blüte entfernt. Belegt mit Pollen von *V. polita Ludw.* 13. Juli nicht angesetzt.

9. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 10) 8. Juli. In der offenen Blüte emaskuliert. Die Narbe war pollenlos; dann belegt mit Pollen von *V. polita Ludw.* 13. Juli etwas angeschwollen. 23. Juli aber klein geblieben. Keine Samenbildung.

10. *V. Aschersoniana* 1. Juli (Ventnor, 20, 16). Blüte mit Antheren entfernt. Antheren waren geschlossen. Dann bestäubt mit Pollen von *V. polita Ludw.* 13. Juli sicher etwas angesetzt, aber klein geblieben.

11. *V. Aschersoniana* 25. Juni. Die Knospe ließ am Tage vor der Öffnung ihren Griffel hervorragen. Sie wurde bestäubt mit *V. agrestis* blau. Es wurde kontrolliert, daß Blütenstaub in großer Menge die Narbe bedeckte. Die Antheren wurden in der Blüte belassen. 4. Juli. Die Frucht hatte angesetzt. Samen geerntet. Am 8. August in Tübingen ausgesät. Es war alles reine *Aschersoniana*. Hier war die Narbe nicht mikroskopisch auf

Pollenreinheit vor der Kreuzbestäubung kontrolliert worden. Es war die Narbe also nicht rein gewesen.

12. *V. Aschersoniana* 1. Juli (20, 16). Die aus der Knospe durch Drücken herausragende Narbe belegt mit Pollen von *V. polita* Ludw. Sonst die Blüte nicht behandelt. 4. Juli Fruchtausatz noch nicht zu bemerken. An 13. Juli Kapsel sicher etwas angesetzt, aber klein geblieben.

13. *V. Aschersoniana* 25. Juni (20, 16). Emaskuliert. Nach mikroskopischer Betrachtung ergab sich, daß sich kein Pollen auf der Narbe befand. 27. Juli bestäubt mit Pollen von *V. polita*. Das Vorhandensein von Pollen auf der Narbe wurde mikroskopisch kontrolliert. 4. Juli war der Fruchtknoten sicher etwas geschwollen. 13. Juli der Fruchtknoten war klein geblieben.

14. *V. Aschersoniana* 24. Juni (20, 9). Eine noch geschlossene Knospe ließ an der Spitze ihren Griffel hervorschauen. Dieser Griffel wurde bestäubt mit Pollen von *V. opaca pluricarpellata*. Blumenkrone, Staubblätter usw. wurden nicht entfernt. Die Blüte blieb sonst unangetastet. 19. Juli Samen geerntet. Auch hier fehlte die mikroskopische Narbenkontrolle vor der Bestäubung. Es war also arteigener Pollen auf der Narbe gewesen. Die aufgegangenen Samen ergaben reine *V. Tournefortii Aschersoniana*.

15. *V. Aschersoniana* 16. Juni emaskuliert, 17. belegt mit Pollen von *agrestis* blau. Bei der Kontrolle im Juli sicher etwas geschwollen. Kein Samenansatz.

16. *V. Aschersoniana* 24. Juni Knospe am Abend vor dem Öffnen auf den herausragenden Griffel mit Pollen von *V. opaca pluricarpellata* belegt. Sonst nichts an der Blüte getan. 29. Juni wohl angesetzt. Keine Samenbildung.

17. *V. Aschersoniana* 1. Juli emaskuliert, bestäubt mit Pollen von *V. opaca pluricarpellata*. 13. Juli sicher angesetzt, wenn auch hinter den jüngeren zurückgeblieben. 25. Juli Kapsel vergrößert, aber kein Samen angesetzt.

18. Dazu weitere sehr zahlreiche Bestäubungen ohne jeden Erfolg mit *agrestis*, *polita* und *opaca*.

19. *V. Corrensiana* (11, 15). Kastriert, vielleicht nicht ganz rein, da schon ziemlich weit entwickelt. Belegt mit Pollen von *agrestis* blau. 29. Juni angesetzt. 13. Juli gewachsen, wenn auch stark hinter den frei befruchteten an Größe zurückgeblieben. 17. Juli in jedem Fach ein Samen ausgebildet. Die beiden Samen ergaben *Corrensiana*. Es waren also zwei arteigene Pollenkörner auf der Narbe verblieben.

20. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 17) 27. Juni. Staubblätter entfernt, Blüte war schon ziemlich weit. Vorher und nachher mit Pollen von *V. agrestis* blau befruchtet. 23. Juli Samen geerntet. 8. August in Tübingen ausgesät. Es waren lauter reine *V. Corrensiana*. 28. Februar beseitigt (ohne mikroskopische Kontrolle).

21. *V. Corrensiana* (Ventnor, 11, 18) 8. Juli. Emaskuliert, Narbe ohne Pollen, belegt mit Pollen von *V. polita* Ludw. 13. Juli Frucht angesetzt, aber an Größe hinter den nächst jüngeren Kapseln zurückgeblieben.

Aus diesen Protokollen geht nun zweierlei mit Sicherheit hervor. Eine Bastardierung zwischen *V. Tournefortii* subsp. *Aschersoniana* oder *Corrensiana* als weiblichem Elter und den übrigen drei zu den Versuchen herangezogenen Arten läßt sich nicht zustande bringen. In keinem Falle, wo die Narbe vor der Bestäubung mit dem artfremden Pollen

mikroskopisch auf Pollenreinheit untersucht wurde, kam es zu einer erheblichen Anschwellung des Fruchtknotens. Wo, wie in den wenigen angeführten Fällen eine normale Frucht- und Samenbildung stattgefunden hatte, war die Narbe nicht auf Pollenreinheit untersucht worden, und es waren einzelne arteigene Pollen auf der Narbe vorhanden gewesen. Die so erzielten Samen brachten ausschließlich die reine Elternart hervor. Ich führe diese wenigen, eigentlich mißglückten Versuche aber zu dem Zweck mit an, damit nicht irgend jemand etwa der Ansicht sein könnte, ich habe nicht entwicklungsfähige Blüten zu meinen Versuchen benutzt.

Das zweite, was aus meinen Versuchen klar hervorgeht, ist die Tatsache, daß der artfremde Pollen in dem hier vorliegenden Falle, wie ja auch sonst häufig, die Anregung zur Schwellung des Fruchtknotens bis zu einem gewissen Grade geben kann. In einer ganzen Reihe von Fällen ließ sich das sicher feststellen, wie die Protokolle ja genugsam ergeben. In anderen Fällen blieb wieder jede sichtbare Anregung aus. Genauer habe ich nicht verfolgt, wie weit die Entwicklung im Inneren gehen kann.

Dagegen soll hier noch auf etwas anderes hingewiesen werden, was nicht ohne Interesse ist. Ich habe niemals beobachten können, daß mit dieser geringen Fruchtknotenanschwellung die Herabbiegung des Fruchstieles ausgelöst würde, die ja, wie ich schon erwähnte, auf eine normale Befruchtung nach einiger Zeit folgt, während sie bei ausbleibender Bestäubung nicht eintritt. Ich habe diese Dinge bisher nur beobachtet, ohne sie weiter zu verfolgen. Sie zeigen aber auch so schon, daß das post-florale Herabbiegen des Fruchstieles bei *Veronica Tournefortii* jedenfalls auf andere Reize zurückzuführen ist als die anfängliche Anschwellung des Fruchtknotens und mit der Bestäubung selbst kaum in ursächlichem Zusammenhange steht. Es werden später liegende Reizeinflüsse dieses Herabbiegen auslösen.

Ebenso also wie die Betrachtung des Herbarmaterials führten diese Bastardierungsversuche zu der Überzeugung, daß Bastarde zwischen *V. Tournefortii* und den drei anderen hier aufgeführten Arten der Gruppe *agrestis* nicht zustande kommen. Damit dürften diese Bastarde als gestrichen gelten.

Liegt also hier bei der Kreuzung zwischen *V. Tournefortii* und den anderen *agrestes* die Sache völlig klar, so konnte ich aus den oben angegebenen Gründen die experimentelle Klärung durch Bastardierung von *opaca*, *polita* und *agrestis* untereinander noch nicht zustande bringen.

Vielleicht ließen sich solche Bastarde — wenn sie überhaupt möglich sein sollten, was ich nach meinen Herbarstudien wie gesagt stark bezweifle — auch mit nicht völlig reinem Material herstellen, ähnlich wie ROSEN das bei *Erophila* tat. Ich habe aber für meine Versuchspflanzen davon noch völlig abgesehen. Ich möchte vielmehr versuchen, ob eine erfolgreiche Kastration nicht doch noch auf diesem oder jenem Wege gelingt.

Die Kreuzung verschiedener Arten in der Gruppe *agrestis* hat also derzeit nur negative Ergebnisse geliefert. Für unsere Frage nach der Variabilität in der Gruppe *agrestis* führen aber diese Ergebnisse zu dem Schluß, daß Arthastardierungen, wenigstens zwischen den hier benutzten Arten, nicht an der Hervorbringung dieser Variabilität beteiligt sind.

Die Bastarde zwischen den Unterarten *V. Tournefortii*
Corrensiana und *Aschersoniana*.

Zwischen diesen wohlgeschiedenen Unterarten, die ich im Jahre 1909 (S. 249) beschrieben habe, gelang es mir nun zu wiederholten Malen, Bastarde herzustellen. Ich erhielt den Bastard mit *Aschersoniana* als weiblichem Elter leichter als den reziproken Bastard. Das ist aber zweifellos nur auf technische Schwierigkeiten zurückzuführen. Ich gebe die folgende Übersicht meiner Bestäubungen, die sämtlich in Ventnor ausgeführt wurden.

Versuchsnummer	Blüte	Weiblicher Elter	Pollenelter	Erzielte Bastardpflanzen
C. V. 15, T. 1	r ₁ 9	<i>Aschersoniana</i>	<i>Corrensiana</i> 11, 3	6
C. V. 15, T. 1	15	"	" 11	0
C. V. 20, T. 16	6	"	" 11, 1	?
C. V. 20, T. 16	r ₁ 4	"	" 11	9
C. V. 20, T. 16	r ₂ 4	"	" 11	7
1227 (20/15)	r ₁ 6	"	" 11	13
1229 (20/9)	l ₁ 4	"	" 11	4
1234 (20)	—	"	" 11, 7	} nicht weiter beobachtet.
C. V. 11, T. 4	12	<i>Corrensiana</i>	<i>Aschersoniana</i> 20	
1231 (11)	2	"	" 20	
1233 (11)	—	"	" 20	7

Dazu als spontaner Bastard 1115, 1.

Wollen wir nun das Verhalten der Bastarde studieren, so müssen wir erst die Merkmale der Eltern einer kurzen Besprechung unterziehen. Alles Eingehende darüber habe ich 1909 (S. 249) mitgeteilt.

Die Merkmale der Unterarten *V. Aschersoniana*
und *V. Corrensiana*.

Die Unterschiede beziehen sich auf die folgenden Charaktere:

	<i>Aschersoniana</i>	<i>Corrensiana</i>
Blütenfärbung . . .	Heller blau als bei <i>Corrensiana</i> ; das Blau ist rötlicher. Unterer Kronenlappen meist weiß oder mit blaßblauem Hauch. Streifung auf dem unteren Kronenlappen fehlend oder schwach angedeutet. Die Streifen des oberen Lappens sind besonders an der Basis häufig gerötet.	Dunkelmarineblau. Unterer Kronenlappen gleich oder fast gleich dunkel wie die übrige Krone. Streifung auf dem unteren Kronenlappen ebenso deutlich hervortretend als auf den übrigen Kronenteilen. Die Streifung ist schärfer und deutlicher als bei <i>Aschersoniana</i> , sie ist auch auf dem oberen Kronenlappen zumeist blau.
Blütenform	Kronenzipfel mehr abgestumpft, breiteste Stellen des unteren Blattes nahe der Insertionsstelle.	Kronenzipfel mehr zugespitzt, breiteste Stelle des unteren Kronblattes in der Mitte.
Blütengröße im { Höhe } Jahre 1906 u. 08 { Breite }	M = 8 mm.	M = 9 bzw. 9,5 mm.
Kelchblätter	Von der Mitte aus langsam in die Spitze verschmälert.	Gleichförmig länglich, an der Spitze plötzlich zusammengezogen.
Blattform . . { Länge } { Breite }	M = 1,06 (breiter).	M = 1,17 (schmäler).
Blattrand	Zähne seichter, meist ohne Sekundärzähnen.	Zähne tiefer, häufig mit Sekundärzähnen.
Bereicherungssprosse der Unterachsen 2. Ordnung . . .	Spärlich.	Reichlich.
Anomalien a) Kelch	Häufig hochprozentig pentasepale Rassen.	Keine hochprozentig pentasepalen Rassen.
b) Krone	Rassen mit 2- und 3-blättrigen Kronen in höheren Prozentsätzen sind nicht gefunden worden. Dagegen sind sehr häufig Rassen, welche Verdoppelung des vorderen oder hinteren Kronblattes und somit 5-blättrige Kronen besitzen.	Es kommen häufig Rassen vor, welche 2- und 3-blättrige Kronen in höheren Prozentsätzen besitzen.

Es sei gleich hier erwähnt, daß alle diese Merkmale der fluktuierenden Variabilität in nicht unerheblichem Maße unterworfen sind; das hindert aber die scharfe Trennung der beiden Unterarten keineswegs.

Es konnten nun bei den Bastardierungsversuchen nicht alle Merkmale in Betracht gezogen werden. Zur sicheren Feststellung des Verhaltens der einzelnen Merkmale in den aufeinanderfolgenden Generationen bedarf es so zahlreicher Zählungen und Messungen, daß eine Beschränkung mit fortschreitender Verbreiterung der Kulturen immer mehr zum unbedingten Erfordernis wurde.

Es wurden zur Untersuchung herangezogen:

1. Blütengröße (bis zur F_3),
2. Blattgestalt (nur bis zur zweiten Generation),
3. Kelchanomalie (Pentasepalie) (bis zur F_3),
4. Blütenfärbung und Form (bis zur F_3).

Es sei nun zuerst ein kurzes Bild des Bastardes, also der F_1 entworfen. Darauf werden wir die einzelnen Merkmale in ihrem Verhalten durch die späteren Generationen getrennt verfolgen. Die spezialisierten Angaben über Eltern und Bastarde finden sich erst bei der Erörterung der Einzelmerkmale.

Die Bastardgeneration (F_1).

Zuerst sei erwähnt, daß ich keine Unterschiede zwischen den beiden reziproken Bastarden konstatieren konnte. Die Stellung beider war bezüglich der Mehrzahl der Merkmale annähernd intermediär, vielleicht etwas mehr nach *Corrensiana* neigend. So war die Färbung, wie die beigegebene Abbildung erkennen läßt, intermediär. Das Blau hatte im Bastard einen etwas rötlicheren Ton als bei *Corrensiana*, der aber nicht so extrem zu sein pflegte als bei *Aschersoniana*. Das untere Kronblatt war meist gefärbt, die Streifung etwas matter, als bei *Corrensiana*. Auch die Form war weder so zugespitzt, noch so stumpf als bei den beiden Eltern. Es muß natürlich gleich hier hervorgehoben werden, — ich werde später eingehender davon zu sprechen haben, — daß bei den beiden sich so nahe stehenden Unterarten große Übung und vor allem eine größere Individuenzahl dazugehört, um sich in diese Differenzen der Kreuzungsprodukte hineinzusehen. Beim Bastard selbst macht das aber noch durchaus keine Schwierigkeiten.

Wie Blütenfärbung und Form ist auch die Größe intermediär, wie aus den beigegebenen Zahlen unter Blütengröße klar hervorgeht. Ebenso

verhält sich die Blattform und die Ausbildung des Randes. (Vergleiche dazu die beigelegten Bilder auf S. 122 und 123 und die Zahlen für den Längenbreitenindex unter Blattgestalt.)

Ganz anders wie die bisher besprochenen Merkmale verhält sich die Kelchanomalie, die Pentasepalie. Es wurden zur Kreuzung verwandt: eine Rasse von *Corrensiana* mit ca. 0,5% pentasepalen Kelchen und eine Rasse der *Aschersoniana* mit ca. 70% pentasepalen Kelchen. Der Bastard zeigte nun ein völliges Dominieren des Merkmales der Pentasepalie, indem auch er ca. 70% pentasepale Kelche ausbildete. Besonders häufiges Auftreten von Zwischenbildungen zwischen Pentasepalie und Tetrasepalie war nicht zu beobachten. Es ergibt sich also schon hieraus, daß das Merkmal der Pentasepalie ein anderes Verhalten zeigt, als die übrigen untersuchten Merkmale. — Wir wenden uns nun sogleich zur Betrachtung der einzelnen Merkmale in den aufeinanderfolgenden Generationen.

1. Die Blütengröße.

Zu der Zeit, als ich meine Versuche über das Verhalten der Blütengröße meiner Unterarten nach Bastardierung begann, lagen auf botanischem Gebiete von bis zur dritten Generation durchgeführten Untersuchungen quantitativ differierender Merkmale erst diejenigen von TAMMES (1911) am Lein vor. Dieselben bedurften natürlich einmal eine Bestätigung an anderem Material, weiterhin aber auch eine Erweiterung und vor allem ein Versetzen auf breitere Basis. Sodann erschien es mir besonders interessant, einmal auch Organe zu untersuchen, welche sich in ihren Größenverhältnissen viel weniger unterschieden, als das bei den Leinsorten von TAMMES der Fall war. Unterdessen sind nun allerdings zahlreiche Untersuchungen über Bastardierung von Sippen mit quantitativ differierenden Merkmalen erschienen. Ich habe über dieselben in letzter Zeit eingehend im Sammelreferat in der Zeitschrift für Botanik berichtet (1914, S. 336), ich kann mich also an dieser Stelle darauf beschränken, auf sie nur insoweit zurückzukommen, als es gerade in bestimmter Richtung notwendig und erwünscht ist. Wir werden indessen sehen, daß unsere Blüten in ihrem Größenverhalten nach Bastardierung eigene Verhältnisse aufweisen.

Von vornherein wären vielleicht gegen die Bastardierung gerade dieser Blütenformen einige Bedenken zu erheben gewesen. Es sind das Bedenken verschiedener Art, die hier kurz zur Erörterung kommen

sollen, zumal sie unter anderen Gesichtspunkten des Interesses nicht entbehren.

An sich schon sind die Differenzen der Größe beider Blütensorten sehr gering, dann aber variieren sie zudem noch transgredierend. Weiter ist zu bedenken, daß die in so geringen Grenzen unterschiedene Blütengröße durch äußere Bedingungen in weitem Umfange Schwankungen unterworfen ist. Diesen letzten Nachteil erwähnte ich schon 1909, S. 150. Die Blüten bleiben nämlich bei sehr geringer Lichtintensität lange Zeit geschlossen und sehr klein, wie schon VÖCHTING (1893, S. 173) festgestellt hat. Stellt man die Pflanzen etwa in den Schatten von Bäumen, so werden die Blüten innerhalb weniger Tage deutlich kleiner. Ja ein Versetzen der Pflanzen in den gazebespannten Isolierkasten hat, wie ich schon erwähnte, oftmals eine so stark hemmende, dauernde Wirkung auf die Blütengröße, daß auch die nach dem Wiederherausnehmen aus dem Isolierkasten neu aufblühenden Blüten kleiner sind und zu Messungen nicht mehr benützt werden können. Man muß also die Isolation stets nach der Messung aller benötigten Blüten einer Pflanze vornehmen. Auch darf man vorher die Pflanzen nicht vorübergehend für einige Tage zu Beobachtungen etwa ins Laboratorium versetzen, da dadurch die Blütengröße erheblich herabgesetzt wird. Zudem müssen stets alle Töpfe nebeneinander an der Sonne völlig ausgesetztem Platze aufgestellt werden. Berücksichtigt man aber all dies — und das ist nicht schwer — so sind von der Beeinflussung durch äußere Faktoren sonst keine Störungen zu befürchten.

Indessen auch feuchte Witterung wirkt auf die Blütengröße wohl in Verbindung mit der Belichtung in ganz bestimmter Richtung modifizierend ein. Während nämlich an trocknen, hellen — wenn auch nicht direkt sonnigen Tagen — die Blüten je nach Temperatur und Lichtintensität 2, 3, 5 auch 6 Stunden nach dem morgendlichen Öffnen abgestoßen werden (vgl. 1909, S. 150), bleiben die Blüten an trüben, regnerischen Tagen teilweise im geschlossenen Zustande bis zu einem zweiten Tage sitzen und, was besonders bemerkenswert ist, wachsen während dieser ganzen Zeit noch weiter, so daß sie ziemlich erheblich größer werden als die sogleich am ersten Tage abgestoßenen. Das wird durch das Folgende noch besonders auffällig. Während im regelmäßigen Verlauf mit wenigen Ausnahmen an jeder Achse pro Tag höchstens eine Blüte erblüht, stehen dann an einem auf einen regnerischen Tag folgenden sonnigen Tage sehr häufig zwei geöffnete Blüten an einer Achse hintereinander. Die beiden Blüten haben dann erheblich ver-

schiedene Größe, ungefähr 1—4 mm zugunsten der Blüte vom vorhergehenden Tag. Die folgenden Zahlen mögen das beweisen:

Aufeinanderfolgende Blüten an derselben Achse nach
einem Regentag.

K. V.	Unterart	1. Blüte	2. Blüte
1228	<i>Aschersoniana</i> . . .	11,5	10
		12,5	10,5
		12,5	10,5
		10,5	9
		11,5	10
		10,5	9
		11,5	10
		11,5	10,5
		11	10
1232	<i>Corrensiana</i>	12	11,5
		13	11,5
		12,5	12
		13	12,5
		13	11,5
		15	12
		12,5	11,5
		13	12
		13	12
1227	Bastard	11,5	10
		12,5	10
		13	11,5
		13	11,5
		13	12
		12	10
		12	11
		12	10
		12	10,5
		13	11,5

Aber auch die von dieser Seite zu befürchtenden Störungen des Resultates ließen sich, als die Tatsache einmal erkannt war, leicht beheben. Man hat nämlich nur nötig, nach einem oder mehreren Regentagen keine Messungen vorzunehmen, was sich während der Regentage selbst schon durch das Geschlossenbleiben der Blüten verbietet. In

dringenden Fällen kann man von dieser Regel aber auch deswegen manchmal abweichen, da man die nachgewachsenen, übermäßig großen Blüten an ihrer Stellung unter der zweiten kleineren erblühten Blüte und dann vor allem an ihrer viel matteren, ausgebleichten Färbung fast durchgängig erkennt. Man mißt sie dann nicht mit.

Die eben erörterte Tatsache, daß Blüten ganz entgegen der sonstigen bei diesen Pflanzen obwaltenden Regel unter ungünstigen äußeren Verhältnissen zeitweise länger an der Pflanze sitzen bleiben, wird aber noch viel auffallender während der Wintermonate. *V. Tournefortii* gehört, wie ja längst bekannt (vgl. 1909, S. 180), zu den Pflanzen, welche während des Winters, ganz besonders während milder Winter, ihre Blüten im Freien entwickeln und entfalten. Der Winter 1911 und 1912 war nun ein außergewöhnlich milder Winter. Die Folge davon war, daß *V. Tournefortii* fast dauernd ihre Blüten öffnete. Selbstverständlich habe ich diese Gelegenheit benützt und meine Versuchspflanzen, zu denen ich die Aussaaten in Tübingen machte, den ganzen Winter über im Freien beobachtet. Messungen und Zählungen wurden vom November ab, als die ersten Blüten sich zu öffnen begannen, bis zum Frühjahr fast ununterbrochen ausgeführt. Wenn ich nun die damals erhaltenen Blütengrößendurchschnitte mit denjenigen vergleiche, welche ich vorher im Sommer in Ventnor oder auch noch früher an verschiedenen Stellen, später in Tübingen beobachtete, so zeigt sich, daß die Winterblüten durchschnittlich viel größer waren, als die Sommerblüten. Es geht das klar aus der folgenden Tabelle hervor.

Durchschnittliche Blütenbreite.

	Sommer 1906	Sommer 1908	Sommer 1911	Winter 1911/12	Frühjahr 1912	Sommer 1912
<i>Corrensiana</i> . .	9,28	9,27	11,1	14,02	11,82	11,0
<i>Aschersoniana</i> .	—	7,91	9,7	11,0	10,14	9,41/
Bastard . . .	—	—	—	12,56	11,23	10,34

Diese Tabelle weist auch im Frühjahr noch größere Blüten auf als im Sommer. Die Erklärung ist nach dem vorhergehenden gar nicht schwer zu geben. Im Winter kommt einmal der oben erörterte Faktor in Frage. Es sind häufig Regentage zwischen die sonnigen Tage eingeschoben. Dann bleiben die Blüten entweder ganz klein, sie entwickeln sich gar nicht — wenn ihnen die genügende Lichtintensität nicht geboten

ist. Oder aber die Lichtintensität genügt zur Entwicklung, dann bleiben die Blüten gerade wie im Sommer ein oder sogar mehrere Tage im entfalteten Zustand an der Pflanze, wachsen noch weiter heran und geben so erheblich größere Blüten, als sie zustande gekommen wären, wenn sie gleich am ersten Tage abgefallen wären. Im Winter kommt aber noch ein zweiter Faktor hinzu. Die niedere Temperatur bewirkt ebenfalls, daß die Blüten erheblich länger an der Pflanze vor der Eröffnung verbleiben. Man kann Blüten im Winter häufig eine Woche lang und länger an der Pflanze im uneröffneten Zustande sitzen sehen, ohne daß sie abfallen. Während dieser Zeit wachsen sie weiter heran und führen schließlich zu so großen, bis 17 mm breiten Blüten, wie sie in dem angeführten Winterversuch zustande kamen. Unserer Versuchsanstellung hat diese bemerkenswerte Reaktion auf die äußeren Verhältnisse aber gar nichts geschadet. Die winterlichen Einflüsse wirkten auf die nebeneinander erzogenen Versuchspflanzen der Eltern sowie des Bastardes ganz gleichsinnig und verschoben nur den Mittelwert nach oben¹⁾. Wir werden allerdings eines anderen Einflusses alsbald noch zu gedenken haben.

Die obige kleine Tabelle lehrt aber nicht nur, daß der Einfluß des Winters die Blütengröße verändert. Auch jedes Jahr bringt verschieden große Blüten hervor. Es wird also unbedingt notwendig, wie ja in so vielen anderen Fällen auch, die Elternarten in jedem Jahre neben dem Bastard oder den späteren Nachkommenschaftsgenerationen zu erziehen, wenn anders Vergleichswerte erhalten werden sollen.

Viel größere Bedeutung für das Versuchsergebnis mußte aber eine andere Erfahrung haben, welche ich im Laufe des ersten Versuchsjahres machte. Die Blüten sind — jedenfalls unter den gebotenen Kulturbedingungen — während der Entwicklung der Pflanzen nicht gleich groß. Sie sind vielmehr zu Anfang der Entwicklung größer als später. Ich habe ursprünglich immer 100 Blüten jeder Pflanze gemessen. Es zeigte sich aber, daß schon innerhalb der ersten 100 gemessenen Blüten ein Abfall in der Größe zu konstatieren war, welcher als bedeutsam zu bezeichnen ist. Die folgenden Zahlen geben hiervon eine Vorstellung.

¹⁾ Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch größere Blüten von Gebirgspflanzen hier und da demselben Einfluß zu danken sind.

Mittelwerte von 16 Pflanzen des K. V.
1301 und 1302.

A. Für die ersten 100 Blüten	B. Für die ersten 50 Blüten
10,69	11,19
10,38	11,06
10,6	11,26
11,24	11,53
10,4	11
10,36	10,8
10,06	11,46
11,5	11,71
11,5	12
10,68	11,1
9,81	10,3
11,07	11,53
10,1	10,7
10,3	10,92
10,76	10,82
10,26	10,62

Die angeführten Zahlen für 16 beliebige, unausgewählte Pflanzen von K. V. 1301 und 1302 zeigen klar, daß der Mittelwert für die ersten 50 Blüten allein stets erheblich größer ist, als für die ersten 100 gemessenen Blüten zusammen. Es wäre ja nun an sich ebenso gut möglich gewesen, die ersten 100 Blüten stets zum Vergleich heranziehen, als die ersten 50 — denn daß man sich auf eine bestimmte Anzahl beschränken mußte, das geht aus der obigen Tabelle klar hervor. Ich habe auch, wie gesagt, zuerst in sehr vielen Fällen 100 Blüten gemessen. Das anwachsende Material ließ es aber bald nicht mehr angängig sein, genügend Pflanzen zu den Messungen heranzuziehen und so beschränkte ich mich dann später auf 50 Messungen. Es wurden natürlich auch von den Pflanzen, bei welchen 100 Blüten gemessen wurden, zu den Vergleichen immer nur die ersten 50 herangezogen. Es wird sich aus den Versuchsdaten ergeben, daß 50 Blüten auch durchaus genügen. Ja, es ist sogar besser, nur 50 Blüten zu benützen. Denn später treten Beispresse und Achsen sehr hoher Ordnung mit kleineren Blüten bei verschiedenen Individuen in ungleichem Maße hinzu, was die Vergleichbarkeit der Resultate nur herabsetzt. Ich habe dabei den allergrößten Wert darauf gelegt, möglichst wenige Blüten auszulassen, was sich nur während der Zeit der allergrößten Arbeit manchmal nicht ganz durchführen ließ.

größen.
reihe 1.

14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	Mittelwert in mm	Standard- abweichung σ in mm	Variabilitäts- koeffizient v	Zahl der gemessenen Blüten
								$11,02 \pm 0,034$	$0,992 \pm 0,025$	$9,00 \pm 0,22$	807
139	127	69	49	19	4	1	1	$14,02 \pm 0,056$	$1,153 \pm 0,026$	$8,22 \pm 0,18$	998
17	15							$12,56 \pm 0,030$	$0,940 \pm 0,022$	$7,48 \pm 0,17$	956
								$10,25 \pm 0,055$	$0,853 \pm 0,039$	$8,32 \pm 0,38$	244
								$10,47 \pm 0,025$	$0,849 \pm 0,018$	$8,19 \pm 0,17$	1150
								$10,37 \pm 0,062$	$0,880 \pm 0,04$	$8,49 \pm 0,42$	200
								$10,22 \pm 0,048$	$0,839 \pm 0,034$	$8,21 \pm 0,34$	299
								$10,65 \pm 0,024$	$0,834 \pm 0,017$	$7,82 \pm 0,16$	1240
								$9,41 \pm 0,060$	$0,915 \pm 0,042$	$9,73 \pm 0,45$	233
								$11,00 \pm 0,103$	$0,780 \pm 0,08$	—	52
							10,23	$10,53 \pm 0,032$	$0,871 \pm 0,023$	$8,27 \pm 0,21$	745
							11,14	$11,45 \pm 0,029$	$0,921 \pm 0,021$	$8,04 \pm 0,18$	999
							10,79	$11,11 \pm 0,030$	$0,924 \pm 0,021$	$8,32 \pm 0,19$	950
							10,74	$11,05 \pm 0,034$	$0,868 \pm 0,024$	$7,86 \pm 0,22$	649
							9,84	$10,15 \pm 0,040$	$0,750 \pm 0,028$	$7,39 \pm 0,28$	346
1							11,31	$11,63 \pm 0,025$	$0,860 \pm 0,017$	$7,39 \pm 0,15$	1210
								$11,67 \pm 0,072$	$0,993 \pm 0,051$	$8,51 \pm 0,44$	191
								$9,15 \pm 0,090$	$0,840 \pm 0,063$	$9,18 \pm 0,69$	88

reihe 2.

								$10,14 \pm 0,030$	$0,758 \pm 0,021$	$7,47 \pm 0,21$	652
4	3							$11,82 \pm 0,028$	$0,798 \pm 0,020$	$6,75 \pm 0,17$	795
								$11,22 \pm 0,022$	$0,733 \pm 0,16$	$6,53 \pm 0,14$	1085
								11,19	—	—	61
								11,34	—	—	150
								$10,60 \pm 0,006$	$0,788 \pm 0,004$	$7,43 \pm 0,04$	15926
								$11,67 \pm 0,072$	$0,993 \pm 0,051$	$8,42 \pm 0,44$	191
								$9,15 \pm 0,090$	$0,840 \pm 0,063$	$9,18 \pm 0,69$	88

Die eben mitgeteilten Schwierigkeiten wurden erst nach und nach erkannt. Ich habe aber von vornherein darauf gehalten, die Blüten der Aufblühfolge nach festgelegt in meine Journale einzutragen. Infolgedessen war es sehr einfach, nachträglich auch für solche Fälle immer noch das Brauchbare von dem nicht Brauchbaren zu scheiden. Natürlich mußten aber gerade infolge dieser Schwierigkeiten nachträglich sehr viele Beobachtungen ausgeschieden werden. Ich bin hierbei sehr streng zu Werke gegangen und habe Messungen, welche aus dem oder jenem technischen Grunde zu beanstanden waren, ausgeschieden. So liegt aber nun ein durchaus einheitliches Material vor, welches die Basis für die Ergebnisse bildet.

Die Versuche.

Es handelt sich hauptsächlich um zwei Versuchsreihen. Beide gehen zurück auf das Bastardmaterial des Sommers 1911. Die erste Versuchsreihe leitet sich von C. V. 20 T. 16 her. Es handelt sich also um zwei verschiedene Blüten ein und derselben *Aschersoniana*-Pflanze, welche mit *Corrensiana*-Pollen bestäubt wurde. Die zweite Versuchsreihe geht auf eine andere Pflanze desselben C. V. zurück, auf T. 15, ebenfalls *Aschersoniana* mit Pollen von *Corrensiana* bestäubt.

Die erste Versuchsreihe ist heute bis F_3 verfolgt. In ihr liegt der Hauptnachdruck auf dem Verhalten der einzelnen F_3 -Familien, von denen zumeist gegen 1000 oder mehr Blüten gemessen wurden.

Die zweite Versuchsreihe geht erst bis zur F_2 , die ich aber in großem Umfange zur Blütenmessung benützen konnte. Es wurden hier an 318 Pflanzen je 50 (in einigen wenigen Fällen 48—49 Blüten) gemessen, im ganzen 15926 Blüten.

Wir gehen nun zur Betrachtung der Tabelle (S. 110 und 111) über, die auf insgesamt 31000 gemessenen Blüten beruht. Wir sehen ohne weiteres aus allen Angaben, daß *Corrensiana* erheblich größere Blüten besitzt als *Aschersoniana*. Die Mittelwerte 11,02 und 14,02 im Winter 1911/12 zeigen das ebenso wie die Mittelwerte in den späteren Jahren. Darauf wurde ja schon früher eingegangen. Aus der Tabelle geht nur die starke transgressive Variabilität hervor, welche den beiden Formen zukommt. Die erste Generation ergibt sowohl in der ersten als in der zweiten Versuchsreihe einen sehr guten Mittelwert. Die theoretisch berechneten Werte lassen die gute Übereinstimmung erkennen. Auch in der F_2 liegen die Mittelwerte deutlich zwischen denjenigen

beider Eltern. Leider lassen sich dieselben aber wegen des in zu geringem Maße erzeugten reinen Elternmaterials in den beiden Jahren nicht theoretisch berechnen. Es spielt das aber für die Ergebnisse keine irgendwie bemerkenswerte Rolle. Eine graphische Darstellung der Verhältnisse dieses Versuches gibt Textfig. 1.

Auf die Mittelwerte der dritten Generation wird später einzugehen sein. Vorerst sei zur Betrachtung der Standardabweichungen und der Variabilitätskoeffizienten übergegangen. Wir beginnen hier aus verschiedenen später zu erörternden Gründen mit der zweiten Versuchsreihe.

Fig. 1. Blütengrößen von P_1 , F_1 , F_2 .

Die Streuungswerte und Variabilitätskoeffizienten.

Die Eltern-Generationen, also die P_1 , zeigen die Streuungen 0,758 mm und 0,798 mm. Die F_1 ergibt (1227) die Streuung 0,733 mm. Die durchaus wichtige Frage ist aber nun, wie verhält sich die Streuung in der F_2 . Gehen wir von der Annahme aus, die seit NILSSON-EHLES Theorie der gleichsinnig polygenen Merkmale von EAST, EMERSON, TAMMES u. v. a. (vgl. mein Sammelref. in Zeitschrift für Botanik 1914) ziemlich allgemein gemacht wird, daß das Merkmal der Blütengröße auch in unserem Falle auf mehreren gleichsinnigen unabhängig spaltenden

Erbeinheiten beruht, so ist, wie besonders ursprünglich von CASTLE, dann aber von allen Gefolgsleuten hervorgehoben wurde, für die F_2 eine viel größere Streuung zu erwarten als für die P_1 und F_1 . Diese Erwartung ist ja auch, wie aus vielen Abhandlungen sicher hervorgeht, in einer ganzen Reihe von Fällen eingetroffen. Ich erinnere aus neuester Zeit vor allem an die schönen Untersuchungen von HOWARD, bei denen allerdings die Berechnung der Streuungswerte fehlt. Jedermann kann sie sich aber leicht nachrechnen und dann das bestätigt finden, was ja auch schon aus so vielen früheren Untersuchungen hervorgeht. Es war aber immer die Frage, ob sich das alles auch immer und in allen einzelnen Fällen so verhält. Ich hatte bei Beginn meiner Untersuchungen natürlich nicht den geringsten Anlaß, gerade für mein Objekt daran zu zweifeln. Das wurde schon anders nach Erledigung der ersten Versuchsreihe bis in die F_2 . Da dieselbe aber aus verschiedenen Gründen nicht genügend brauchbar zum endgültigen Schlusse erschien, da auch das Zahlenmaterial doch noch zu gering war, wurde die zweite Versuchsreihe angestellt, welche dann auf so umfangreichem Zahlenmaterial aufgebaut wurde, daß in ihr Resultat kein Zweifel mehr zu setzen ist¹⁾. Hier in dieser Versuchsreihe ergibt sich nämlich, daß die Streuung in der F_2 keineswegs größer ist als in P_1 und F_1 , sondern daß sie ungefähr die gleiche Größe hat. Schon das Kurvenbild verdeutlicht das einigermaßen, wenn wir es beispielsweise vergleichen mit den Kurven, die WICHLER für seine P_1 , F_1 und F_2 gibt (Fig. 8—9, S. 184). Die erste Frage war nun natürlich die, was sind daraus für Schlüsse zu ziehen und vor allem, wie weit ist es überhaupt erlaubt, daraus Schlüsse zu ziehen. Bei der geringen Größendifferenz war hauptsächlich festzustellen, wieviel größer die Streuung in der F_2 überhaupt theoretisch hätte sein müssen nach Zugrundelegung der Streuung in den beiden F_1 . Das ist nicht schwer auszurechnen nach der Formel:

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2},$$

wobei σ_S die Summe aus den σ von beiden P_1 (1228 [x] und 1232 [y]) darstellt. Nach dieser Formel wäre σ_S 1,10, also ganz erheblich viel größer als die Streuungen der Eltern, eine Streuung, welche viel größer

¹⁾ Die Versuchsreihe, welche der Übereinstimmung mit den anderen zuliebe in Fünferklassen eingeteilt wurde, erscheint etwas schief. Es ist das aber nur eine scheinbare Schiefe (vgl. JOHANNSEN, II. Aufl., S. 229), welche darauf beruht, daß der Mittelwert nicht in der Mitte 10,5—11 liegt, sondern an der Grenze (vgl. die Einteilung in Dreierklassen der Einzelindividuen).

ist als sämtliche jemals in den Versuchen erhaltenen Streuungen mit Ausnahme des Versuchs 1111 vom Winter 1911/12, auf die wir dann noch eingehen werden, die aber auf ganz und gar andere Ursachen zurückzuführen ist, welche mit unserem jetzigen Resultat nicht die geringste Beziehung haben. Der Versuch 1338 des Jahres 1913 zeigt nun aber, wie aus der Tabelle leicht zu ersehen ist, im ganzen einen etwas geringeren Mittelwert der Blütengröße als die P_1 . Dieser Faktor mußte noch eliminiert werden. Das ließ sich leicht durch Vergleichung der Variabilitätskoeffizienten erreichen, wieder nach der einfachen Formel:

$$v_s = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Wir kommen auch hierbei zu dem Ergebnis, daß die Koeffizienten von P_1 und F_2 fast durchweg übereinstimmen und nicht erheblich abweichen, wie nach der Theorie zu erwarten gewesen wäre. Zusammengestellt ergibt sich folgendes:

	Streuung (s)		Variabilitätskoeffizient (v)	
	gefunden	berechnet	gefunden	berechnet
1228 (P_1)	0,758	—	7,47	—
1232 (P_1)	0,798	—	6,75	—
1227 (F_1)	0,733	—	6,53	—
1338 (F_2)	0,788	1,10	7,43	10,065

Unsere Ergebnisse berechtigen uns also zu der Annahme, daß hier andere Vorgänge im Spiele sind, als wie sie bisher in so vielen Parallelfällen aufgedeckt wurden. Weder Streuung noch Variabilitätskoeffizient erleidet die geringste Erhöhung in F_2 . Wir werden demnach hier nicht mehr mit gleichsinnig unabhängig spaltenden polygenen Merkmalen rechnen können. Da das Material sehr umfangreich ist, die Versuchsbedingungen so gleichmäßig als irgend möglich gehalten wurden, so lege ich auf dieses Resultat ganz besonderen Nachdruck. Wir werden zudem bald sehen, daß auch unsere weiteren Ergebnisse mit dieser Schlußfolgerung durchaus in gutes Einvernehmen zu bringen sind. Es bleibt nun aber noch die erste Versuchsreihe auf die eben besprochenen Verhältnisse zu betrachten.

Da fällt unseren bisherigen P_1 gegenüber in der P_1 dieser Versuchsreihe eine ungeheuer große Streuung in die Augen, so groß, wie sie nie wieder erzielt wurde. Bei einer oberflächlichen Beachtung dieser großen Streuung könnte man vielleicht an unserem bisherigen Ergebnis

irre werden. Ich wies aber eben schon darauf hin, daß es sich hier um ganz etwas anderes handelt. Woher kommt diese große Streuung? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten, wenn wir uns daran erinnern, daß diese Versuche den Winter über ausgeführt wurden und diese Winterkultur zu dem oben besprochenen ganz besonderen Erfolg führte, daß nämlich die Blüten nach kalten Tagen längere Zeit heranwachsen und erheblich größer werden, als das bei Abfall am Tage des Erblühens der Fall ist (vgl. S. 108). Man sieht bei Vergleichung des Winterversuchs mit den Variationsreihen, welche im Sommer z. B. für *V. Corrensiana* — bei welcher diese Erscheinung relativ noch mehr hervortritt als bei *Aschersoniana* — aufgestellt wurden, daß nur durch diese größeren Blüten die erhöhte Streuung hervorgerufen sein kann, da auch in diesen Reihen kleinere Blüten als bei 1111 nur in ganz geringer Zahl auftraten. Wir haben also in der so stark vergrößerten Streuung des Winterversuchs eine direkte Folge der abnormen Versuchsbedingungen zu sehen. Das erweist sich vorzüglich auch nach der Vergleichung der Variabilitätskoeffizienten als zutreffend. Vergleichen wir nämlich die Variabilitätskoeffizienten der aufeinanderfolgenden Generationen, so zeigt sich, daß auch in dieser Versuchsreihe das Maß der Variabilität abstrahiert von den Jahreseinflüssen in den einzelnen vorzüglich übereinstimmenden F_2 -Familien nicht größer ist als in den beiden P_1 und durchschnittlich kaum größer als in der F_1 . Es steht also diese an viel kleinerem Material ermittelte Versuchsreihe nicht im geringsten im Widerspruch mit der eben besprochenen zweiten Versuchsreihe. Sie bestätigt die dort erzielten Ergebnisse im Gegenteil durchaus. Dabei ist immer zu bedenken, daß etwa durch Auswahl hervorgerufene Abweichung der Streuung dieselbe in F_2 hätte sicher noch vergrößern müssen, da in diesem Jahre besonders auf stark abweichende Individuen gefahndet wurde.

Es erhebt sich aber nun nach Erörterung der allgemeinen Variabilitätsverhältnisse und Betrachtung von Streuung und Variabilitätskoeffizient die Frage, welcherlei Einzelwerte die Familien der F_2 ergeben und wie sich diese in der F_3 verhalten.

Einzelne Familien von F_2 und F_3 .

Es sind im Jahre 1912 fünf F_2 -Familien erzogen worden (1201, 1202, 1203, 1204, 1206), im Jahre 1913 eine F_2 -Familie (1338). Die Mittelwerte und Streuungen der F_2 -Familien vom Jahre 1912 stimmen, wie eben schon kurz berührt wurde, in hohem Maße überein. Es ist das wohl sicher der beste Beweis für die Brauchbarkeit und Zuverlässig-

keit meiner Resultate. In den einzelnen F_2 -Individuen traten aber nun 1912 wie 1913 recht erhebliche Differenzen der durchschnittlichen Blütengröße hervor. Diese Tatsache ist durchaus nicht neuartig. Sie ist ja fast in allen Fällen nach Bastardierung quantitativ differierender Merkmale beobachtet worden. Sie wird nur in unserem Falle gerade besonders bemerkenswert im Zusammenhange mit der geringen Streuung in der F_2 .

Die folgenden Tabellen (S. 118) geben die Zahlenwerte für beide Jahrgänge an. Sie führen zu recht regelmäßigen Variationsreihen, wenn man die Einzelmessungen in Gruppen zu drei zusammenfaßt.

Nach den angeführten Zahlenwerten und nach dem Kurvenbild ist es klar, daß sich hier, gerade wie in den bisher von anderen Autoren untersuchten Beispielen, die einzelnen Individuen der F_2 in ihrer Blütengröße um einen Mittelwert besonderer Häufigkeit gruppieren. Wir haben also auch keine Veranlassung, etwa von der Annahme der Vermischung der Gene bei der Keimzellbildung in der F_1 abzugehen. Da aber die Variabilitätsgröße oder Streuung, wie wir soeben sahen, in der F_2 nicht gleichfalls erhöht ist wie in den von anderen Seiten untersuchten Fällen, so müssen wir in unserem Falle ein abweichendes Verhalten der Gene bei der Gametentrennung zum Zwecke der F_2 -Bildung annehmen. Ich werde später hierauf noch zurückkommen.

Werfen wir aber nun einen Blick auf die F_3 -Familien. Diese F_3 -Familien sind bisher noch nicht in sehr großer Zahl für die Blütenmessungen erzogen worden, doch sind die Individuenzahlen innerhalb einer jeden Familie, vielleicht mit Ausnahme von 1315, sicher ausreichend. Die zumeist auf die Vormittagsstunden beschränkte Messungszeit je nach der Witterung zwischen $\frac{1}{2}$ 9 und 1 Uhr, in seltenen Fällen bis 2 oder 3 Uhr, machte es, trotzdem die Messungen durch den ganzen Sommer 1913 fast an jedem günstigen Tage die ganze eben angeführte Zeit hindurch ausgeführt wurden, unmöglich, bisher schon mehr F_3 -Familien zu untersuchen.

Wollten wir die Blütengröße der F_3 -Familien direkt mit derjenigen der F_2 -Blütengröße vergleichen, so würden wir vor allem bemerken, daß die F_3 -Familien durchweg größere Blüten besitzen als die entsprechenden F_2 -Pflanzen. Diese Differenz in der Gesamtgröße ist auf die Jahreseinflüsse zurückzuführen. Sehen wir aber von diesen ab, so erhalten wir recht auffallende Übereinstimmung in der Blütengröße der F_2 -Elternpflanzen und der F_3 -Familien. Um die Jahreswitterung auszuschließen, habe ich den Größendurchschnitt der F_2 -Elternpflanzen und

Die Mittelwerte der Blütengröße für die F₂-Pflanzen 1912 (1201, 1202, 1203, 1206).

9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5
1	1	1	2	2	3	1	6	2	4	3	6	4	1	3	5			1		1
2				7				9				13				8				2

Die Mittelwerte der Blütengrößen für die F₂-Pflanzen von 1913 (1338).

9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9					
1	1	1	2	3	2	8	8	22	25	25	23	21	32	28	31	25	19	13	9	11	6	6	3	1	1	1						
1				7				38				73				81				75				33				15				2

denjenigen der F_3 -Familien ausgerechnet und dann den Durchschnittswert der Blütengröße jeder F_3 -Familie um den Betrag gekürzt, um welchen die F_3 -Pflanzen durchschnittlich größer befunden waren als die F_2 -Pflanzen. Die so gewonnenen Zahlen ergeben in drei Fällen fast völlige Gleichheit der F_3 -Familien mit den F_2 -Elternpflanzen (1302, 1315, 1318), 1304 kommt der Elternpflanze sehr nahe, in den beiden anderen Fällen sind etwas erheblichere Abweichungen vorhanden. Die ersten vier Fälle zeigen überzeugend, daß die in F_2 zustande gekommenen Kombinationen in der Größe, trotz minimaler Differenzen, streng auf die Nachkommenschaft vererbt werden. Bei den beiden anderen Familien bleibt es fraglich, ob wir die geringen Abweichungen auf Spalten zurückführen sollen, wie es in allen bisher untersuchten Fällen getan wurde, oder ob wir diese Abweichungen vielleicht durch fluktuierende Variabilität der F_2 -Pflanzen erklären können. Zur Lösung dieser Frage wird es notwendig werden, noch eine größere Anzahl F_2 -Pflanzen auf ihre Nachkommenschaft in gesonderten F_3 -Familien zu untersuchen. Bei den minimalen Differenzen ist größte Vorsicht geboten. Immerhin ist die große Übereinstimmung der Werte schon in diesen Fällen doch recht auffallend¹⁾. Die Sache gewinnt den bisherigen Untersuchungen gegenüber aber dadurch noch an Bedeutung, daß die Streuung mit Ausnahme des Falles 1315, wo kein sehr großes Material vorliegt, nur in sehr geringem Maße schwankt, was bei unabhängigem Aufspalten der Gene in F_2 sicher nicht der Fall sein dürfte. Ich möchte aber diesen letztgenannten Tatsachen vorläufig noch keinen abschließenden Wert beilegen, ehe in F_3 nicht noch zahlreichere Familien untersucht sein werden. Die Konstanz der Blütengröße in einigen Fällen nach Aufspaltung in F_2 bleibt davon natürlich vollkommen unberührt. Die Bedeutung dieser Feststellung wird aber nach Darlegung der Vererbungsverhältnisse der Blütengestalt und Färbung an Wert gewinnen.

Anschließend an diese in streng beobachteten Kulturen erzeugten Pflanzen möchte ich noch kurz die Größenverhältnisse der Blüte eines in meinen Kulturen spontan entstandenen Bastards erwähnen. Die Pflanzen des Versuchs 1115,1 erwiesen sich durchaus schon bei bloßer Betrachtung als intermediäre Bastarde. Die Messung der Blütengröße ergab dasselbe. Die Blütengröße wurde auf 11,4 festgestellt. Das ist etwas zu groß, als nach der Größe der Eltern zu erwarten war (11,82

¹⁾ Soviel aus den seither ausgeführten Messungen im Sommer 1914 an einzelnen F_3 -Familien hervorgeht, halten auch diese die Größenmaße der F_2 -Eltern gut inne.

und 10,14). Die Erklärung liegt aber sehr einfach darin, daß von den einzelnen Pflanzen immer nur ungefähr die ersten 10—20 Blüten gemessen wurden. Dieselben sind aber, wie oben schon festgestellt wurde, immer größer als die späteren, so daß bei Messung auch dieser sicher die streng intermediäre Stellung ermittelt worden wäre.

Blätter.

Ich habe oben die Unterschiede in Blattform und Größe von *V. Corrensiana* und *Aschersoniana* beschrieben. Es ist nötig, das Wichtigste davon hier noch einmal hervorzuheben.

Die Blätter von *Corrensiana* sind im Durchschnitt länglicher, die von *Aschersoniana* breiter. Der Blattrand zeigt bei *Corrensiana* ganz besonders häufig ein Auftreten von kleinen, auf den Hauptzähnen sitzenden Sekundärzähnen, die *Aschersoniana* meist fehlen. Ich hatte aber auch schon darauf hingewiesen, daß zur vergleichenden Betrachtung der Blätter beider Unterarten stets nur Blätter des durchaus entsprechenden Sitzes an der Pflanze heranzuziehen seien, da die Blätter von unten nach oben an der Pflanze in starker, aber streng regelmäßiger Weise variieren. Die untersten Blätter sind breiter, der Blattrand ist einfacher als bei den mittleren und oberen Blättern. Schon in meiner Untersuchung 1909 wurden aus diesem Grunde nur die entsprechenden Blätter zum Vergleiche herausgewählt. Die damals mitgeteilten Zahlen wurden so gewonnen, daß die Länge und Breite des 1., 2., 3. usw. Blattes der Hauptachse, der 1., 2., 3. usw. Achse 2. Ordnung der einen Subspezies gemessen und mit den entsprechenden Werten der anderen Subspezies nach Berechnung des Längenbreitenindex verglichen wurden. Bei nicht sehr zahlreichen Messungen ergab sich das Folgende:

Blatt . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	M.
<i>Aschersoniana</i>	0,88	0,88	0,92	1,00	1,19	1,15	1,15	1,20	1,12	1,07	1,06 mm
<i>Corrensiana</i> .	1,03	1,11	1,14	1,22	1,19	1,14	1,44	1,25	1,20	1,10	1,17 „

Die Tabelle zeigt deutlich, daß die Blätter der *Corrensiana* länger sind, als diejenigen der *Aschersoniana*; zugleich ist aus ihr zu erkennen, daß die Blätter von unten nach oben über die Pflanze länglicher werden. Es war nun die Frage, wie ist das Verhalten bei der Bastardierung.

Ehe ich auf die Betrachtung dieser Verhältnisse eingehe, sei das Folgende vorausgeschickt. Es hat sich während der Ausführung der

Längenbreitenverhältnis der Blätter (Mittelwerte von je 13 Pflanzen)
in mm.

Bezeichnung	Gen.	Art	Achse 1. Ordnung					Achse 2. Ordnung				Summe
			Blatt 3	4	5	6	7	Blatt 2	3	4	5	
1120	P ₁	<i>Aschers.</i>	—	—	—	—	—	0,82	0,95	—	—	—
1111	P ₁	<i>Correns.</i>	—	—	—	—	—	0,99	1,11	—	—	—
1120 × 1111	F ₁	Bastard	1,06	1,11	1,10	1,14	1,14	0,90	1,04	0,99	—	—
1228	P ₁	<i>Aschers.</i>	0,79	0,88	0,93	0,98	0,98	0,77	0,93	0,94	1,05	0,92
1232	P ₁	<i>Correns.</i>	0,98	0,97	1,03	1,08	1,14	0,87	0,95	1,09	1,13	1,03
1227	F ₁	<i>Aschers.</i> ♀ × <i>Corr.</i> ♂	0,91	0,94	0,99	1,1	1,11	0,83	1,03	1,05	1,17	1,01
1233	F ₁	<i>Corr.</i> ♀ × <i>Aschers.</i> ♂	0,93	0,99	1,01	1,12	1,13	0,85	0,95	1,04	1,13	1,02
1202, 1203, 1206 (M. von Blatt 2—5 1. Achse 2. Ordnung)	F ₂	Summe =	0,85—0,90	0,91—0,95	0,96—1,00	1,01—1,05	1,06—1,10	1,11—1,15				
			1	2	7	9	5	5				

(ohne die extremen
Werte 1,03 und
1,17 = 0,99)

Arbeit herausgestellt, daß die Blätter zu Untersuchungen in derselben Richtung, wie sie vorher für die Blütengröße angestellt wurden, wenig geeignet sind. Die so sehr wechselnde Größe in verschiedener Höhe an der Pflanze macht es notwendig, daß sehr viele Blätter an jeder Pflanze gemessen werden, und zwar müssen es, wenn anders man wirklich ein einwandfreies Resultat erlangen will, stets an allen Pflanzen alle Blätter des entsprechenden Sitzes sein. Das ist aber deswegen besonders schwer, weil natürlicherweise bei den niederliegenden Pflanzen sehr

Fig. 2.

häufig einzelne Blätter angefressen oder sonstwie verletzt werden. Zudem legte ich nach den zahlreichen in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten, welche das Verhalten der Blätter nach der Bastardierung studierten, einer weiteren Untersuchung, die mit sehr viel Zeitverlust verknüpft war, und neben den Blütenmessungen gleichzeitig nicht von mir selbst ausführbar war, nicht mehr ein besonderes Gewicht bei. Ich begnügte mich infolgedessen bei diesen Blattuntersuchungen mit der Heranziehung von zwei F_1 - und einer F_2 -Generation, die letztere an nicht sehr umfangreichem Material. Auf die Besprechung der hieraus resultierenden Zahlenverhältnisse wird gleich einzugehen sein. — Nachdem mir aber nun bei den Blütenmessungen in den aufeinanderfolgenden Generationen

besondere, von den bisherigen Angaben abweichende Verhältnisse entgegengetreten sind, wird es in Zukunft natürlicherweise auch notwendig werden, der Variabilität der Blätter, soweit möglich, die genügende Aufmerksamkeit zu widmen. Bei den Blattmessungen im Jahre 1912 half mir Herr DR. FROHNMEYER.

Die Tabelle (S. 121) lehrt nun ungefähr das Folgende. Sie zeigt zuerst bei der Kreuzung *Aschers.* $\times$ *Correns.* für jedes Blatt des Bastardes eine Mittelstellung zwischen den Blättern entsprechenden Sitzes bei den Eltern, mit Ausnahme zweier, offensichtlich irgendwie fehlerhafter Fälle. Ob die Blätter des Bastardes durchaus intermediär

Fig. 3.

sind, wie im Jahre 1911 oder mehr nach *Corrensiana* neigend, wie 1912, besonders wenn *Corrensiana* weiblich ist, wird erst noch durch weitere Untersuchungen festzustellen sein. Die ungefähr intermediäre Stellung geht aber auch genugsam aus den beigefügten Abbildungen, welche nach Lichtselbstdruckten gewonnen sind, hervor (Fig. 2 und 3).

Die Abbildungen zeigen zugleich deutlich das intermediäre Verhalten des Blattrandes im Bastard. Die kleinen Sekundärzähnnchen treten bei den Blättern des Bastardes wohl auf, zweifellos aber sind sie viel seltener und weniger deutlich als bei *Corrensiana*.

In der zweiten Generation sehen wir nun das bekannte Bild, daß Pflanzen mit durchschnittlich längeren Blättern, andere mit durch-

schnittlich kürzeren Blättern auftreten, also offenbar ein Aufspalten, wie in allen bisher untersuchten Fällen. Gerade so verhält es sich mit dem Blattrand. Auch hier sind in der zweiten Generation alle möglichen Typen vertreten. Ich bringe hiervon keine Bilder, einmal, weil in der Literatur in neuerer Zeit schon weitaus genug davon mitgeteilt wurde, dann aber auch, weil ohne ein viel näheres Eingehen auf diese Verhältnisse bei den Blättern an einem viel umfangreicheren Material, als es bisher möglich war, nichts Abschließendes gesagt werden kann. Erst dann wird entschieden werden können, ob Variabilitätsgröße und Spaltungsverhältnisse sich bei den Blättern den bisher bekanntgewordenen Angaben anschließen oder aber sich so verhalten, wie es hier für die Blütengröße mitgeteilt wurde.

Für unser anderes Problem, die Konstatierung der tatsächlichen Variation der Arten der *Veronica*-Gruppe *agrestis* lehrt uns die Betrachtung der Bastardierungsverhältnisse der Blätter aber schon gar viel. In den Diagnosen für die zahlreichen Formen von *Veronica Tournefortii*, welche nach spontan gefundenem Material aufgestellt wurden, spielen die Gestaltungsverhältnisse der Blätter und die Zähnung eine sehr große Rolle. Ich möchte zur Illustration nur einige wenige Stichproben anführen.

MERTENS und KOCH (in Röhlings Deutschlands Flora, 1823, S. 332) unterscheiden zwei Formen, α mit breit-herzförmigen, grob und zuweilen doppelt gekerbten Blättern, die etwa nur ein Drittel kürzer sind, als die fruchttragenden Blütenstiele; β mit rundlich-herzförmigen, gekerbten Blättern, die um mehr als das Doppelte kürzer sind als die fruchttragenden Blütenstiele.

GODRON, (Flore de Lorraine, 1857). a) genuina. Feuilles larges profondément dentées, b) Feuilles plus petites, superficiellement dentées.

WIESBAUER (Mitt. Sect. f. Naturk. österr. Tour. Club, 1890), typica Blätter etwa 1,5 cm breit — macrophylla Blätter besonders oft 2—3 cm breit — microphylla kaum 1 cm breit — brachypoda Kürze der Blütenstiele wie bei den gewöhnlichen *Veronica*-Arten.

Diese Beispiele mögen genügen. Sie ließen sich aber sehr leicht verzehnfachen. Ich weise zur Konstatierung der Blattvariabilität nur noch auf die zahlreichen Abbildungen von *V. Tournefortii* an den verschiedensten Stellen hin (vgl. LEHMANN 1908, S. 659). Betrachten wir aber nun z. B. die Angaben von MERTENS und KOCH. Da könnte man nach den zuweilen doppelt gezähnten Blättern auf *V. Corrensiana* schließen. Die Blätter sollen aber zugleich breit herzförmig sein, was nach unserer Feststellung gerade nicht stimmt. Dagegen würde β , was die Blätter anlangt, wohl zu *Aschersoniana* zu ziehen sein; nur wissen wir gar nichts über Blüten usw. Bei GODRON finden wir breite, tief gezähnte und

kleinere, oberflächlich gezähnte Blätter, endlich bei WIESBAUER treten uns Pflanzen mit Blättern ganz verschiedener Breite entgegen. Hier liegt doch die Vermutung ungeheuer nahe, daß es sich in allen diesen Formen um Spaltungsprodukte nach Bastardierung verschiedener *Tournefortii*-Unterarten handelt. Unsere Untersuchungen haben uns einmal das Auftreten spontaner Bastarde zwischen Unterarten von *Tournefortii* ergeben und weiter gezeigt, daß die Blattgröße in der zweiten Generation stark aufspaltet, sie haben uns also direkt den Beweis erbracht, daß solche Formen in der Natur sich als Bastardierungsfolgen bilden können. Wir werden demnach nicht mehr daran zweifeln können, daß die Bastardierung bei der Hervorbringung der Blattvariabilität wenigstens von *V. Tournefortii* in hohem Maße mit im Spiele ist.

Wie es mit der Erbllichkeit dieser Formen ist, kann hier nicht erörtert werden, da für die Blätter F_3 -Generationen nicht erzogen sind. Es wird darauf aber später bei der Betrachtung der Form, Färbungs- und Größenverhältnisse der Blüten eingehend zurückzukommen sein.

Das Verhalten der Pentasepalie bei Bastardierung.

Wie in der ganzen Gattung *Veronica*, so treten auch gerade bei unseren Arten häufig pentasepale Kelche auf. Meine Untersuchungen früherer Jahre haben gezeigt, daß bei *V. Tournefortii* eine Reihe von Rassen mit verschiedener Häufigkeit an pentasepalen Kelchen vorkommen (vgl. 1909, S. 161 ff.). Dabei hatte sich ganz besonders ergeben, daß *V. Corrensiana* stets fast nur normale vierblättrige Kelche besitzt, pentasepale hingegen nur in Bruchteilen von Prozents. Im Gegenteil dazu sind bei einer ganzen Anzahl untersuchter Rassen von *V. Aschersoniana* die pentasepalen Kelche weitaus in der Überzahl. Wenn wir uns der Ausdrücke von DE VRIES bedienen wollen, so fand ich bei *Corrensiana* nie pentasepale Mittlrassen, sondern höchstens sehr arme pentasepale Halbrassen. Bei *Aschersoniana* kommen sowohl pentasepale Halbrassen, als mehr oder weniger bis sehr reiche pentasepale Mittlrassen vor¹⁾. Es konnte natürlich durch diese Feststellung die Möglichkeit, daß auch bei *Corrensiana* noch hochprozentige pentasepale Mittlrassen aufgefunden würden, nicht ausgeschlossen werden. Nach meinen jetzigen gleich dar-

¹⁾ NAEGELI würde von Rassen mit entfaltungsscheuer und entfaltungsholder Pentasepalie gesprochen haben.

zustellenden Befunden ist die Wahrscheinlichkeit, solche aufzufinden, allerdings erheblich verringert worden.

Bei einer Bastardierung der armen pentasepalen *Corrensiana* mit einer reichen pentasepalen Mittelrasse von *Aschersoniana* mußte sich nun zeigen, wie sich die pentasepalen Kelche nach Bastardierung verhalten.

Sehen wir aber zuerst, was über Bastardierung von Zwischenrassen anderweit vorliegt. In allererster Linie sind da die Kreuzungsversuche zu erwähnen, welche DE VRIES mit sehr verschiedenen Zwischenrassen angestellt hat (vgl. Mutationstheorie, 2, S. 346 ff.). Vor allem sind seine umfangreichen Untersuchungen über die Bastardierungsverhältnisse trikotyler und synkotyler Mittelrassen zu nennen. Hieran schließen sich Untersuchungen mit gestreiften Blumen und Früchten, Buntblättrigkeit, gefüllten Blüten, polycephalen Blüten, mehrscheibigen Blättern beim Klee, der Anomalie von *Plantago lanceolata ramosa*. DE VRIES kommt zu dem Ergebnisse, daß sich alle diese Merkmale bei Kreuzung dem einfachen Mendelschen Schema fügen. In der ersten Generation dominiert das phylogenetisch ältere Merkmal, in der zweiten Generation tritt Aufspaltung ein, welche teilweise bis zu den Ausgangsrassen geht, und in der dritten Generation erweisen sich, soweit das an einzelnen Fällen der trikotylen Keimlinge festgestellt ist, die herausgespalteten Typen konstant. DE VRIES hebt aber S. 347 ausdrücklich hervor, daß auf dem Gebiete der stark variablen Eigenschaften Kreuzungsversuche, die zu exakten Ergebnissen führen sollen, sehr umständlich sein müssen. Er sagt weiter auf S. 348: Auf dem Gebiete der stark variablen Eigenschaften wird man sich also vorläufig wenigstens meist mit weniger genauen und weniger schlagenden Versuchen zufrieden geben müssen, als bei den typischen Bastardspaltungen. Will man die Zahlen, welche von DE VRIES gebracht werden, genauer betrachten, so wird man ihm in dieser Beziehung sicher recht geben müssen. Die vorgebrachten Zahlen sind oft recht klein und teilweise wenig überzeugend. Es stammen diese Versuche ja auch aus der allerersten Zeit der Mendelforschung, so daß wir uns nicht darüber wundern können, wenn hier noch mancherlei weiter auszuführen blieb. Da nun aber seit diesen Untersuchungen von DE VRIES keine umfangreiche neuere Behandlung der Bastardierungsverhältnisse von Zwischenrassen vorliegt, mein Material sich aber für die Behandlung dieser Fragen als besonders günstig erwies, so habe ich für die pentasepalen Zwischenrassen sehr umfangreiche Kulturen und Zählungen vorgenommen.

Die eingehendere Besprechung der DE VRIESschen Versuche möchte ich bis nach der Darstellung meiner Versuchsergebnisse aufschieben. Ich möchte hier nur einen Fall herausgreifen, welcher meinen Zwischenrassen bei *Veronica* besonders parallel geht. Schon früher knüpfte ich öfter daran an; es handelt sich um den Fall von *Trifolium pratense quinquefolium*. Hier liegt bekanntlich eine Zwischenrasse des gewöhnlichen 3 blättrigen Klees vor, welche mehr oder weniger häufig 5 scheibige Blätter hervorbringt. DE VRIES (II, S. 354) bastardierte diese Form nun mit der gewöhnlichen 3scheibigen, allerdings anders gefärbten Form, was aber für unsere Zwecke völlig belanglos ist. In zwei angestellten Kreuzungskulturen fand er ziemlich zahlreiche 4- und 5scheibige Blätter. In der größeren Kultur zählte er die Pflanzen und fand 172 Exemplare mit wenigstens einem 4 zähligen Blatte und 64 mit ausschließlich 3 zähligen. „Die Zählung wurde bei voller Blüte Mitte August vorgenommen; es mag aber unter den damals bereits verdorrten Blättern noch ziemlich viele 4 zählige gegeben haben. Die Bastarde verhalten sich somit ähnlich wie bei den Trikotylen, sie sind nicht einseitig 3 zählig, sondern zeigen die Anomalie in geringem Grade ausgebildet.“ Bleiben wir erst einmal bei dieser ersten Generation, so finden wir nach diesen allerdings sehr primitiven Versuchen eine abgeschwächte Dominanz der Anomalie in der ersten Generation.

Zur Besprechung der zweiten Generation bedienen wir uns wieder, soweit nötig, der Worte von DE VRIES. „Hier ergab sich eine bedeutende Schwierigkeit. Aller Analogie nach müssen die 3 zähligen Blätter über die 5 zähligen dominieren, und sie taten dies in der ersten Generation auch ganz deutlich. Wenn es aber aufs Zählen ankommt, so wird die Sache eine andere. Es läßt sich ermitteln, wie viele Pflanzen ohne und wie viele mit 4 zähligen Blättern es gibt. Die erste Gruppe enthält die rezessiven Individuen mit einigen Bastarden, die andere die meisten Bastarde und die dominierenden Exemplare. Genauere Grenzen lassen sich nicht feststellen und so wird im Ergebnis das tatsächlich rezessive Merkmal in der Mehrzahl der Individuen und also anscheinend als dominierend auftreten.“ Für diese zweite Generation wurden auf 220 Pflanzen gefunden:

82% Pflanzen mit 4 zähligen Blättern,
18% „ ohne 4 zählige Blätter.

So überzeugend die Endzahlen trotz der immerhin vorhandenen Abweichung von den zu erwartenden Mendelschen Verhältniszahlen sind,

so unklar ist der Versuch im ganzen. Wir erfahren über den Prozentgehalt, in welchem die Anomalieen bei den einzelnen Pflanzen auftreten, trotz des dunklen Hinweises auf das Zählen nichts. Nach dem Versuchsergebnis, wie es vorliegt, ist aber die merkwürdige Umdrehung des rezessiven Merkmals ins dominante und umgekehrt nicht recht verständlich, denn es dominiert doch eben in der ersten Generation das Vorhandensein der Anomalie über deren Fehlen ebenso, wie in der zweiten. Wie die Zahlenverhältnisse sonst liegen, ist eben nicht zu ermitteln.

Wenn ich meinen Versuch mit den pentasepalen Kelchen ganz in den Rahmen dieses Versuches hineinstelle, wie ich ihn hier entgegen DE VRIES deuten möchte, so wäre das Folgende zu erwarten. Ich habe eine 5kelchblättrige Rasse und eine 4kelchblättrige. Es müßten dann in der ersten Generation die Individuen mit pentasepalen Kelchen über diejenigen mit tetrasepalen Kelchen in etwas abgeschwächter Form dominieren; in der zweiten Generation aber müßten auf 25% Pflanzen mit 4blättrigen Kelchen 75% Pflanzen mit 5blättrigen Kelchen kommen. Über die dritte Generation liegt bei DE VRIES nichts vor. Gleichfalls fehlen, wie schon eben erwähnt, die Prozentzahlen für das Auftreten der mehrscheibigen Blätter innerhalb der einzelnen Individuen. All diese Lücken waren bei meinen Versuchen zu vermeiden und vor allem Versuche mit sehr großen Zahlen anzustellen. Dabei war aber noch weiter eine Reihe von Vorkehrungen und Vorsichtsmaßregeln zu treffen, wenn die Versuche zuverlässig sein sollten, auf welche sogleich näher einzugehen sein wird. Einer der wichtigsten Faktoren, welcher hierbei zu berücksichtigen war, ist die schon erwähnte Periodizität, welche der Verbreitung dieser Anomalien zugrunde liegt. Ehe ich dieser aber meine Aufmerksamkeit zuwende, wollen wir die Konstanz des in Frage kommenden Merkmals in den Ausgangstypen kurz erörtern.

Konstanz der Sepalanomalien in den aufeinanderfolgenden Generationen.

Die Zwischenrassen sind nach DE VRIES im allgemeinen sehr großer Veränderlichkeit ausgesetzt. Betrachten wir, wie sich das bei unseren pentasepalen Rassen verhält.

a) *V. Corrensiana*.

Benennung	Jahr	Generation	Gesamtzahl der gezählten		Pentasepal	Intermediär	Tetrasepal
			Kelche	Pflanzen			
—	1908	P ₃	540	—	0	1	539
—	1909	P ₂	—	—	nicht beobachtet	—	—
—	1910	P ₁	11	—	0	0	11
1111	1911	F ₁	6 212	50	8	—	6 204
1232	1912	F ₂	5 807	29	97 1,6%	—	5 710
1305	1913	F ₃	790	13	15 1,9%	—	775
Summa			13 360	92	120 0,9%	1	13 239

Durch alle fünf untersuchten Generationen hindurch tritt das Merkmal der Pentasepalie also stark gegen die tetrasepalen Kelche zurück. Auf den ersten Blick aber fällt auf, daß die Pentasepalie in den beiden letzten Jahren relativ häufiger ist, als vorher. Das hat folgenden Grund. Die Häufigkeit der Pentasepalie steigt periodisch von unten nach oben an der Pflanze, wie sich 1909 ergab und bald noch detaillierter ausgeführt wird. Nun wurden aber in den letzten Jahren bei einigen wenigen Pflanzen sehr umfangreiche Zählungen ausgeführt, während bei 1111 eine größere Pflanzenzahl mit weniger gezählten Blüten in Frage kommt. Im ersten Fall waren auch höher sitzende Blüten, im zweiten nur untere Blüten gezählt worden. Es kamen also im ersteren Falle mehr Anomalien mit zur Zählung als im letzten. So sind die Differenzen genügend erklärt (vgl. dazu 1909, S. 204, Tab. I).

Jedenfalls aber bewegt sich der Prozentgehalt an pentasepalen Kelchen bei *V. Corrensiana* in den aufeinanderfolgenden Jahren stets unter 2%, so daß wir es hier mit einer äußerst konstanten anomaliearmen Rasse zu tun haben. Der Jahresdurchschnitt für 13360 Kelche beträgt in 5 Jahren 0,9% Pentasepale. Ein Zweifel, daß wir es hier mit einer reinen Rasse zu tun haben, dürfte kaum noch aufkommen können. Um indessen auch jede Spur eines solchen Zweifels noch zu beseitigen, seien im Folgenden die Prozentsätze für Einzelindividuen von 8 T. I (1908) und 1232 gegeben, bei denen den Zählungen mehr als 50 Kelche zugrunde lagen.

Die Tabelle (S. 130 oben) zeigt deutlich, daß nicht etwa einzelne Individuen mit höherem Prozentgehalt an Pentasepalen dem niedrigen Durchschnitt gegenüberstehen. Alle Individuen haben entweder gar keine oder sehr wenig pentasepale Kelche. Daß aber einzelne Individuen doch

Einzelindividuen mit mehr als 50 gezählten Kelchen.

8 T.I.	4 blättrig	5 blättrig (od. intermed.)	1232	4 blättrig	5 blättrig (od. intermed.)
I	170	—	1 a	83	—
II	79	1	2	95	—
III	95	—	26	344	9
IV	119	—	3	84	—
V	86	—	4	62	—
			6	52	—
			9	411	7
			10	375	12
			17	242	8

immerhin 2—3 % aufweisen, andere gar nicht, hängt gerade mit der schon eben erörterten Tatsache zusammen, daß von den ersteren zahlreichere Kelche, also auch solche weiter oberhalb am Individuum, bei den anderen nur die unteren gezählt wurden. Wir werden unter dem Abschnitt Periodizität sehen, wie wir diese Fehlerquelle für unsere Versuche völlig unschädlich machen.

b) *V. Achersoniana*.

Benennung	Jahr	Generation	Gesamtzahl der gezählten Kelche	Pentasepal	Inter- mediär	Pentasepal + Intermed.	Tetrasepal	Bemerkungen
—	1906	P ₅	100	40 100 %	—	—	—	} vgl. Ber. d. deut- schen botan. Ges. 1907 S. 467. s. 1909, S. 162. nicht beobachtet.
30 C	1907	P ₄	407	130 32 %	8 2 %	34 %	277 68 %	
30 C	1908	P ₃	1821	1437 78,9 %	182 10,2 %	91,1 %	194 10,6 %	
—	1909	P ₂	—	—	—	—	—	
CV 20	1910	P ₁	68	36 53 %	16 23,2 %	76,5 %	16 23,5 %	
—	1911	—	286	210 73 %	58 20,7 %	93,7 %	18 6,3 %	
—	1912	—	3427	2109 61 %	764 22 %	83 %	554 17 %	
—	1913	—	—	—	—	—	—	

Die Zahlen für den Prozentgehalt der Pentasepalen bei *V. Aschersoniana* wären nach obiger Tabelle in den aufeinanderfolgenden Generationen recht sehr verschiedene. In allen Fällen zwar ist der Anomaliegehalt bei *Aschersoniana* viel höher, als wir ihn für *Corrensiana* festlegten. Wenn die Differenzen aber wirklich so große wären, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, so würden sich diese Rassen sehr wenig zu quan-

titativen Bastardierungsversuchen eignen. Auch für diese Pflanze gilt ja aber das über die Periodizität Gesagte und gleich noch weiter Auszuführende und zwar gilt es naturgemäß in viel höherem Grade, als bei *V. Corrensiana*. Bei dieser treten die Anomalien im ganzen so sehr in den Hintergrund, daß ihre Verteilung den Prozentgehalt überhaupt nur sehr wenig absolut, wenn natürlich auch prozentual in ungefähr demselben Maße verändern kann. Bei *Aschersoniana* wird diese Beeinflussung durch die Periodizität so stark, daß ihre Nichtberücksichtigung zu so differenten Werten führen würde, wie sie obige Tabelle wiedergibt. Sehen wir nun zu, zu welchen Ergebnissen wir unter sorgfältiger Berücksichtigung der Periodizität gelangen.

Die Periodizität der Sepalanomalien.

TAMMES hatte schon früher für die Fünzfähigkeit der Blätter von *Trifolium quinquefolium* die Periodizität eingehend studiert. Ich habe die Periodizität der Blütenanomalien bei *Veronica Tournefortii* 1909 untersucht. Beide Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, daß die Anomalien auf verschiedener Höhe der einzelnen Pflanzenindividuen in sehr verschiedener Häufigkeit auftreten. Wollen wir nun Untersuchungen anstellen über das quantitative Verhältnis der Sepalanomalien nach Bastardierung, so benötigen wir selbstverständlich auch wirklich vergleichbare Werte. Wir müssen also die Kelche durchaus entsprechenden Sitzes miteinander vergleichen. Ich hatte 1909 gezeigt, daß die Sepalanomalien am Grunde wenig häufig sind, dann an Häufigkeit zunehmen, um in der stärkeren Entwicklungszeit der Pflanzen wieder seltener zu werden. Teilt man die Blüten nach ihrem aufeinanderfolgenden Auftreten am Individuum in Dekaden ein, so erhält man:

in Dekade	1—5	58 0/0	pentasepale	Kelche
"	"	6—10	80 0/0	" "
"	"	11—15	85 0/0	" "
"	"	16—20	85 0/0	" "
"	"	21—25	80 0/0	" "
"	"	26—30	79 0/0	" "
"	"	31—35	66 0/0	" "
"	"	36—40	50 0/0	" "
"	"	41—45	47 0/0	" "
"	"	46—50	34 0/0	" "
"	"	51—55	34 0/0	" "

Für diese Zahlen wurde die damals untersuchte Rasse von *V. Aschersoniana* herangezogen. In den ersten fünf Dekaden zeigten sich die Differenzen dabei noch erheblich auffälliger. Es sei die folgende kurze Übersicht nach der Prozentzahl gegeben.

Pentasepale Kelche in Prozent.

Dekade 1	33 %
„ 2	50 %
„ 3	65 %
„ 4	70 %
„ 5	74 %

Es können also die Individuen keinesfalls als ganzes verglichen werden. Sie sind ja niemals alle gleich alt und gleichmäßig entwickelt. Man würde auf diesem Wege gänzlich unklare Werte erhalten. Es müssen vielmehr festumschriebene Teile der Pflanzen zum Vergleiche herangezogen werden.

Wir können aber begreiflicher Weise nur dann so vorgehen, wenn diese Periodizität immer die gleiche ist, sich also in aufeinanderfolgenden Jahren nicht ändert. Es mußte das also zuerst festgestellt werden. Das war um so wichtiger, als ja dann auch die Zählarbeit erheblich beschränkt werden konnte. Man könnte ja dann durch Auszählung einer bestimmten Strecke stets die Verhältnisse über die ganze Pflanze klarlegen und könnte durch Umrechnung leicht die Werte für jede beliebige weitere Strecke an der Pflanze feststellen.

Ich habe zur Beantwortung dieser Frage ganz die gleiche Berechnung wie 1908 für eine *Aschersoniana*-Kultur aus dem Jahre 1912 (1228) angestellt. Sie führte zu folgendem Ergebnis:

Dekade . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zahl der gezählten Kelche	31	40	46	47	48	68	76	76	80	85	109	121	135	144	158	168	177	181	182	190	208	239	256	287	—
Zahl der Pentas. in %	67	55	71	68	67	80	90	70	72	72	83	80	84	85	83	85,5	90	82	83	87	80	91	89	89	—
	66 %					77 %					82 %					85 %					87 %				

Wir erhalten damit folgende Werte für die Periodizität der pentasepalen Kelche 1908 und 1912 bei *V. Aschersoniana*.

	1908	1912
1.— 5. Dekade	58 %	66 %
6.—10. "	80 %	77 %
11.—15. "	85 %	82 %
16.—20. "	85 %	85 %
21.—24. "	80 %	87 %

Die Zusammenstellung zeigt klar und deutlich, daß die Periodizität in den beiden Vergleichsjahren nahezu übereinstimmt.

Man konnte also nun vielleicht daran denken, immer die 1.—5. Dekade oder auch mehr oder weniger zum Vergleiche beim Versuch heranzuziehen. Ein solches Vorgehen erweist sich aber in der Praxis einmal aus technischen Gründen nicht ratsam, dann aber vor allem auch nicht als genau genug. Wenn an einem Tage an einer Pflanze 30 Blüten aufblühen und es sind vielleicht noch 5 Blüten zu zählen, bis die nötige Dekadenzahl erfüllt ist, welche von den 30 erblühten Blüten sollen zur Zählung ausgewählt werden, wo soll die Grenze gezogen werden? Das würde immer willkürlich zu geschehen haben.

Dann aber ist zu bedenken, daß eine völlig regelmäßige Zählung jeder Blüte nur mit den größten Schwierigkeiten möglich ist. Man ist dazu gezwungen, täglich jeden Kelch, der sich entwickelt, zu untersuchen, man muß also alle Zeit nur für die Arbeit zur Verfügung haben. Es ist aber auch für unsere Zwecke gar nicht nötig, so vorzugehen, denn es gibt noch einen zweiten, weitaus besseren und genaueren Weg. Dieser Weg ist der folgende:

Die zur Untersuchung vorliegenden Pflanzen haben ein sehr regelmäßiges Wachstum. Es wird eine Hauptachse ausgebildet, welche nach rechts und links Nebenachsen (Achsen 2. Ordnung) ausbildet, welche ihrerseits wieder Achsen dritter Ordnung in ganz regelmäßiger Folge hervorbringen, so wie es im Schema auf S. 188 (1909) zur Darstellung gebracht wurde. Wenn man nun die einzelnen Kelche je nach Sitz und Beschaffenheit in ein Journal einträgt (vgl. S. 187, 1909), so wird es dadurch möglich, sich nachher den Aufbau der ganzen Pflanzen, soweit das eben nötig ist, zu rekonstruieren. Da die Kelche bei den *Veronicae* sehr persistente Organe sind, kann man die Arbeit einteilen, und

Periodizität im Auftreten der Kelchblattanomalien an den einzelnen

	1908	1912	1908	1912
Hauptachse. Blüte	4—8	4—8	9—13	9—13
tetrasepal . .	52 40 %	28 36 %	20 17 %	23 30 %
pentasepal . .	77 60 %	38 64 %	100 83 %	54 70 %
1. Achse 2. Ordnung. Blüte (r_1, l_1 d. Schemas)	3—7	3—7	8—12	8—12
tetrasepal . .	68 57 %	111 46 %	16 14 %	21 10 %
pentasepal . .	52 43 %	129 54 %	99 86 %	190 90 %
2. Achse 2. Ordnung. Blüte (r_2, l_2 d. Schemas)	3—7	3—7	8—12	8—12
tetrasepal . .	53 44,2 %	84 35 %	11 10,5 %	18 6 %
pentasepal . .	67 55,8 %	154 65 %	93 89,5 %	110 94 %
3. Achse 2. Ordnung. Blüte (r_3, l_3 d. Schemas)	3—7	3—7	8—12	8—12
tetrasepal . .	26 20 %	30 27 %	5 4 %	3 6 %
pentasepal . .	102 80 %	82 73 %	110 96 %	46 94 %
1. Achse 3. Ordnung. Blüte ($r_{11}, r_{11}, l_{11}, l_{11}$ d. Schemas)	3—7	3—7	8—12	8—12
tetrasepal . .	31 16 %	64 25 %	11 7 %	12 6 %
pentasepal . .	161 84 %	193 75 %	148 93 %	182 94 %
2. Achse 3. Ordnung. Blüte ($r_{12}, r_{12}, l_{12}, l_{12}$ d. Schemas)	3—7		8—12	
tetrasepal . .	13 8 %		7 9 %	
pentasepal . .	140 92 %		75 91 %	
1 Beisproß. Blüte (r_{10}, l_{10} d. Schemas)	3—7	3—7	8—12	8—12
tetrasepal . .	35 46 %	41 39 %	6 11 %	1 1 %
pentasepal . .	41 54 %	66 61 %	49 89 %	74 99 %

man kann ohne allzugroße Schwierigkeiten ein genügend umfangreiches Material von Pflanzen mit Kelchanomalien ganz entsprechenden Sitzes beschaffen. Ich bin bei meinen Untersuchungen in dieser Weise vorgegangen und habe die Resultate für 1908 und 1912 in beifolgender Tabelle niedergelegt.

Achsen von *Veronica Tournefortii* subsp. *Aschersoniana*.

1908	1912	1908	1912	1908	1912	1908	1912
14—18	14—18	19—23	19—23	24—28	24—28	29—33	34—38
1 1%	7 12%	1 1%	1 2%	0 0%	2 5%	0 0%	1 6%
105 99%	51 88%	65 99%	41 98%	48 100%	21 95%	31 100%	15 94%
13—17	13—17	18—22	18—22	23—27	23—27	28—32	
2 2%	0 0%	0 0%	3 3%	0 0%	3 5%	2 6%	
97 98%	151 100%	48 100%	98 97%	8 100%	56 95%	32 94%	
13—17	13—17	18—22	18—22	23—27	23—27		
3 4%	2 2%	0 0%	1 2%	0 0%	2 9%		
74 96%	85 98%	43 100%	63 98%	12 100%	22 91%		
13—17	13—17	18—22					
1 1%	1 6%	1 3%					
74 99%	16 94%	30 97%					
13—17	13—17						
3 3%	1 1%						
103 97%	120 99%						
13—17	13—17	18—22					
2 5%	1 3%	0 0%					
39 95%	31 97%	19 100%					

Die Tabelle gibt uns Aufschluß in der verschiedensten Richtung. Sie zeigt einmal deutlich, wie die Pentasepalie periodisch auch über die Achsen verbreitet ist. An den zuerst sich entwickelnden Achsen ist sie anfangs seltener, um dann immer häufiger zu werden. An den späteren Achsen (z. B. $r_1 r_2$) ist sie gleich anfangs häufig. Diese Achsen kommen

eben erst zu einer Zeit zur Ausbildung, zu welcher die Pflanze schon die Anlage der pentasepalen Kelche ganz allgemein begonnen hat. Dabei ergibt sich auch, daß das periodische Auftreten an den verschiedenen Achsen ebenfalls in aufeinanderfolgenden Jahren das gleiche bleibt. Wo die Zahlen der gezählten Blüten genügen, da ist die Übereinstimmung in beiden Versuchsjahren weitgehend.

Es entstand aber nun die nächste Frage: Welche Teile der Pflanze sollen zum Vergleiche gewählt werden, sollen es die unteren, mittleren oder oberen Teile sein. Nach der Periodizitätstafel 1909 (S. 204—205) könnte man daran denken, die unteren oder oberen Teile der Pflanzen zu wählen. Hier werden sich etwelche Unterschiede in dem Prozentgehalt der Anomalien am deutlichsten aussprechen. Die mittleren Partien (Dekade 6—30) erweisen sich als ungünstiger, da sich hier die Anomalien in so großer Häufigkeit vorfinden (79—85 %), daß sie immer stark im Übergewichte sind. Wenn aber Schwankungen im Anomaliegehalt nach der Bastardierung zu erwarten sind, so werden sie dort am besten festzustellen sein, wo sie sich mit der normalen Eigenschaft beim Ausgangsmaterial ungefähr die Wage halten. Die Verwendung der oberen Blüten erwies sich aber natürlich deswegen als ungeeignet, weil die Pflanzen ja dann unnötig lange hätten kultiviert werden müssen. So kam ich zur Verwendung der Blüten der ersten Dekaden. Diese sind in der Tabelle eingetragen.

Wenn wir nun weiter fragen, bis zu welcher Blüte an jeder Achse die Vergleichswerte entnommen werden sollen, so erweist es sich als besonders praktisch, immer nur soweit zu gehen, als überhaupt noch eine größere Zahl 4-blättriger Kelche auftritt. Ich habe das dann noch im speziellen eingehender berechnet und bin zu folgenden Sätzen gekommen:

Von der Hauptachse wird benutzt Blüte 4—16,					
"	"	1. A. 2. O.	"	"	" 3—12,
"	"	2. A. 2. O.	"	"	" 3—12,
"	"	3. A. 2. O.	"	"	" 3—7,
"	"	1. A. 3. O.	"	"	" 3—8,
"	"	dem Beisproß	"	"	" 1—10.

Die höheren Achsen sind ebenso wie die höheren Blüten der genannten Achsen ungeeignet, da sich dort fast nur 5-blättrige Kelche befinden. Gleichzeitig haben wir auf diese Weise wieder einen einheitlichen Teil unseren Zählungen zugrunde gelegt, eben den, bei welchem die Blüten in der höchsten benutzten Zone noch mehr als 5% Penta-

sepalien bei *V. Aschersoniana* hervorbringen, oder der im ganzen ca. 30% Anomalien liefert. Da diese Werte für die einzelnen Achsen innerhalb der angegebenen Grenzen übereinstimmen, so können dieselben auch gegeneinander ausgetauscht werden, und es können vor allem auch Pflanzen zu den Zählungen benutzt werden, wo einzelne Achsen fehlen, was natürlich besonders wichtig ist, da ja nie in so großer Anzahl durchaus vollständige Pflanzen erzielt werden können.

Nachdem wir also in der dargelegten Weise einen sicheren Anhalt zur Vergleichung der Anomalienhäufigkeit bei beiden Arten und dem Bastard gewonnen haben, sollen nun diese Werte selbst nach Kreuzung der hochprozentig pentasepalen *Aschersoniana* mit der an Pentasepalen sehr armen *Corrensiana* ermittelt werden.

Die Versuche.

Es liegen zur Kelchuntersuchung dieselben beiden Versuchsreihen vor, welche auch der Untersuchung der Blütengröße dienten. Sie stammen von der Bestäubung zweier *Aschersoniana*-Blüten mit *Corrensiana*-Pollen. Die erste Versuchsreihe ist auch hier bis zur F_3 fortgesetzt. Ganz wie bei der Blütengröße liegt der Hauptnachdruck auf dem Verhalten der einzelnen F_3 -Familien. Die Zahl der zu den Zählungen benutzten Individuen und Kelche ist eine verschiedene. Soweit sie zu den feineren Untersuchungen benutzt wurden, schwanken sie zwischen 20 Individuen mit einigen 100 gezählten Kelchen bis zu 144 Individuen mit 7489 gezählten Kelchen.

Die zweite nur bis zur F_2 fortgeschrittene Versuchsreihe wurde auch hier sehr umfangreich gestaltet. In der F_2 wurden 199 Individuen mit ca. 9500 Kelchen zur Zählung benutzt.

Die erzielten Ergebnisse sind in den folgenden beiden Tabellen niedergelegt.

Allgemeiner Überblick.

Vor allem handelt es sich hier bei dieser Bastardierung im Gegensatz zur Blütengröße um zwei Merkmale, die nicht im geringsten transgredieren, sondern deren extreme Plus- und Minusvarianten weit voneinander entfernt sind. Sodann wurde schon bei der kurzen vorhergehenden Betrachtung der F_1 mitgeteilt, daß sich die Pentasepalie in F_1 nicht intermediär verhält. Die Pentasepalie dominiert vielmehr als Zwischenrasse durchaus über die Tetrasepalie. In der zweiten Generation kommt es dann aber keineswegs zu den Verhältnissen, wie sie oben als nach

1315	F ₈	$\frac{1202}{24}$	96	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	25	$92 \pm 1,23$	$11,27 \pm 1,35$	$\frac{35}{784}$
1316	F ₃	$\frac{1202}{15}$	67	0	1	1	3	2	4	1	7	7	4	0	$60 \pm 4,15$	$19,93 \pm 2,94$	$\frac{23}{656}$
1318	F ₈	$\frac{1206}{14}$	68	0	0	1	7	2	7	11	16	16	23	17	$72 \pm 1,97$	$18,05 \pm 1,39$	$\frac{84}{3040}$
1319	F ₈	$\frac{1206}{20}$	61	2	1	2	2	7	11	10	7	7	9	6	$63 \pm 2,95$	$22,26 \pm 2,08$	$\frac{57}{2565}$
1320	F ₃	$\frac{1206}{18}$	75	0	0	0	1	1	1	1	4	4	7	13	$85 \pm 3,24$	$17,16 \pm 2,29$	$\frac{28}{470}$
1321	F ₃	$\frac{1206}{8}$	86	0	0	0	0	0	0	1	3	14	28	96	$90 \pm 0,73$	$8,71 \pm 0,52$	$\frac{142}{1393}$
1322	F ₃	$\frac{1206}{12}$	73	0	0	1	2	1	3	4	6	6	5	3	$72 \pm 4,60$	$23,45 \pm 3,25$	$\frac{26}{739}$
		$\frac{1111 (17+7)}{(Correns.)}$	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,97%	2,22	$\frac{13}{419}$
		1228 1 ^b	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	0	1,60%		$\frac{8}{110}$

Versuchsreihe 2.

1228	P ₁										5	13	2	1	$73 \pm 1,01$	$4,65 \pm 0,72$	$\frac{21}{945}$
1232	P ₁		15												$0,46 \pm 0,28$	$1,10 \pm 0,20$	$\frac{15}{800}$
1227	F ₁										8	3	1		68%	$7,04 \pm 1,44$	$\frac{12}{540}$
1338	F ₂		3	5	3	5	13	13	13	17	25	45	70		$78,3 \pm 1,63$	23,09	$\frac{199}{9950}$
1115, 1	F ₁														74%		$\frac{10}{450}$

Hierzu der spontane Bastard.

Bei weniger als 5 für jede Familie ausgezählten Individuen wurde weder σ noch der wahrscheinliche Fehler berechnet.
 1) Die Zahl über dem Strich bedeutet in dieser Reihe stets die Anzahl der gezählten Individuen, die unter dem Strich die Zahl der gezählten Kelche.

F₂ des Jahres 1912.

1206 Pflanze . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
% an Pentasepalie .	100	87	17	84	97	82	68	86	—	11	86	73	48
1206 Pflanze . . .	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	
% an Pentasepalie .	68	96	21	89	75	88	61	13	31	77	100	28	
1202 Pflanze . . .	9	15	16	19			1203	3	4	6			
% an Pentasepalie .	86	67	21	78				53	6	32			

Detaillierte Übersicht der Kelchblattprocente für F₂ 1338.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	
3										5										
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	
3										5										
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
2	1	1	2	1	0	3	0	1	2	3	0	0	2	0	2	2	0	3	1	
13										13										
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
0	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2	0	4	1	1	4	5	2	4	2	
17										25										
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	4	3	3	3	3	11	2	6	7	3	3	9	6	2	5	7	9	7	1	18
45										70										

dem DE VRIESschen *Trifolium*-Versuch zu erwarten hingestellt wurden. Von einer Aufspaltung in $\frac{1}{4}$ anomalieloser und $\frac{3}{4}$ anomalieträger Individuen ist nicht das allergeringste zu verspüren. Sollte etwas derartiges zustande kommen, so müßten, wie ich weiter oben auseinander-setzte, unter den 199 untersuchten Individuen ca. 50 mit ungefähr 2% Pentasepalie auftreten. Es finden sich aber in der ganzen Klasse 0—9% sogar nur 3 Individuen. Damit aber ist die einfache Spaltung völlig ausgeschlossen. Statt dessen tritt eine viel weitergehende, sehr eigentümliche Aufspaltung hervor. Wir müssen zur Betrachtung dieser Dinge

die zweite Tabelle benutzen, da im Jahre 1912 keine vollständige F_2 vorliegt, sondern nur einzelne beliebig herausgegriffene, zur Nachzucht benutzte Individuen genügend ausgezählt wurden. Zwar ergibt auch dieser Versuch schon eine recht klare Aufspaltung, verständlicherweise aber nicht in der gesetzmäßigen Weise wie bei dem großen voraussetzungslos behandelten Material des Jahres 1913. Ehe wir aber die Form dieser Aufspaltung und das Verhalten der F_3 betrachten, sei auf die Streuungswerte eingegangen. Sie sind ja für die Beurteilung der Aufspaltung von besonderer Bedeutung.

Graphische Darstellung der Pentasepalie in F_2 (1338)
und mehreren F_3 -Familien.

Fig. 4. (1338) F_2 .

Fig. 5. (1319) F_3 .

Fig. 6. (1802) F_3 . Fig. 7. (1804) F_3 . Fig. 8. (1821) F_4 .

Die Streuungswerte und Variabilitätskoeffizienten.

Die Streuungswerte für die Ausgangspflanzen liegen etwas verschieden. *Corrensiana* zeigt in 1238 1,1%, in 1305 2,2% Streuung, *Aschersoniana* in 1228 4,65%. Im Bastard erscheint die Streuung um ein wenig gegen *Aschersoniana* gehoben. Sie beträgt in 1227 7,04%. Das Material des Bastardes des Jahres 1911 ist zu gering, um es zur Streuungsberechnung benützen zu können. Auch sind die Zahlen im Versuch 1227 nicht hoch, so daß ich auf diese Streuungszahl keinen besonders großen Wert lege. Ganz anders ist das mit der Streuung in der F_2 (1338). Der hier gefundene, auf völlig ausreichendem Material begründete Streuungswert ist ganz außerordentlich erhöht gegenüber den elterlichen, ebenso wie gegenüber dem Bastardsstreuungswert. Hier in F_2 beträgt der Streuungswert 23,09%. Es kommt also hier zu der von der Bastardierung quantitativ differierender Merkmale gewohnten Erhöhung des Streuungswertes in der F_2 . Betrachten wir nun die Streuungswerte der F_3 -Familien. Da finden wir außerordentlichen Wechsel. Der kleinste Streuungswert der F_3 beträgt 8,71, der größte 24,80%. Nach den Elternpflanzen hin sind also die Streuungswerte nicht erreicht, nach der F_2 hin überschritten. Die ganze Breite der Streuungswerte in den wenigen F_3 -Familien zu erhalten, war ja naturgemäß durchaus nicht zu erwarten. Die Spaltungen genügen aber vollkommen, um mit Sicherheit für die einzelnen F_3 -Familien eine verschieden große Variabilität festzustellen. Soweit die Berechnung der Streuungswerte in Frage kommt, könnten unsere Resultate also mit der Theorie unabhängig spaltender, gleichsinnig polygener Merkmale in Übereinstimmung gebracht werden. Gehen wir nun aber weiter in der Betrachtung der Ergebnisse unserer Tabelle und sehen wir uns die Einzelzahlen für die Aufspaltung an.

Die Aufspaltungen der F_2 und das Verhalten der Pentasepalie in den F_3 -Familien.

Die Zahlen für die Aufspaltungen in der F_2 sind gänzlich unerwartete.

Die F_2 liefert fast 50% an Individuen, welche die Anomalieen zahlreicher tragen, als einer der beiden Eltern überhaupt. Gegen 10% aller untersuchten Pflanzen dieser F_2 besaßen sogar in der untersuchten Zone 100% pentasepale Kelche. Da diese Zone, wie wir oben sahen, abgesehen von den allerobersten Regionen, welche aber in der Natur selten

voll zur Entwicklung kommen, die 4blättrigen Kelche weitaus am häufigsten aufzuweisen hat, so sind diese Pflanzen, wie auch aus meinen übrigen Aufzeichnungen hervorgeht, als fast völlig pentasepal aufzufassen. Nur einige wenige 4blättrige Kelche finden sich an diesen Pflanzen; ganz rein pentasepal sind sie, soweit ich beobachtet habe, aber nie. 100% 4blättrige Kelche wurden dagegen für diese Zone in keinem einzigen Falle gefunden. Das Individuum mit dem Mindestgehalt an pentasepalen Kelchen in der untersuchten Zone besaß deren immer noch 4%, also noch mehr, als sie bei den Angehörigen der reinen tetrasepalen Rasse irgendwann gefunden wurden. Das Verhältnis wird noch viel ungünstiger für die Tetrasepalen, wenn man die höheren Regionen an diesen Pflanzen mit berücksichtigt, in denen dann regelmäßig noch viel mehr pentasepale Kelche entsprechend der Periodizität dieser Anomalien hinzukamen. Also mit einer Spaltung nach einfachem Mendelschem Verhältnis ist es hier bei unserer Pentasepalie durchaus nichts.

Versuchen wir dies nun aber auf Grund der Hypothese polygener Merkmale, welche ja nach den Streuungswerten als denkbar erschien. Die einfachste Annahme für eine solche Erklärung wäre dann die, die Pentasepalie auf mehrere gleichsinnig wirkende Gene zurückzuführen, von denen jedes den Prozentgehalt der Pentasepalie um ein bestimmtes erhöht und wobei der höhere Prozentgehalt an Pentasepalie immer über den niedrigeren dominiert. Es ist nicht schwer, die Zahlen zu berechnen, welche sich auf Grund einer solchen Annahme ergeben würden, und dieselben dann mit den experimentell gewonnenen Zahlen zu vergleichen. Wir gehen dabei sicher am besten von der F_2 aus, da hier 100%ige Individuen bis nahezu zu 0%igen Individuen an Pentasepalen vorliegen. Gleich hierbei ergibt sich allerdings eine große Schwierigkeit. Wie sind die vielen 100%igen oder 90—100%igen Individuen nach Bastardierung der 70%igen mit der nahezu 0(0,5)%igen Rasse zustande gekommen? Wollen wir versuchen, uns diese Fälle durch Kombination zu erklären.

Wir müssen dabei an die von NILSSON-EHLE zuerst gedachten, von JOHANNSEN jüngst (II, 561) klar auseinandergesetzten Fälle kumulativer Polymerie anschließen. Führen wir zum besseren Verständnis dazu die Worte von JOHANNSEN selbst an: „Wie NILSSON-EHLE erkannt hat, gibt es, wo kumulative Polymerie vorliegt, zwei Grenzfälle bei den Kreuzungen. Der erste Fall ist der, daß der eine P-Biotypus alle diejenigen Faktoren, die bei der betreffenden Kreuzung eine Rolle spielen, homozygotisch besitzt, während der andere P-Biotypus ganz ohne diese

Faktoren ist. Der zweite Fall ist der, daß beide P-Biotypen etwa die Hälfte der betreffenden Faktoren besitzen. In beiden Fällen wird die Heterozygote F_1 identisch; sind m-Faktoren im Spiele, resultiert stets m-fache Heterozygotie. Denn wir denken ja nur an solche Faktoren, die den F_1 -Zygoten einseitig zugeführt werden; was beiden P-Biotypen gemeinsam ist, kommt für die Spaltungsanalyse nicht in Betracht. Indem wir nun einfachheitshalber voraussetzen, daß alle Faktoren gleich starke Wirkung haben, daß also der Grad der fraglichen Eigenschaft einer Zygote der Anzahl von Faktoren in dieser Zygote proportional sein muß, gehen wir auf diese beiden Fälle näher ein“

In unserem Falle können wir nicht die beiden Grenzfälle annehmen; der eine Elter bringt ja viel mehr Pentasepalie-% mit, als der andere, wir könnten uns aber denken, daß die pentasepale *Aschersoniana* eine Anzahl von Genen besitzt, von denen jedes die Eigenschaft besitzt, den Prozentgehalt der Pentasepalie um ein bestimmtes, gleiches zu erhöhen und zudem in der angegebenen Weise übereinander zu dominieren. Durch diese Gene sei der Prozentgehalt der Pentasepalie 70 erhalten. In *Corrensiana* müßten wir dann andere Gene annehmen, welche *Aschersoniana* — wenigstens z. T. fehlen und die dann durch die Bastardierung mit den Genen von *Aschersoniana* vereint die Pentasepalie in F_2 steigern, so daß 100% erreicht werden können. Das ließe sich, wie jedermann einsieht, leicht vorstellen, ebenso wie es NILSSON-EHLE, ohne Dominanz gedacht, JOHANNSEN ebenso ohne Dominanz für die Bohnensamen, HOWARD für die Tabakblätter gezeigt haben.

In praxi liegen aber hier einige gewichtige Bedenken vor. Man müßte nämlich zu dieser Erklärung eine Hülfshypothese heranziehen. Wenn in *Corrensiana* Gene für Pentasepalie vorhanden wären, welche die Pentasepalie in F_2 von 70% auf 100% in einzelnen Individuen erhöhen könnten, so müßten die *Corrensiana*-Pflanzen doch wenigstens 20—30% Pentasepalie überhaupt zeigen, wo sollte sonst die erhöhte Pentasepalie in F_2 -Individuen herkommen. Denn die Samen im JOHANNSENSchen Beispiele zeigen doch auch eine gewisse Größe, der eben dann die Größenfaktoren zugrunde liegen, die nach der Kombination die Vergrößerung hervorgerufen haben.

Indessen auch hier ließe sich hypothetisch Abhilfe schaffen. Es wird sich durch meine Korrelationsuntersuchungen zeigen, daß die Blütengröße und vielleicht auch andere Eigenschaften der *Corrensiana* der Pentasepalie nicht günstig sind. Wir können annehmen, in *Corrensiana* befänden sich Hemmungsfaktoren, welche die Pentasepalie auf ihren

geringen Grad herabdrückten, oder auch Korrelationen irgendwelcher anderer Art auslösen. In *Aschersoniana* aber, wo diese Hemmungsfaktoren fehlend gedacht werden, könnten dann die in *Corrensiana* versteckten Pentasepaliefaktoren ungehindert in die Erscheinung treten. Gehen wir also auf Grund einer solchen Hilfhypothese an die versuchsweise Vergleichung der ausgerechneten Zahlen mit der Annahme gleicher Keimzellbildung für die einzelnen Faktoren. Einmal würde durch eine andere Annahme die Zahl der nötigen Hypothesen um eine neue vermehrt, dann aber zeigt die Kurve schon auf dem ersten Blick, daß sie mit den auf Grund der Annahme verschieden häufiger Keimzellen für die einzelnen Gene gewonnenen Zahlen nichts gemein hat.

Wir haben 199 auf Pentasepaliegehalt untersuchte Exemplare. Wir rechnen also die Koeffizienten, die sich aus dem Binom $a + a$ unter der angenommenen Dominanz ergeben, am besten auf diese Zahlen um. Wir kommen dann zu den folgenden Vergleichswerten:

Bei 2 Genen	Berechnet	112:37:37:12
	Gefunden	132 38 20 9
Bei 3 Genen	Berechnet	84:28:28:28:9:9:9:3
	Gefunden	83 45 23 16 16 7 2 7
Bei 4 Genen	Berechnet	62:21:21:21:21:7:7:7:7:7:2,3:2,3:2,3:2,3:1
	Gefunden	49 34 25 20 12 10 10 6 9 7 3 4 2 1 4 3

Für die Berechnung von mehr Genen als Grundlage der Pentasepalie ist das Material nicht mehr ausreichend, da für fünf Gene mindestens 1024 Exemplare gebraucht werden. Weiterzige könnten ja nun vielleicht die Übereinstimmung der Versuchszahlen mit den für zwei bis vier Gene berechneten Zahlen als zureichend erklären wollen. Mir aber erscheint sie in jedem Falle als eine so unzureichende, daß aus ihr eine Zurückführung der Versuchsergebnisse auf die versuchte Weise nicht möglich erscheint. Wir können nämlich hier die fluktuierende Variabilität sicher nicht so weitgehend zur Entschuldigung benutzen, denn wir sehen aus der Konstanz der F_3 -Familien, wie gering die durch die fluktuierende Variabilität zustande kommenden Fehler sind. Es ist allerdings keine Frage, daß auf irgend welchem kombinatorischen Wege, zumal wenn man verschieden stark wirkende Gene für den Prozentgehalt der Anomalie, dazu Hemmungsfaktoren und vielleicht noch defectif ratios

annimmt, auch diese Reihe schon jetzt wird an die Mendelschen Zahlen anknüpfen können!

Nun kommt aber noch etwas anderes hinzu, was, soweit ich sehe, mit der Mendelschen Regel auch hierdurch nicht in Verbindung gebracht werden kann. Das ist das ungeheuer auffällige nach den durchaus übereinstimmenden Zahlen aber sicher gesetzmäßige Verhalten der F_3 -Familien. Betrachten wir also die Durchschnittswerte der F_3 -Familien und vergleichen sie mit den für die Eltern erlangten Werten. Ich stelle beides hier nochmals übersichtlich zusammen.

	F_2	F_3		F_2	F_3
1304	10 %	25 %	1301	86 %	88 %
1308	13 %	45 %	1302	89 %	93 %
1309	28 %	58 %	1307	84 %	89 %
1312	31 %	42 %	1313	82 %	68 %
1323	21 %	41 %	1315	96 %	92 %
			1318	68 %	72 %
			1320	75 %	85 %
			1321	86 %	90 %
			1322	67 %	60 %

Die zusammengestellten Zahlen lassen durchgehends erkennen, daß die Werte mit hohem prozentualen Pentasepaliegehalt von den Eltern der F_2 auf die F_3 -Familien im Mittelwert fast ausschließlich konstant vererbt werden. Die F_2 -Pflanzen mit geringem Anomaliegehalt ergeben dagegen F_3 -Familien mit erheblich höherem Mittelwert, als zu erwarten war. Das ist nun aber eine Tatsache, welche allen aus der Mendelschen Regel zu ziehenden Folgerungen direkt widerspricht. Die tetrasepalen sind die rezessiven. Das ist sicher nicht anzuzweifeln. Gerade unter ihnen, bzw. unter den Individuen mit geringem Pentasepaliegehalt müßte eine relative Konstanz zu erwarten sein. Das Gegenteil zeigt sich. Die F_3 -Familien weichen von den F_2 -Eltern hier besonders weit im Mittelwerte ab. Auch die Streuungswerte sind hier durchaus hoch, sie liegen zwischen 19,63 und 24,80 %. Mir kann hier eingewendet werden, daß ich erst sechs Familien, die in diese Gruppe zu stellen wären, ausgezählt habe. Das gebe ich zu, nur wäre es an sich immerhin verwunderlich, wenn gerade hier so starke Abweichungen stattgehabt hätten. Wie kommt es aber dann, daß unter den 10 Familien mit dominanten oder Mittelwerten der Pentasepalie mit Ausnahme einer Familie mit 14 % Abweichung keine stark abweichende, im Gegenteil geradezu frappant den

F₂-Eltern gleichende Mittelwerte in den F₃-Familien zu verzeichnen sind? Ich muß gestehen, daß ich hierfür keinen Anhalt in der Mendelschen Regel finden kann. Die Streuungswerte sind dabei sehr verschiedene. Bemerkenswert ist aber, daß alle sehr kleinen Streuungswerte sich in dieser Gruppe befinden. Wie sich die F₄ verhält, weiß ich noch nicht. Es erscheint mir aber nicht ausgeschlossen, daß durch Nachzucht hochprozentiger Familien mit sehr geringer Streuung noch rein pentasepale *Aschersoniana*-Familien darstellbar sein werden (vgl. z. B. 1321, mit $M = 90$, $\sigma = 8,71$).

Wenn man die großen zur Verwendung gekommenen Zahlen in Betracht zieht, wird man an diesen abweichenden Verhältnissen nicht vorüber gehen können. Dieselben sind ohne eine Menge durchaus unbegründeter Hypothesen derzeit noch nicht auf die Mendelschen Grundzahlen der Spaltungsregel zurückführbar. Man könnte ja an eine Form des Dominanzwechsels denken; irgend eine tiefere Erklärung wäre m. E. aber auch damit nicht gegeben, denn wir haben ja nicht die geringste Möglichkeit einzusehen, warum bis F₂ die Pentasepalie dominant, von da ab aber rezessiv sein soll. Sollte mich jemand eines besseren belehren können, so würde ich mich natürlich ohne weiteres fügen. Ich habe aber trotz langwieriger Überlegung nirgends einen zufriedenstellenden Weg gefunden.

Ich halte allerdings die Frage noch durchaus nicht für abgeschlossen. Ich möchte mich darum ausdrücklich davor hüten, etwa eine besondere Theorie für die Erklärung der gewonnenen Zahlen aufzustellen. Ich werde vielmehr die F₂ und die F₃ noch an viel größeren Zahlen mit allen Kautelen im nächsten Sommer zu untersuchen haben. Vor allem aber wird auch der F₄ eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen sein. Erst dann wird der Versuch gemacht werden müssen, die gewonnenen Zahlen entweder doch noch auf irgend einem zwanglosen Wege mit der Mendelschen Regel in Übereinstimmung zu bringen, oder aber nach einer anderen Erklärung zu suchen. Soviel aber ist klar und darauf lege ich vorläufig das Hauptgewicht: Einfache Mendelspaltung findet sich nach Kreuzung von pentasepaler Halb- und Mittelrasse hier nicht!

Sehen wir uns nun aber einmal etwas näher die Untersuchungen von DE VRIES mit Zwischenrassenkreuzungen an. Auf die Untersuchung der Kreuzung einer Halb- und einer Mittelrasse von *Trifolium pratense quinquefolium* bin ich weiter oben schon kurz zu sprechen gekommen. Nach Mitteilung meiner Versuchsergebnisse erscheint mir eine Nachunter-

suchung dieses Falles dringend geboten. Ehe eine solche durchgeführt ist, hat es keinen Zweck, darüber weitere Erörterungen anzustellen.

Viel breitere Untersuchungen hat DE VRIES ja aber mit trikotylen und synkotylen Zwischenrassen sehr verschiedener Pflanzen angestellt.

Von trikotylen Rassen wurden einmal Bastarde zwischen Halb- und Mittlrassen derselben Arten und dann solche zwischen verschiedenen Arten untersucht. Von den ersteren waren es *Antirrhinum majus*, *Cannabis sativa* und *Papaver Rhoeas*, welche untersucht wurden, von den letzteren die Bastarde *Oenothera rubrinervis* $\times$ *hirtella*, *Oe. hirtella* $\times$ *nanella*, *Oe. muricata* $\times$ *hirtella*. Von synkotylen Rassen wurde die Kreuzung zwischen *Helianthus annuus syncotyleus* $\times$ *H. annuus giganteus* untersucht.

Verfolgen wir diese Beispiele einmal etwas eingehender. Zuerst das Beispiel *Antirrhinum majus*. DE VRIES hatte innerhalb mehrerer Jahre (Mutationstheorie Bd. II, S. 275) eine reiche trikotyle Mittelrasse isoliert, welche sich dann ungefähr auf 40—79% trikotyle Keimlinge erhielt. Er kreuzte nun verschiedene Varianten der Mittelrasse mit der Halbrasse und gelangte zu folgendem Ergebnis (Mutationstheorie Bd. II, S. 297):

Kreuzung 1896.

Pflanze	Mutter (Halbrasse)	Vater (Mittelrasse)	F ₁	Mutter + Vater
				2
A $\times$ A'	2	79	11	40,5
B $\times$ B'	3	45	4	24
C $\times$ C'	2	47	6	24,5
D $\times$ D'	3	37	9	20

Die Tabelle zeigt, daß bei der Kreuzung keine Mittelbildung auftritt, vielmehr dominiert die Dikotylie, wenngleich nicht vollkommen, über die Trikotylie. Es ist aber wahrscheinlich ganz gleichgültig, ob eine Plusvariante oder eine Minusvariante der Mittelrasse der Kreuzung zugrunde gelegt wird, da ja mit dem Minusvarianten 37% in der F₁ 9% trikotyle erzielt wurden, mit der Plusvariante 79% 11%. Dieses geringe Plus der Plusvariante in der F₁ ist darum wohl nur zufälliger Natur. Zur Fortsetzung dieser Kultur wurde die aus der Kreuzung AA' erzielte F₁ benutzt. Ich stelle die in den folgenden Generationen erzielten Ergebnisse mit den DE VRIESschen Zahlen in etwas modifizierter Tabelle hier zusammen. Die F₁ kann leider nicht nach dem Mittelwert

angeführt werden, sondern nur nach den benutzten Varianten. Der Mittelwert wurde ja von DE VRIES nicht berechnet.

De Vries' Bezeichnung	Jetzt übliche Bezeichnung	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
x	P ₁ dikotyl	2 %																		
x	P ₁ trikotyl																79 %			
S	F ₁ Elternpflanze	0	2	2																
1. G	F ₂ 11 %	0	0	7	10	4	3	3	1											
2. G	F ₃ 14 %	3	7	16	8	13	4	1	6	7	1	0	0	0	2					
3. G	F ₄ 41 %	0	0	3	8	2	6	6	3	6	7	3	4	2	2	1				
4. G	F ₄ 68 %								1	0	1	3	1	5	5	11	7	4	3	1

Vergleichen wir nun einmal das Verhalten dieser Kreuzung mit den in meiner Kreuzung der pentasepalen Mittlerrassen erhaltenen Ergebnissen. In der ersten Generation fällt wieder das einseitige Verhalten auf. Es dominiert hier aber das Normale über das Anormale, die Dikotylie über die Trikotylie. Dieser Unterschied ist ja aber nicht bedeutend oder überhaupt nicht vorhanden, da wir, wie ich im nächsten Abschnitt ausführen werde, bei der Pentasepalie in der Gattung *Veronica* kaum von einer Anomalie sprechen können. In der zweiten Generation kommt eine Aufspaltung zustande. Dieselbe erstreckt sich zwar nicht so weit, wie in meinem Falle der Pentasepalie von dem einen Elter über den Typus des anderen Elters hinaus. Die Zahl der untersuchten Individuen ist aber bei DE VRIES auch viel geringer, so daß dies nicht wunderbar ist. Ein Vergleich der Streuungswerte der P₁ bzw. F₁ mit denjenigen der F₂ läßt sich nicht durchführen, da die nötigen Grundlagen fehlen, besonders in der P₁. Immerhin scheint die Streuung der F₂ größer zu sein als diejenige von F₁.

Einen sicheren Anhalt, daß die Aufspaltung dieser F₂ übereinstimmt mit dem einfachen Mendelschen Verhältnis 1 : 1 : 2, kann ich allerdings mit DE VRIES in dieser Tabelle noch nicht finden. Es ist doch immerhin sehr verwunderlich, daß trotz der Dominanz der Dikotylie in F₁ in der F₂ unter 28 Individuen gar keine Individuen wieder hervortreten, bei denen die Trikotylie auf das Maß der armen Halbrasse, nämlich 2—3 %, herabgesunken ist. Man könnte das vielleicht mit der partiellen Dominanz erklären, wenn auch nur gezwungen. Auch die Zahlenverhält-

nisse nach oben lassen sich nicht durchaus übersehen. DE VRIES hat diesen Mangel nun durch eine summarische Berechnung zu ersetzen gesucht.

Er zeigt nämlich, daß nach Mendelscher Berechnung in F_2

25 % Exemplare der Halbrasse	mit 2 %,
50 % Bastarde	mit 8 %,
25 % Exemplare der Mittelrasse	mit 50—64 %

an Trikotylen auftreten sollten.

Schon hier aus dieser Zusammenstellung geht aber der monierte Mangel an 2 %igen in der F_2 klar hervor. DE VRIES ist auf diesen Zwiespalt nicht eingegangen. Er berechnet aber nun aus dieser Zahl den durchschnittlich zu erwartenden Prozentgehalt für die ganze F_2 -Population. Derselbe wird auf 18,75 erhalten. Tatsächlich gefunden wurden 16 %. Diese Berechnung sagt uns aber gar nichts für das Zustandekommen einer monohybriden Spaltung aus im Verhältnis 1 : 1 : 2. Vor allem sind hierzu die Zahlen unzureichende. Woher kommen die 25 % Exemplare der Mittelrasse mit 50—64 %? Auf Seite 277 war uns doch mitgeteilt, daß die Mittelrasse zwischen 34 und 79 % variierte (vgl. C und D S. 277). In manchen Fällen waren die Schwankungen noch größer. Also solche Zahlen ohne eingehendere Zahlenkritik können wir Berechnungen nicht zugrunde legen. Mit ihnen können wir alles mögliche berechnen. Hier muß mit exakten Mittelwerten gearbeitet werden.

Nun betrachten wir aber die weiteren Generationen. In F_2 wurde ein Individuum mit der Erbzahl 14 % zur Nachzucht ausgewählt. Es ergab weitergehende Spaltungen von 1—65 % um den Mittelwert von ungefähr 20 %. Hierauf Wiederauswahl von Mutterexemplaren in der F_3 zu 41 % und 68 %. Das erstere ergibt eine Nachkommenschaft mit dem Mittelwert von ca. 35 %, das zweite einen solchen von ca. 67 %. Genauer läßt sich das nach den nur annähernd vorliegenden Zahlen nicht berechnen. Soviel aber scheint in Übereinstimmung mit meinen Untersuchungen über pentasepale Zwischenrassen schon hervorzugehen, daß hier im Gegensatz zu der DE VRIESschen Anschauung (vgl. S. 294) Rassen mit konstanten mittleren Erbzahlen nach der Bastardierung entstehen. Es bleibt das aber natürlich noch weiter zu verfolgen.

Die übrigen Versuche mit trikotylen und synkotylen Zwischenrassen ergeben nichts prinzipiell anderes, nur sind die Übereinstimmungen mit den berechneten Zahlen der F_2 teilweise viel schlechtere. Z. B. für *Cannabis sativa* berechnet 15,75, gefunden 7, oder für *Papaver Rhoeas* berechnet 12,37, gefunden 24. Wenn wir die schwankenden Grenzen des der Berechnung zugrunde gelegten Zahlenmaterials bedenken, so ist

auf diese Zahlen sicher kein großer Wert zu legen. Die Korrektur dadurch zustande zu bringen, daß das Ergebnis von drei ganz verschiedenen Pflanzen zusammengebracht wird, scheint mir aber doch zu gewagt.

Nach alledem möchte ich es also gänzlich unbewiesen, ja für direkt unwahrscheinlich halten, daß die trikotylen und synkotylen Zwischenrassen nach dem einfachen Mendelschen Schema sich verhalten. Wir werden hier wohl zum mindesten auf gleichsinnig polygene Merkmale kommen. Diese Dinge werden baldmöglichst genau nachzuuntersuchen sein.

Korrelation zwischen Blütengröße und Pentasepalie.

Es sind in neuerer Zeit sehr viele eingehende Untersuchungen über die gegenseitige genetische Abhängigkeit verschiedener Eigenschaften angestellt worden. Es ist aber hier durchaus nicht der Ort, etwa eingehender auf diese Untersuchungen zu sprechen zu kommen. Es existiert ja die so vorzügliche Zusammenstellung darüber in JOHANNSENS Elementen. Ich werde auch nicht auf alle Korrelationen, die sich etwa aus meinem umfangreichen Zahlenmaterial berechnen ließen, hier zu sprechen kommen. Ich werde bald Gelegenheit finden, darauf auf breiterer Grundlage unter Hinzuziehung von Korrelationserscheinungen auch bei anderen Arten der Gattung *Veronica* einzugehen. Eine kurze Behandlung der Korrelation zwischen Blüten und Kelchanomalien bei *V. Tournefortii* habe ich ja auch schon 1909 gegeben. Ein Fall der Korrelation, der auf genetischer Grundlage betrachtet werden muß, verdient aber in dem jetzigen Zusammenhange Beachtung. Wir werden auf ihn im weiteren Verlaufe noch wiederholt zurückzukommen haben.

Ich hatte schon 1909 betont, daß ich niemals eine *V. Corrensiana* mit hoher pentasepaler Mittelrasse auffinden konnte. Das war mir auch weiterhin nicht möglich. Es war hiernach natürlich sehr interessant, wie sich die Pentasepalie zu den Spaltprodukten in F_2 verhalten würde. Die exakte Feststellung der Beziehungen zwischen Blütenfärbung und Form einerseits und Pentasepalie andererseits stieß bisher noch auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Dagegen bot sich in der Größe ja ein recht gut faßbares Merkmal, welches für *Corrensiana* charakteristisch in der F_2 aufspaltete und sich nun leicht mit der Pentasepalie der Spaltungsprodukte vergleichen ließ. Ich habe eine solche Zusammenstellung in der folgenden Tabelle gegeben.

Korrelationstabelle für 1338.

% Gehalt an Penta- sepalie	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	M der Blütengröße
0—9												1						1					11
10—19														1		1		1					10,95
20—29											2	1						1					10,8 10,91
30—39									1	1	1		1	1		1	1						10,83
40—49												3	1	2	1	2	1		1				10,95
50—59								2	1	1	1	1	1		2		1			1	1		10,83
60—69								1	1		2	1	1	6	2	1		1					10,83
70—79							3			1	4	2	2		5	2	2	1	1	1		1	10,88 10,72
80—89						2	4	3	2	3	4	5	9	2	3	1	1	1	1				10,64
90—100	2	1		3	1	8	4	5	5	5	4	9	7	4	4	1	2	2		1	2		10,53

Es ließ sich hier nun nicht etwa der Korrelationskoeffizient direkt berechnen, wie das bei der Vergleichung zweier gewöhnlicher Variationsreihen möglich ist. Hier ist eine einfache Variationsreihe mit einem Falle alternativer Variabilität zu vergleichen. Die Verhältnisse liegen dabei viel komplizierter (vgl. JOHANNSEN 1913, S. 353). Ich habe infolgedessen auf diese Berechnung verzichtet und stelle die zu vergleichenden Variationsreihen derart zusammen, daß ich aus den Varianten der Blütengröße den Mittelwert für die Zehnerklassen des Prozentgehaltes an Pentasepalie berechne.

Die einzelnen Zahlenwerte sind besonders in den Klassen mit geringem Pentasepalieprozent nicht sehr gleichmäßig. Das ist gerade dort durch die geringe Anzahl der benutzten Varianten keineswegs verwunderlich. Die Zahlen lassen aber keineswegs verkennen, daß eine Korrelation zwischen der Blütengröße und der Häufigkeit der Pentasepalie besteht. Wie zu erwarten war, treten die großen Blüten mit hohem Pentasepaliegehalt viel seltener in Verbindung als die kleineren Blüten. Ein solcher Fall genetischer Korrelation zwischen der Organgröße und der Anomalie eines anderen Organes ist mir bisher nicht bekannt geworden. Es erinnert wohl am meisten an VÖCHTINGS Feststellung der negativen Korrelation zwischen Pelorie und regelmäßiger Blüte bei *Linaria spuria*. Es dürfte sich hierbei aber, wie mich die einfache Betrachtung lehrte, wohl nicht nur um eine Korrelation zwischen Größe und Anomalie handeln. Es scheinen vielmehr auch andere Merkmale der *Corrensiana*-Blüte mit der Pentasepalie nicht so häufig in Beziehung zu treten, wie mit der Tetrasepalie, doch fehlen mir dafür, wie ich schon betonte, zurzeit noch die exakten Grundlagen.

Jedenfalls stimmt aber dies Resultat durchaus überein mit dem schon mehrfach erwähnten Befunde, daß niemals bei *Veronica Corrensiana* eine hochprozentige pentasepale Rasse ausfindig gemacht werden konnte.

Die Pentasepalie in der Gattung *Veronica*.

Das Interesse, welches die Bastardierungen pentasepaler und tetrasepaler Rassen von *Aschersoniana* einerseits und *Corrensiana* andererseits bieten, ist aber mit den bisherigen Erörterungen noch keineswegs etwa erschöpft. Ich möchte nämlich die Pentasepalie nicht als eigentliche Anomalie aufgefaßt sehen. Ich wies ja schon 1909, S. 169 darauf hin — und vor mir tat es auch JUEL — daß die Pentasepalie bei der Gattung *Veronica* in den allerverschiedensten Gruppen in wechselnder Stärke

hervortritt. Einmal zeigt keineswegs nur die Sektion Pentasepala mit *Teucrium* usw. durchaus pentasepale Kelche. Auch Arten ganz anderer Sektionen sind erblich zu 100 % pentasepal. Ich habe jüngst der Verteilung der Pentasepalie in der Gattung *Veronica* meine Aufmerksamkeit zuzuwenden begonnen. Es sind erst einige anfängliche Studien, die ich da gemacht habe. Ich habe z. B. bei folgenden Arten sämtliche im Hb. Akad. Petersb. vorliegende Exemplare auf Pentasepalie hin untersucht und stets pentasepal gefunden: *V. nummularia*, *densiflora*, *macrostemon*. Ich hoffe bald zeigen zu können, wie diese völlige Pentasepalie in Gemeinschaft mit anderen Merkmalen die Herleitung dieser Arten von der ebenfalls durchaus pentasepalen Gattung *Paederota* nahelegt.

Bei vielen anderen fand ich die Pentasepalie bisher nur in Gestalt von Zwischenrassen. Wir werden annehmen können, daß die Pentasepalie mit irgend einem anderen Faktor — oder auch mehreren — um die Vorherrschaft in der Gattung *Veronica* kämpft. Das wird uns ja so besonders nahe gelegt durch unsere *V. Corrensiana*. Einmal war hier eine hochprozentige pentasepale Rasse überhaupt noch nicht zu finden möglich, dann aber zeigten uns sogar unsere Korrelationsuntersuchungen, daß die Blütengröße und vielleicht auch andere Charaktere negativ korrelativ mit der Pentasepalie verbunden sind. Was hier bei so nahe verwandten Unterarten einer Spezies realisiert ist, das wird natürlich viel wahrscheinlicher noch der Grund dafür sein, daß auch bei entfernter stehenden Spezies einmal die Pentasepalie mehr oder weniger vollständig in die Erscheinung tritt, das andere Mal aber am Erscheinen verhindert wird und es nur zu Ausbildung tetrasepaler Kelche kommen läßt. Von besonderem Interesse wäre deshalb, wenn auf dem weiter oben angedeutetem Wege noch eine völlig pentasepale *Aschersoniana* zu erziehen wäre. Ich werde das im nächsten Sommer natürlich versuchen.

Farben- und Gestaltungsverhältnisse der Blüten nach Bastardierung.

Ich habe schon weiter oben hervorgehoben, daß die Bastardierung von *Corrensiana* und *Aschersoniana* in beiden reziproken Fällen einen Bastard hervorbrachte, welcher zwischen den Eltern in bezug auf Gestaltungs- und Färbungsverhältnisse der Blüten ungefähr intermediär steht. Es ist hier ganz dasselbe der Fall wie bei der Blütengröße. Die Abbildung gibt uns von dieser intermediären Stellung einen guten Begriff. Im einzelnen habe ich schon bei der kurzen Besprechung der F_1 die Charaktere behandelt.

Von diesen Bastarden habe ich nun die in den oben schon besprochenen Übersichten erhaltenen F_2 -Familien erzogen. Wie in den Größenverhältnissen, dem Merkmal der Pentasepalie, zeigten nun diese F_2 -Familien auch in der Blütenfärbung und Gestalt durchaus keine einfache Spaltung. Die F_2 hat vielmehr stets das für Artbastarde schon seit langem bekannte Aufspalten in eine große Menge von Typen, die aber naturgemäß hier bei der nahen Verwandtschaft der beiden Elternarten einander besonders nahestehen und nur höchst minutiös unterschieden sind.

Ich werde auf die versuchsweise Analyse der Typen gleich eingehen. Hier möchte ich erst darauf hinweisen, daß diese komplizierte Aufspaltung in F_2 für die Kreuzung zweier so ungeheuer nahestehender Unterarten zweifellos neuartig ist. Die beiden Arten sind so nahe verwandt, daß sie mir erst nach und nach in meinen Kulturen bei sorgsamster Aufmerksamkeit auffielen. Es wäre leicht annehmbar gewesen, daß hier ein einfaches Mendelsches Schema der Bastardierung zugrunde liege. Es hat solches DE VRIES, wie wir sahen, ja für Farbenmerkmale von *V. Chamaedrys* festgestellt. Auch ich fand einfache Spaltungsverhältnisse nach Bastardierungen von verschiedenfarbigen Varietäten innerhalb der Gattung *Veronica*. Ich werde hierüber bald in anderem Zusammenhange für *V. syriaca* berichten.

Hier bei unseren beiden Unterarten ist von einfacher Mendelscher Spaltung keine Spur. Die F_2 bietet eine große Anzahl von allernächst verwandten Typen, die man in Einzelexemplaren, wie sie bei der Spaltung in F_2 zuerst auftreten, entweder noch gar nicht oder nur mit allergrößter Mühe scharf unterscheiden kann. Dennoch fallen, wenn man die F_2 längere Zeit eingehend mustert und studiert, nach und nach immer deutlicher bestimmte Typen heraus. Einzelne Pflanzen, welche reichlich blühen, zeigen diese Differenzen besonders deutlich, da dann kleine fluktuierende Varianten unter dem Gesamteindrucke verschwinden. Ich habe eine Anzahl besonders auffälliger solcher F_2 -Typen vom Maler unter meiner dauernden Mithilfe darstellen lassen. Man sieht in denselben die verschiedenen Einzelmerkmale der Eltern in allerwechselndster Weise kombiniert und teilweise ganz andersartige Formen auftreten.

Sehr auffällig ist das breite weiße untere Kronblatt bei 1314 oder das spitze gestrichelte bei 1309. Auch die Form 1311 (rundlich, rötlich, mit breitem stumpfem unteren Kronblatt) ist ebenso wie die sehr lebhaft blaue Form 1318 oder die ebenfalls dunkelblaue 1308 stark in die Augen springend. Besonders auffällig ist 1338, 328. Bei ihr fällt

vor allem die sehr auffällige Gabelung der breiten Blütenstreifung auf. Von dieser habe ich aber leider noch keine F_3 erzogen¹⁾. Auch andere Formen werden später noch beizufügen sein.

Ebensowenig wie beispielsweise WICHLER bei seinen *Dianthus*-Kreuzungen ist mir aber bisher eine irgendwie scharfe Einteilung der zweiten Generationen in bestimmten Zahlen immer wiederkehrender Typen gelungen. Es treten ja sicher gewisse Typen wiederholt — wenn auch wohl nicht ganz übereinstimmend — auf. Die Unterscheidung ist aber hier natürlich noch schwerer als bei der genannten *Dianthus*-Kreuzung, da die bastardierte Formen einander in unserm Falle ja noch viel näher stehen als die beiden *Dianthus*-Arten. Trotz der bisher fehlgeschlagenen Versuche in dieser Richtung werde ich im nächsten Sommer gerade auf solche Versuche nochmals meine besondere Aufmerksamkeit richten.

Beide erzeugten F_2 -Generationen ergaben übrigens im Prinzip ganz dasselbe. Nur brachte die viel größere F_2 des Jahres 1913 neben denselben Typen von 1912 auch vorher noch nicht beobachtete Typen hervor.

Von den F_2 -Pflanzen habe ich nun in der F_3 einzelne Nachkommenfamilien studieren können. Es sind die folgenden:

KV	1301	1302	1304	1307	1308	1309	1311	1314	1316	1320	1321	1323
Individuenzahl	16	71	460	66	16	7	47	5	—	54	203	16

Auch 1914 habe ich weiter noch während der Drucklegung des Manuskripts eine Reihe von F_3 eingehend untersucht.

Hier in F_3 , wo von jedem Typus eine große, teilweise nach mehreren Hunderten zählende Individuenzahl in den einzelnen Familien erzeugt wurde, waren die einzelnen in der F_2 nur schwer kenntlichen Typen ganz vorzüglich zu unterscheiden, da natürlich die Individuen jeder Familie stets zusammengestellt wurden. Alle diese Familien ergaben dabei, ganz gleichgültig, ob intermediär oder extrem, allgemein die Tatsache von besonderer Bedeutung, daß die einzelnen Familien für das Auge fast völlig gleichförmig erschienen und mit den Elterntypen der F_2 übereinstimmten. Es ist selbstverständlich, daß sich fluktuierende Varianten in den Blüten zeigten. Während mancher Entwicklungsstadien blühen aber an den einzelnen Pflanzen täglich 10—20 oder noch mehr Blüten, so daß man dann einen guten Begriff von diesen Formen bekommt.

¹⁾ Die im Jahre 1914 erzeugte F_3 , die allerdings nur sehr klein war, zeigt die Charaktere der F_2 nur wenig abgeschwächt.

Bei diesen, wie oben auseinandergesetzt, so sehr ähnlichen Typen mußte nun aber naturgemäß mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen werden. Es war vor allen Dingen auf die Vergleichung mit dem Elternmaterial besonderer Wert zu legen. Ich ging zu diesem Zwecke folgendermaßen vor: Ich betrachtete mir die Typen der F_3 und machte mir bei den einzelnen Notizen, ohne irgendwie über die entsprechende Nummer des Vorjahres unterrichtet zu sein (so beispielsweise bei 1314, 1308, 1311). Ich merkte aber sehr bald den Typ aus dem vergangenen Jahre heraus, suchte ihn auf und verglich die Stammbaumnummern der beiden Jahre. Sie zeigten sich dann immer identisch. Weiter machte ich häufig zur Identifikation folgende Probe: Ich stellte die Pflanzen mit umgekehrten Schildern durcheinander und identifizierte sie dann. Es zeigte sich stets, daß ich richtig beobachtet hatte. Es wurde also dadurch sicher, daß die verschiedenen Typen in ihren Einzelindividuen gut kenntlich waren. Ich ließ mir das auch durch Praktikanten unseres Institutes bestätigen. Denselben glückte die Identifikation allerdings anfangs lange nicht immer. Nachdem sie sich aber eingesehen hatten, ging die Sache auch bei ihnen recht gut.

Ich habe nun vor allem nach abweichenden Exemplaren in jeder Familie gesucht.

Ganz besonders im Jahre 1914 habe ich hierauf meine Aufmerksamkeit verwandt. Ich habe die Blüten der einzelnen F_3 -Familien zusammen auf runde Glasscheiben gebracht und sie dann wieder mit Glascheiben zugedeckt, so daß ich sie in völlig glatter und zum Vergleiche vorzüglich geeigneter Weise vor mir hatte. Auf diese Weise ließ sich in jedem Falle eine Unterscheidung der einzelnen F_3 -Familie in ihrem Gesamteindruck sofort gewinnen. Ich habe sehr oft die Probe gemacht und die verschiedensten Herren unseres Institutes, ohne daß dieselben vorher eine Ahnung von den Unterschieden hatten, auf die es ankam, die Unterschiede präzisieren lassen. Fast immer erkannten sie dieselben dann auch heraus.

Ganz natürlich sind nicht alle Blüten einer Kultur völlig übereinstimmend. Manche Blüte fällt ein wenig aus dem Rahmen heraus. Die Unterschiede sind aber immer nur sehr geringe gewesen, besonders bei Vergleich mit den F_2 -Familien, welche ihre viel größere Vielförmigkeit sofort erkennen ließen. Auch war die Vielförmigkeit kaum größer als diejenige des Ausgangsmaterials. Große Abweichungen traten mit Ausnahme einer offenbaren Verunreinigung mit *Aschersoniana* 1304 nicht auf. Bei den naheverwandten, so ähnlichen Formen, ganz besonders

aber bei den intermediären Formen, ist es, sobald weite Abweichungen fehlen, naturgemäß sehr schwer, den Grad und die Natur der geringen Abweichung zu präzisieren. Bei einer Anzahl besonders gut charakterisierter Formen (1314, 1308, 1311, 1318, 1410, 1415, 1413) war es zwar völlig sicher, daß sich die ganz geringen, kaum merklichen Abweichungen durchaus im Rahmen der fluktuierenden Variabilität hielten. Das ließ die Buchführung über längere Zeit deutlich erkennen, da an Stöcken, an denen manchmal eine einzelne etwas abweichende Blüte erschien, dann wieder lauter typische an den nächsten Tagen folgten. Bei einigen anderen Typen (1304, 1408, 1412) möchte ich die Möglichkeit geringfügiger Spaltung nicht völlig in Abrede stellen. Ich glaube kaum, daß man bei diesen minimalen Differenzen hier wird weiter kommen können. Immerhin werde ich es so versuchen, daß ich bei Pflanzen, die mir im Verdachte einer Abweichung stehen, die F_4 erziehen werde.

Auf jeden Fall aber ist in keiner F_3 , die ich untersucht habe, eine Spaltung zu beobachten gewesen, die nur annähernd an diejenige, welche in F_2 gewöhnlich ist, heranreichte. Das wäre aber doch, wenn es sich um freie Mendelspaltung handelte, in diesem oder jenem Falle sicher zu erwarten gewesen.

Es ist nun natürlich die Frage aufzuwerfen, wie wir uns diese große Gleichförmigkeit in den F_3 -Familien erklären wollen. Ich muß da gleich vorweg nehmen, daß jeder Erklärungsversuch in dieser Richtung auf durchaus hypothetischem Boden steht.

Am nächsten liegt es natürlich, an verkappte Mendelsche Verhältnisse zu denken. Es ist nicht im geringsten zu leugnen, daß solches hier denkbar wäre. Wir haben ja eine Menge Merkmale in den Blüten beider Unterarten *Aschersoniana* und *Corrensiana* kennen gelernt. Unteres Blatt weiß und gestreift, breit, schmal, spitz, stumpf, Streifung der ganzen Blüte, rötlicher Ton, rundliche, eckige Form usw. Denken wir uns nun vielleicht die einzelnen Merkmale noch je auf einer Anzahl von Genen beruhend, so wird kein Mensch darüber überrascht sein, in F_3 eben recht konstante Typen kennen zu lernen. Bei Kombinationen so vieler Faktoren kämen eben immer vorzüglich wieder Intermediärbildungen zustande. Die extremen Varianten werden ganz selten, geringe Abweichungen erkennt man bei den subtilen Unterschieden nicht mehr. Also, unsere scheinbar konstanten F_3 -Familien sind fertig. Da aber die einzelnen Merkmale besonders wegen gewisser fluktuierender Varianten oft schwer auslösbar sind, so wird diese Erklärung hier noch schwerer zu widerlegen sein.

Nun erheben sich aber da vor allem drei Bedenken, die man dieser Erklärung entgegensetzen könnte.

1. Wie kommt es, daß sich aus der intermediären F_2 so deutliche Typen heraussondern und aus der intermediären F_3 nicht mehr? Hier müßte doch wenigstens in einigen Fällen ganz genau derselbe Prozeß wieder zustande kommen. Wir könnten dann die extremen Typen gut als wenigstens hauptsächlich konstant anerkennen, die intermediären aber nicht mehr.

2. Die Zahlen, die für die Streuung bei der F_2 -Aufspaltung der Blütengröße gefunden wurden, welche mit den *Corrensiana*-Merkmalen sicher nicht ohne Zusammenhang sind, zeigen schon deutlich abweichende Verhältnisse. Sie lassen es wahrscheinlich sein, daß hier in der F_2 nicht mehr ganz wahllose Umkombinationen stattfinden. Es erweckt das im Zusammenhange mit den beobachteten auf Inspektion beruhenden Farben und Gestaltsbildern den Verdacht, daß es sich hier auch um ähnliches handelt.

3. Ganz allgemein: Können wir mit der Faktorenhypothese wirklich so frei immer weiter und weiter schalten und walten, wenn wir keine exakten Zahlengrundlagen mehr besitzen? Wir werden uns hiermit sogleich noch etwas allgemeiner zu beschäftigen haben.

Ich muß gestehen, ich bin der Ansicht, es wird heute ein starker Mißbrauch mit solchen Zurückführungen getrieben. Man sollte oftmals versuchen, sich viel klarer über das zu werden, was unter Mendeln zu verstehen ist. Wir können vor allen Dingen niemals dann schon sicher von Mendeln sprechen, wenn nur ein Spalten in F_2 beobachtet ist, ohne daß zugleich die Zahlenverhältnisse festgestellt wurden, welche dieser Spaltung zugrunde liegen. Meiner Ansicht nach ist ein Urteil, wie es ROEMER über WICHLERS Arbeit in Zeitschrift für Pflanzenzüchtung (1914, 2, S. 78) gibt: „WICHLER fand in F_2 , F_3 und F_4 typisches Aufspalten nach Mendel in 15 Merkmalen“, durchaus verfrüht. Wollen wir von Mendelschen Spaltungsverhältnissen sprechen, so gehört dazu unbedingt die Beobachtung der dauernden Unabhängigkeit der Gene und deren Erweisung durch die Zahlenverhältnisse, welche auf die Mendelschen Zahlenverhältnisse zurückführbar sind. Vage Spaltungsvorgänge in F_2 als Mendelspaltung zu bezeichnen, ist durchaus zu verwerfen. Solche Spaltungen waren lange vor Mendel gut bekannt und stehen mit dem Kern der Mendelschen Regeln nur in losem Zusammenhange. Das wird um so bedenklicher, wenn Untersuchungen vorliegen wie die ROSENschen an *Erophila*-Bastarden und meine eigenen an *Veronica*-Bastarden,

welche doch direkt die Möglichkeit erweisen, daß solche dauernd unabhängigen Spaltungen der Gene nichts Allgemeines sind.

Es ist aber gar nicht schwer, diese Versuchsdaten in zwangloser, an die Mendelsche Spaltung eng anschließender Weise dem Verständnis bildlich näher zu bringen. ROSEN hat das ja schon für seine *Erophila*-Bastarde versucht. Es sei mir erlaubt, ein etwas anderes Bild auszuführen.

Man spricht heute häufig ganz allgemein aus: Die Mendelsche Regel gilt für alle Fälle der Bastardierung, und meint damit, immer wird sich alles auf die Unabhängigkeit der Gene, d. h. also auf das selbständige Reagieren derselben zurückführen lassen. Man vergleicht auf der anderen Seite die Genenlehre sehr häufig mit analytischer Chemie. Wir sollten einmal nachdenken, ob heute diese Auffassungen darüber immer ganz klare sind!¹⁾

Womit können wir unsere Gene in der Chemie vergleichen? JOHANNSEN sagt auf S. 607 darüber folgendes: „Wir können (jedoch) sagen, es findet sich kein Grund für die Annahme, daß Gene als absolute Einheiten der genotypischen Konstitution betrachtet werden müssen — etwa wie die Atome der chemischen Konstitutionsformeln es (meistens) werden. Es scheint im Gegenteil a priori vielmehr wahrscheinlich, daß sie im Sinne der Radikale oder wohl besser Radikalketten der komplexen Moleküle der organischen Chemie aufgefaßt werden können. Normalerweise werden die Gene bei den Spaltungen und Rekombinationen der Genotypen während der Gametenbildung unverändert — eben als „Erb-einheiten“ — auftreten; daß sie aber gelegentlich selbst, wie chemische Gebilde, diskontinuuiert modifiziert werden können (z. B. Teile verlieren oder neue anknüpfen, oder vielleicht etwa isomer geändert werden), ist jedenfalls nicht undenkbar. Und solche Möglichkeiten gewinnen mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit, einerseits durch die sogenannten „Mutationerscheinungen“ (die wir in der folgenden Vorlesung betrachten werden), andererseits aber durch verschiedene Tatsachen der Kreuzungsforschung.“

Ich möchte diese Auffassung einmal etwas näher untersuchen, denn wir werden gleich sehen, daß ein Durchdenken dieser Ausführungen notwendig ist. JOHANNSEN und mit ihm viele andere vergleichen die Gene mit Radikalen oder mit Radikalketten der komplexen Moleküle der organischen Chemie. Schließen wir uns vorläufig einmal dieser Auf-

¹⁾ Für die Erörterung der chemischen Gesichtspunkte zog ich die Kollegen WEINLAND und KLIEGL heran; für das freundliche Eingehen auf meine Wünsche spreche ich denselben meinen herzlichsten Dank aus.

fassung an. Wenn wir das tun, müssen wir uns von vornherein darüber klar sein, daß die Radikale nicht unabhängig für sich existieren können, sondern nur als Bestandteile chemischer Verbindungen verknüpft mit anderen Radikalen. Die Gene werden aber bei der Bastardierung ausgetauscht, dem entspräche nach der Theorie ein Austausch von Radikalen, d. h. eine Umsetzung zweier Verbindungen, eine Reaktion. Mit solchen aber ist das Zustandekommen von etwas völlig Neuem verbunden. Bei der Spaltung nach Bastardierung treten nun aber von der F_2 ab immer wieder neben den neuen die ursprünglichen Formen auf. Demnach könnte es sich bei der Mendelschen Spaltung nur um eine sogenannte umkehrbare Reaktion handeln, die rückläufig werden kann. Wir wollen nun am besten einmal an einem einfachen Beispiel der organischen Chemie zeigen, zu welchen Folgerungen die konsequente Durchführung dieser Vorstellung führt.

Wenn wir Alkohol und Essigsäure in äquimolekularen Mengen miteinander vermischen, so tritt eine Umsetzung unter Bildung von Essigester ein. Diese verläuft aber nicht vollständig, sondern findet ihr Ende, sobald $\frac{2}{3}$ des vorhandenen Alkohols und der vorhandenen Säure verbraucht sind. Wenn dieser Endzustand erreicht ist, finden wir also nebeneinander Alkohol, Essigester, Essigsäure im molekularen Verhältnis von 1 : 2 : 1, oder mit anderen Worten: auf je 1 Molekül Alkohol und 1 Molekül Säure kommen 2 Moleküle Ester. Es werden demnach $\frac{2}{3}$ des Alkohols mit der Säure verestert. Dieses Verhältnis bildet sich aber keineswegs nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, wie das Verhältnis der Komponenten in der F_2 nach Spaltung entsprechend der Mendelschen Regel. Denn wenn wir gleichviel Alkohol und Essigsäuremoleküle nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit kombinieren, so würden wir, wenn wir das in die Form der Mendelschen Regel bringen, erhalten:

P_1		Alkohol		Essigsäure
	Sexualzellen	♂ Alkohol		♂ Essigsäure
		♀ Alkohol		♀ Essigsäure
F_1		<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">{ Alkohol Essigsäure</div> Essigester </div>		
	Sexualzellen	♂ Alkohol		♀ Essigsäure
		Essigsäure		Alkohol
F_2	Alkohol	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> { Essigsäure Alkohol Essigester </div>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> { Alkohol Essigsäure Essigester </div>	Essigsäure
	Alkohol			Essigsäure

Es ist klar, das Beispiel hinkt. Wollen wir aber von Radikalen sprechen, so müssen wir den Folgen auch klar ins Auge sehen. Drum habe ich ein Beispiel gewählt, welches den gesuchten Verhältnissen so nahe als möglich kommt. Aus den angeführten Zahlen ergibt sich weiter, daß nicht $\frac{2}{3}$, sondern nur die Hälfte des Alkohols und die Hälfte der Säure nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit der Veresterung unterliegen. Wir haben nämlich bei unserer ganzen bisherigen Betrachtung bis jetzt ein sehr wesentliches Moment unbeachtet gelassen, das von besonderer Bedeutung ist. Wenn wir mendeln, so entsteht aus zwei Komponenten immer eine neue Form, wenn aber zwischen zwei chemischen Verbindungen ein Radikalaustausch stattfindet, so bilden sich stets zwei Reaktionsprodukte. In unserem Beispiel wird außer Essigester noch Wasser gebildet und seine Entstehung ist gerade die Ursache dafür, daß die Reaktion unvollständig vor sich geht und rückläufig wird. Entfernen wir das entstandene Wasser, so wird die Vereinigung von Alkohol und Säure zu Ester weiter fortschreiten, ebenso würde die Esterbildung vollständiger werden, wenn wir eine der beiden Komponenten in großem Überschuß anwenden, fügen wir dem Reaktionsgemisch von Anfang an Wasser zu, so wird das Verhältnis Alkohol : Essigester : Säure 1 : 2 : 1 überhaupt nicht erreicht werden können. Nicht die Regeln der Wahrscheinlichkeit, sondern die Mengenverhältnisse der aufeinander einwirkenden Stoffe sind für die Lage des Gleichgewichts, für die Quantität des sich bildenden Essigesters das Entscheidende.

Wir erkennen also aus diesem Beispiele, so verlockend es anfangs aussieht, daß wir mit der Betrachtung von Genen als Radikale für die Mendelsche Regel auch bei diesem besonders gewählten Fall nicht zu einer befriedigenden Erklärung gelangen.

Wir können aber vielleicht anders vorgehen. Wir können die Gene als Moleküle chemischer Verbindungen bestimmter Konstitution auffassen. Diese Moleküle können nun unter Umständen wohl aufeinander reagieren. Nehmen wir dabei an, es handle sich um vollkommen verlaufende Reaktionen. Dann würden sich bei der Reaktion konstante neue Körper bilden. Durch diese könnten wir uns dann konstante Bastarde zustande kommend denken. Auch die Bildung konstanter reziproker Bastarde wäre so verständlich, wenn wir annehmen, daß in der Eizelle bezw. im Spermatozoid der beiderseitigen Eltern verschieden reagierende Körper vorhanden sind.

Wir werden aber bei solchen reagierenden Genen oder Molekülen mit reagierenden Radikalen wahrscheinlich viel eher und viel häufiger etwas durchaus anderes anzunehmen haben. Wir werden uns vorstellen müssen, daß durch diese Reaktionen neue Körper gebildet werden, welche für das Leben der Pflanze völlig ungeeignet sind oder andererseits durch sie für das Leben der Pflanze sehr wichtige Körper vernichtet werden. Reagieren die Gene nicht gleich aufeinander, sondern erst bei der endgültigen Vereinigung während der Reduktionsteilung bei der Bildung der Gameten für die F_2 -Individuen, so würde zwar der Bastard entstehen können, er würde aber unfruchtbar sein. Es ließe sich das alles noch viel weiter ausführen, doch möchte ich darauf lieber verzichten.

Nun kommen wir aber zu dem zweiten, oben als denkbar hingestellten Fall, der Genenvermischung ohne Reaktion. Es ist nach den heutigen Ergebnissen der Vererbungslehre viel wahrscheinlicher, daß es sich bei Bastardierungsfolgen weit häufiger um Vermischung von chemisch verschiedenen Körpern handelt, als um chemisch reagierende Körper. Manchmal sind ja grobe Vermischungen von verschiedenen Körpern in Pflanze und Tier nach Bastardierung unschwer festzustellen. Ich erinnere an Blüten und Haarfarbe. In anderen Fällen handelt es sich aber sicher oftmals um physikalische Vermischungen feinsten Natur, deren Komponenten bei weitem nicht in dieser einfachen Weise feststellbar sind. Diese Vermischungen brauchen aber nicht etwa zu rein intermediären Bildungen zu führen. Die Charaktere der Mischungen verhalten sich keineswegs immer so, wie sich aus den Eigenschaften der Bestandteile berechnen würde, wenn dieselben in der Mischung erhalten blieben. (NERNST, Theoret. Chemie, 6. Aufl., S. 104.) Im Gegenteil, es sind gerade die Farbenverhältnisse, das optische Verhalten usw. der Mischungen häufig durchaus einseitig. Es liegt nahe, in unserem Analogiefall hier an dominante Eigenschaften zu denken. Als anschauliches Beispiel solcher Mischungen sei auf unsere Nickelmünzen verwiesen, welche 75 % des roten Cu enthalten und trotzdem die helle weiße Farbe des Nickels zeigen.

Verfolgen wir nun die Eigenschaften solcher physikalischen Gemische etwas weiter. Wir kennen einmal solche Gemische der einfachsten Art, welche sich nach der Mischung ohne weiteres wieder entmischen lassen. Wenden wir diese Verhältnisse auf unsere Bastardierungen an. Zwei Gene werden von den beiden Eltern in den Bastard eingeführt. Hier bleiben sie in den Chromosomen nebeneinander durch die ganze vegetative, diploide Generation liegen. Sie lösen so eine Intermediärbildung

verschiedenen Grades aus. Bei der Reduktionsteilung tritt dann die eigentliche Vermischung auf. Bei der Keimzellbildung erfolgt bald darauf die Entmischung, indem nun ganz nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit die einzelnen Molekülkomplexe verteilt werden, was dann zu den glatten Mendelspaltungen führt. Diese sind bei weitem am leichtesten zu beobachten. Sie lassen sich zahlenmäßig festlegen.

Aber wie sollten wir es auch nur als wahrscheinlich annehmen, daß solche einfache Mischungen und glatte Spaltungen im Organismenreiche ganz allgemein sind! Die Betrachtung der Organismen hat stets zur Feststellung von Komplikationen und Schwierigkeiten geführt, welche in der unbelebten Materie weitaus in geringerem Maße angetroffen werden. Hier aber sollte das so anders sein. Zeigen doch die physikalischen Gemische außerhalb der Organismen schon ganz ungemein größere Komplikationen.

Denken wir z. B. an die Vermischung der Stearinsäure und Palmitinsäure, der als Spezialfall aus den Mischungsverhältnissen irgendwelcher höherer Fettsäuren herausgegriffen sei. Diese Mischung interessiert uns vor allem deswegen, weil sie einer Entmischung die allergrößten Schwierigkeiten entgegensetzt. Hier sind wohl die Moleküle beider Substanzen so stark einander durchdringend zu denken, daß sie sich nicht auf einfache Weise wieder voneinander trennen.

Ein anderes ähnliches Beispiel bildeten die Mischungsverhältnisse vieler Alkohole. Wählen wir zwei isomere Alkohole, das Isobutylkarbinol und das Sekundärbutyl-Carbinol. Dieselben vermischen sich in jedem Verhältnis und dieses Gemenge stellt den Gärungsamylalkohol (Fuselöl) vor. Dieser hat ganz andere Eigenschaften, als die beiden Ausgangsmaterialien. Dabei sind die beiden Komponenten nur unter den allergrößten Schwierigkeiten wieder voneinander zu trennen, also zu entmischen. Wir könnten die Reihe solcher Beispiele noch beliebig verlängern. Es möge aber genügen, hier noch an die beiden großen Gruppen der eutektischen Mischungen überhaupt und an die isomorphen Gemische zu erinnern. (NERNST.)

Übertragen wir nun diese Erfahrungen an Mischungen der unorganisierten Materie auf unsere Bastardierungsverhältnisse. Denken wir also, bei der Reduktionsteilung in der F_1 kommt es zur Vermischung zweier Substanzen, welche ein schwer entmischares Gemisch in der eben besprochenen Art geben. Dann würden also durch diese Mischungen F_2 -Individuen ausgelöst, welche von den Ausgangsmaterialien sehr verschieden wären. Wenn sich aber diese so entstandenen Mischungen

nicht wieder entmischen ließen, so hätten wir den Fall, daß eben diese F_2 -Individuen auch konstante Nachkommenschaft aufwiesen, da sich die Molekülkomplexe nicht unabhängig verteilen können. Es wäre aber natürlich denkbar, daß es daneben bei anderen Merkmalen in der gleichen Kreuzung auch zu leicht entmischbaren Mischungen kommen kann, welche dann normal spalten und der Mendelschen Regel folgen.

Setzen wir aber diese Darlegungen in Beziehung zu den hier aufgefundenen Verhältnissen der gleichförmigen F_3 -Generation bei unserer *Veronica*-Kreuzung oder den wohl ähnlichen Verhältnissen, welche ROSEN, wie mehrfach zitiert, an *Erophila*-Bastarden auffand, so können wir uns eben denken, daß diese F_3 -Pflanzen ihre Entstehung der Vermischung von Genen verdanken, welche zu einer schwer entmischbaren Mischung führten. Hierdurch wäre eine Erklärungsmöglichkeit gefunden, welche sich eng an die jetzt übliche Erklärung anschließt, aber den komplizierten Mischungsverhältnissen, welche vorkommen können, einigermaßen Rechnung trägt. Ich weise darauf hin, daß dieser Erklärungsversuch sowohl für die Größenverhältnisse der Blüten als deren Farben und Formverhältnisse passen würde. Der Pentasepalie würde er nicht gerecht. Dieselbe schließt sich aber wohl noch auf andere Weise den Mendelschen Regeln an.

Ich möchte nun den Leser bitten, die obigen Auseinandersetzungen durchaus als ein Bild, als eine Analogie, nicht als Theorie betrachten zu wollen. Ich bin mir durchaus bewußt, daß auch diese Vorstellungen noch viel zu grob, viel zu einfach sind, um den in den Organismen obwaltenden Verhältnissen irgendwie genauer zu entsprechen. Wir brauchen aber meiner Ansicht nach in der Bastardierungslehre jetzt ein solches Bild. Das Bild zeigt uns vor allem, wie gewagt es ist, alle schlecht oder gar nicht stimmenden Bastardierungsfälle in das Zahlenschema der Mendelschen Regel hineinpressen zu wollen. Natürlich wollen wir alles nur Denkbare tun, unsere experimentellen Ergebnisse auf diese einfachen Verhältnisse zurückzuführen. Das wird stets das erste Ziel bleiben. Es soll dieses Bild kein Faulheitspolster sein, welches von der Untersuchung Mendelscher Zahlenverhältnisse befreit. Ein übertriebener Schematismus, eine einseitig auf den Schild erhobene Theorie wäre aber meiner Überzeugung nach schädlich. Ich stimme vollkommen mit dem am Ende von BAURS Buch zitierten Ausspruch JOHANNSENS überein: Treatment — mathematical, philosophical and fantastical — may be disputable; what we want in much higher degree than commonly admitted — are well analysed pure and clear elementary premises.

Also viel mehr experimentieren und weniger theoretisieren ist die Parole für die nächste Zeit! schließt BAUR an. Mit Recht! Dieser Satz sollte aber heute recht sehr der Mendelforschung selbst voranleuchten. Denn sie beginnt aus einer experimentellen immer mehr eine theoretische zu werden. Nicht nur das, was mit der Mendelschen Theorie übereinstimmt, ist möglich! Wir wollen nicht nur bemüht sein, unsere Versuchsergebnisse auf Grund der Mendelschen Theorie zu verstehen. Es werden sich auch höhere Einheiten finden lassen, von denen der Mendelismus ein Spezialfall ist.

Die Bedeutung für die Artbildung.

LOTSY hat vor kurzem in zusammenhängender Weise über die Bedeutung der Kreuzung für die Artbildung vor allem im Anschlusse an die Kreuzungen zwischen verschiedenen *Antirrhinum*-Arten, welche von BAUR begonnen und von LOTSY weitergeführt wurden, berichtet. Es hat sich aus diesen Untersuchungen ergeben, daß offenbar im Gefolge von Genenverlust aus einzelnen Individuen der zweiten und dann auch der dritten Generation, neben einer Mehrzahl weiter spaltender dauernd konstant weiter vererbende Formen, welche sich von Arten durch nichts unterscheiden, bilden. Ich bin in dieser Zeitschrift auf diese Arbeit speziell zurückgekommen. Ich hatte an derselben einige kritische Ausstellungen zu machen, welche aber die hier interessierende Frage nicht wesentlich berühren. Die BAUR-LOTSYSchen Untersuchungen lassen deutlich erkennen, daß im Gefolge von Kreuzung in der zweiten Generation aufgetretene Typen konstant weiter vererben und so jedenfalls wohlgeschiedene, fertile Kleinarten in großer Menge darstellen.

Schon in seiner Vererbungslehre hatte dann BAUR auch auf die Kreuzung *Dianthus deltoides* $\times$ *armeria* hingewiesen, welche unter seiner Leitung von WICHLER untersucht wurde. Auch hier waren unter den sehr zahlreichen in der zweiten Generation auftretenden Typen solche beobachtet worden, welche wenigstens in Hinsicht auf die Mehrzahl der Charaktere Konstanz in den späteren Generationen zeigten. In eingehender Arbeit hat WICHLER unterdessen seine Ergebnisse dargelegt.

Diese Autoren führen die Spaltungen in ihren Artbastardierungen auf die Mendelsche Regel zurück. Es fehlen zwar hier noch die genauen Zahlenverhältnisse, welche aber bei der ungeheuren Mannigfaltigkeit an Typen kaum so bald zu erbringen sein dürften. Wir werden, da eine große Zahl von Typen, ja weitaus die Mehrzahl in der F_3 und

F₄ weiterspaltet, hier wohl auch mit größter Wahrscheinlichkeit Mendelsche Spaltung vor uns haben. Diese Frage interessiert uns an dieser Stelle aber gar nicht mehr. Wir legen jetzt den Nachdruck auf die Tatsache, daß wirklich auf dem Wege der Kreuzung Kleinarten in einer schier unübersehbaren Fülle erhalten wurden.

ROSEN hatte ja nun in seiner bedeutsamen Arbeit an dem klassischen Beispiele der Kleinarten, an *Erophila verna* ebenfalls in der F₂ ungeheuer zahlreiche Typen nach der Bastardierung von zwei *Erophila*-Kleinarten hervorgehen sehen, welche sich anders als die bisher besprochenen Spaltprodukte von *Antirrhinum* und *Dianthus* nun gleich von der F₂ an konstant erhielten. Wir haben also auch auf diesem Wege, ganz gleichgültig nun, ob wir diese völlige Konstanz von der zweiten Generation ab anerkennen wollen oder nicht, erbliche Kleinarten in der zweiten Generation sich bilden sehen.

Über diese neuen Untersuchungen wollen wir aber eine ältere Angabe nicht vergessen. SOLMS sagt (1906, S. 23): Wir wissen ferner, daß den Abkömmlingen solcher Bastarde in der zweiten Generation eine große Tendenz zum Variieren innewohnt, und daß dann aus deren Progenies durch menschliche Zuchtwahl Sippen großer Konstanz (Kulturspezies) erzogen werden können. Man vergleiche hierzu LIEBSCHERS Angaben über Gerstenkreuzungen, von deren Zutreffen ich mich an demselben Objekt (*Hordeum Rimpau*) durch selbst durchgeführte Versuche im Straßburger Garten habe überzeugen können.

An diese Untersuchungen reihen sich nun meine hier vorliegenden *Veronica*-Typen an. Auch hier entstand in der zweiten Generation eine ganz unübersehbare Fülle von Formen, bei denen sich, soweit die Blütenfarben und Formenverhältnisse zur Untersuchung kamen, große Gleichförmigkeit der F₃ ergab. Die übrigen Charaktere, wie Blattform und Wuchsform sind noch nicht zu Ende untersucht.

Es besteht nun aber gar keine Frage mehr, daß auf dem Wege der Kreuzung neue Kleinarten entstehen können. Die Formenmannigfaltigkeit kann also jedenfalls, wenngleich in etwas anderer Weise als KERNER es annahm — inwiefern in anderer Weise setzt schon LOTSY auseinander — auf Bastardierung zurückgeführt werden. Wir haben hier einen Weg die Variabilität zu erklären, die DARWIN als gegeben für seine Selektionstheorie anzunehmen gezwungen war. Die Sichtung braucht ja unter den Varianten das geeignete nur auszulesen, das ungeeignete zu vernichten und neue Arten sind umgrenzt. Wir werden das an einem Einzelbeispiele gleich näher verfolgen.

Allerdings möchte ich keineswegs, wie ich das auch an anderer Stelle schon darlegte, auf Grund dieser Untersuchung etwa mit LOTSY annehmen, daß die Kreuzung der einzige Weg sei, das Zustandekommen dieser Formenmannigfaltigkeit zu erklären. Es ist nicht im geringsten unwahrscheinlich, daß bei diesem so sehr wichtigen Vorgange die Natur die verschiedensten Wege verfolgt hat.

Ich möchte aber nun einmal kurz zeigen, wie sich gerade an die *Veronica*-Kleinarten noch verschiedenerlei interessante Gesichtspunkte anschließen.

Zuerst einmal sei auf den Ausgangspunkt unserer Untersuchungen zurückgekommen. Wir können wirklich in der Bastardierung einen wichtigen ursächlichen Faktor für die große Variabilität gerade in der Art *Veronica Tournefortii* sehen. Die große Vielförmigkeit, mit welcher uns diese Art in der Natur entgegentritt, findet in diesen Ergebnissen ihre völlig ausreichende Begründung, ganz besonders auch dadurch, daß im Gefolge spontan eingetretener Bastardierung in meinen Kulturen dieselben Erscheinungen zu beobachten waren. Die Variabilität ist ohne allen Zweifel zu einem großen Teil auf Bastardierung zurückzuführen. Mit dieser Feststellung im Zusammenhange steht aber zugleich eine sehr wichtige Lehre für die Sytematiker. Das Pulverisieren von Arten auf Grund von Herbaruntersuchungen allein, ohne Vererbungsversuche wird durchaus zwecklos. Das wird nicht nur für unsere Art gelten, sondern für viele andere. Man sollte in der wissenschaftlichen Botanik — auch in der wissenschaftlich vorgehenden systematischen Botanik — von solchen Pulverisierungen keine Notiz mehr nehmen! Ich beispielsweise werde kleine Varianten oder Subspezies innerhalb der Art *Veronica Tournefortii* und anderen entsprechenden Arten niemals anerkennen, wenn keine Vererbungsversuche dazu vorliegen.

Für das Verständnis der Gattung *Veronica* bieten diese Ergebnisse aber auch in anderer Richtung noch Anhaltspunkte, die zugleich über das spezielle Interesse für diese Gattung hinausgehen.

In der Gattung *Veronica* wurden nämlich von dem Altmeister der petites espèces JORDAN 1866 innerhalb der Art *V. cymbalaria* eine ganze Reihe von Unterarten aufgestellt und mit sehr schönen Abbildungen versehen. Desgleichen bot die Art *hederifolia* sehr viel Anlaß zur Aufstellung von Unterarten und Varietäten der verschiedensten Umgrenzung und jedermann, welcher diese letztere Art einmal aufmerksam gesammelt hat, wird über die Mannigfaltigkeit, in welcher uns die Formen derselben entgegentreten, erstaunt gewesen sein. Der

jüngst zu früh verstorbene schwedische Botaniker LIDFORS hat in seiner Arbeit über den biologischen Effekt des Anthokyans auf diese Formenmannigfaltigkeit hingewiesen und eine Untersuchung derselben in Aussicht gestellt, die uns wohl noch viel Interessantes geliefert hätte. Ich habe diese beiden mit einigen anderen Arten von mir zur Gruppe *Megasperma* zusammengefaßten Spezies in den letzten Jahren gleichfalls ziemlich eingehend im Kulturversuch studiert. Ich hoffe hierüber bald Mitteilung machen zu können. An dieser Stelle sei nur soviel hervorgehoben, als für unsere Betrachtung wesentlich ist. Von beiden Arten lassen sich einmal einige wohlgeschiedene weiter abstehende Arten abscheiden, von *V. hederifolia* die *V. triloba* Opiz und *V. sibthorpioides* Debeaux, Degen usw., von *V. cymbalaria* die *V. cymbalarioides* Blanche, im übrigen aber findet sich eine Menge von sehr wenig unterschiedenen Unterarten innerhalb dieser Gruppe. Ich habe z. B. bei *V. cymbalaria* einige davon mehrere Generationen hindurch kultiviert und völlig konstant gefunden. Eine Anzahl von ihnen läßt sich mit den JORDANSchen Kleinarten identifizieren, andere gleichen ihnen teilweise und wieder andere sind von diesen unterschieden. Die Unterarten sind durchaus nicht verschiedener als diejenigen, welche von mir durch Bastardierung von *V. Corrensiana* und *Aschersoniana* erhalten wurden. Wir werden also kaum fehl gehen, wenn wir uns auch diese Kleinarten aus Kreuzung einzelner anderer hervorgegangen denken. Kreuzungsversuche sind hier wegen der Kleinheit der Blüten und der ungünstigen Bestäubungsverhältnisse sehr schwierig auszuführen. Ich habe solche auch bis jetzt noch nicht angestellt. Natürlich wird aber nur dadurch die hier vortragene Anschauung endgültig zu beweisen sein.

Hier bei diesen Arten, wo die Fremdbestäubung sicher nur sehr gelegentlich vorkommt, werden die Kleinarten uns aber auch in der Natur wohl viel regelmäßiger entgegentreten, wie bei unserer *V. Tournefortii*, denn hier wird die Kleinart dann selten wieder durch Bastardierung zerstört. Es ist das vielleicht auch der Grund, weshalb diese Kleinarten von JORDAN aufgefunden und in seinen Kulturen konstant beobachtet wurden, während die *Tournefortii*-Unterarten bisher noch übersehen wurden, da sie immer wieder durch freie Aufkreuzung verloren gehen. Die Dinge liegen für *cymbalaria* gerade so wie für die Kleinarten von *Erophila verna*, welche auch in der Hauptsache autogam sind.

Gerade für unsere *Veronica*-Kleinarten erhebt sich da aber noch eine weitere Frage. Wenn wir eine solche große Kleinartenschar aus der Bastardierung von zwei bestimmten Kleinarten hervorgehen sehen,

da fragen wir immer, woher kommen diese unsprünglichen Kleinarten, also *Corrensiana* und *Aschersoniana* in unserem Falle? Können wir uns deren Entstehung auch auf dem Wege der Bastardierung erklären, oder aber wie ist es möglich, daß bei dauernder Aufkreuzung draußen in der Natur dennoch auf dem Wege der Kreuzung wohl umschrieben, von anderen gut getrennte Arten entstehen? Wir könnten uns nun aber wohl eine solche Vorstellung bilden, welche erklärte, daß aus unseren Kleinarten wirklich neue, festumschriebene Kleinarten hervorgehen. Die Unterschiede zwischen den extremen Typen unserer F_2 sind ja nicht so sehr viel kleiner als beispielsweise zwischen *V. polita* und *opaca*.

Einen Fall, der uns zum Verständnis dieser Vorgänge wenigstens einen Wegzeiger liefert, haben wir nun auch wieder recht hübsch innerhalb der *Veronica*-Gruppe *agrestis*. In meiner Abhandlung 1908 habe ich aufs eingehendste die Verbreitungsverhältnisse der *Veronicae* dieser Gruppe erörtert. Es hat sich dabei gezeigt, daß *V. agrestis* und *opaca* Pflanzen sind, welche im Gebirge vorzüglich gedeihen, *Veronica polita* dagegen steigt in unseren Breiten kaum bis 500—600 m ins Gebirge auf, und wenn sie doch durch Verschleppung einmal dahin kommt, geht sie regelmäßig bald zugrunde. Wie in der vertikalen Verbreitung dieser Arten finden sich auch in der horizontalen trotz des Unkrautcharakters die allergrößten Differenzen, so daß diese Arten an vielen Stellen über weite Ländergebiete getrennt vorkommen. In der Tracht oder in irgendwelchen äußeren morphologischen Verhältnissen kann man aber nicht im geringsten vermuten, daß diese Arten so sehr verschiedene klimatische Ansprüche an ihren Standort stellen, ja daß (vgl. 1909) *V. polita* beispielsweise bei einer Lichtintensität nicht mehr imstande ist, Blüten zu entfalten, bei welcher *V. agrestis* noch fröhlich blüht. Im ganzen sind alle diese drei Arten, wie ich hervorhob, einander so ähnlich, daß es des eingehendsten Studiums vieler Botaniker eines Jahrhunderts bedurfte, um sie als wohlgeschiedene, selbständige Arten zur Anerkennung zu bringen.

Wir wollen nun einmal eine Hypothese aufstellen. Wir wollen annehmen, diese drei Arten verdanken ihre Entstehung ebenso einer Bastardierung zwischen zwei hypothetischen Arten, wie unsere vielen Unterarten derjenigen zwischen *Corrensiana* und *Aschersoniana*. Sie seien vielleicht in einer F_2 als extreme Formen aufgetreten, durch unzählige Bindeglieder verbunden. Nehmen wir der Einfachheit halber an, die Bastardierung sei in einer Höhenlage erfolgt, in welcher die Elternarten ebensowohl wie die *polita* gedeihen konnten. Hierauf aber

sei die Bastardkapsel durch ein Tier, wie das bei diesen Arten oft vorkommt, einige 100 m ins Gebirge verschleppt worden. Im Gebirge konnten dann die Elternarten nicht mehr gedeihen oder vielleicht nur ungünstiger, *polita* aber verschwand sicher bald, für *agrestis* und *opaca* dagegen war es der geeignete Platz. Diese beiden sind dann an diesen Stellen weiter fortgewachsen als die für das Gebirge geeignetsten Formen. Dort haben sie im Laufe der Zeit durch Bastardierung mit noch einigen wenigen nahe verwandten Formen, vielleicht ähnlich nahe verwandt wie *polita Ludwigiana* und *Thellungiana*, alle Gene ausgeschieden, welche für das Gebirgsleben ungünstig waren, und wir haben zwei wohlumschriebene Arten vor uns.

Wir können nun sicher mit gutem Rechte annehmen, daß auch unsere verschiedenen Unterarten von *V. Tournefortii*, welche wir aus der Bastardierung gewonnen haben, an verschiedene Standorte verschieden angepaßt sein dürften. Für die *Erophila*-Bastarde scheint es ja aus ROSENS Untersuchungen hervorzugehen. Denn mit Veränderungen irgend welcher Art können sich natürlich auch solche sekundäre Dinge ändern. So könnten wir uns dann auch aus unseren *Tournefortii*-Arten im Laufe der Zeit wohlgeschiedene, festumschriebene Arten hervorgehend denken. Es wäre nun nur noch ein Punkt zu erörtern, der nämlich, wieso diese wohlumschriebenen Arten sich dann nicht mehr bastardieren lassen, wenn sie doch ursprünglich aus einer Kreuzung hervorgegangen sind. Auch das könnten wir uns wohl theoretisch verständlich machen. Ehe aber darüber nicht bestimmte Erfahrungen gesammelt sind, haben Spekulationen hierüber keinen Zweck.

Was nun allerdings die Entstehung unserer Unterarten *Corrensiana* und *Aschersoniana* durch Bastardierung anbetrifft, so wissen wir darüber ganz und gar nichts Bestimmtes. Es wäre nur mit ziemlicher Sicherheit zu sagen, daß sie schon vor oder während ihrer Einwanderung nach Westeuropa zustande gekommen sein müßte. Wir können ja, wie ich früher zeigte, schon bei den ersten Bildern, die wir von dieser Art kennen, auf das Vorhandensein der beiden Unterarten schließen. Vergleicht man die große Zahl solcher Bilder aber näher — ich verweise dazu auf meine Zusammenstellung derselben, 1909, S. 659 — so findet man auch in ihnen schon wieder eine sehr große Formenmannigfaltigkeit uns entgegentretend. Es ist wohl sicher, daß unter diesen Bildern manche sind, welche durch Bastardierung hervorgegangene Zwischenformen betreffen.

Ergebnisse.

1. Bastarde zwischen *V. Tournefortii* als weiblichem Elter und *V. agrestis*, *opaca* und *polita* konnte ich nicht erzielen.
2. Bastarde zwischen den beiden Unterarten von *V. Tournefortii* *Aschersoniana* und *Corrensiana* ließen sich herstellen. Sie erscheinen bei Betrachtung intermediär.
3. Die Blütengröße in F_1 , zwischen den Eltern stehend, spaltet in F_2 in zahlreiche minimal verschiedene Typen auf, die sich in F_3 entweder erhalten, oder teilweise vielleicht auch weiterspalteten. Die Streuungswerte der F_2 sind aber nicht größer als diejenigen von F_1 und P_1 , sondern ungefähr gleich groß. Das legt die Vermutung nahe, daß eine völlig unabhängige Spaltung der Größengene bei der Keimzellbildung in F_2 in diesem Falle nicht mehr stattfindet.
4. Die Blattgröße und die Beschaffenheit des Blattrandes steht in F_1 zwischen den Eltern. In F_2 spaltet beides auf. Wir können hieraus auf eine Beteiligung der Bastardierung an der Hervorbringung der Blattvariabilität schließen, welche systematisch sicher unberechtigt, häufig zur Artbeschreibung benutzt wurde.
5. Die Pentasepalie zeigt, wie über die ganze Pflanze auch über die einzelnen Achsen, eine in den aufeinander folgenden Jahren sich wiederholende Periodizität.
6. Arme pentasepale Halbrassen geben bei Kreuzung mit der reichen pentasepalen Mittelrasse in der F_1 völlige Dominanz des Charakters der Mittelrasse. In F_2 tritt keine einfache Mendelspaltung auf, sondern ein Spalten viel komplizierterer Art, welches mit den Mendelschen Zahlenverhältnissen nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnte. Dabei treten sehr zahlreiche Typen mit höherem Pentasepaliegehalt auf, als ihn die Eltern aufweisen.
7. Die Streuung in der F_2 ist viel größer als die Streuungswerte der Elterngenerationen und der F_1 .
8. Die F_3 -Familien zeigen in den hohen Prozentklassen mit dominierendem Merkmal Konstanz des Pentasepaliegehaltes, welchen sie von den F_2 -Eltern übernommen hatten. Die F_3 -Familien mit niederem Pentasepalieprozentgehalt, dem rezessiven Merkmal, ergeben durchweg wieder höhere Pentasepalieprozente. Die Streuungen der

- F₃-Familien sind verschieden, doch liegen die niedrigen Streuungswerte alle in den Klassen mit hohem Pentasepaliegehalt.
9. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß die DE VRIESSchen Beispiele von Zwischenrassenkreuzungen sich alle so einfach mit Mendelspaltung erklären lassen, wie es DE VRIES versuchte.
 10. Pentasepalie und Blütengröße zeigten bei der Aufspaltung nach Bastardierung von *V. Corrensiana* und *Aschersoniana* negative Korrelation. Daher erklärt sich auch, daß *V. Corrensiana* nie mit hohem Pentasepaliegehalt verbunden gefunden wurde.
 11. Die Blütenfarbe und Gestalt spaltet bei der Kreuzung von *Corrensiana* und *Aschersoniana* nicht nach einfachem Mendelschema. In F₁ verhalten sich diese Charaktere ungefähr intermediär, in F₂ spalten sie in eine Fülle erblicher Typen auf. Dieselben erweisen sich in F₃ dem Augenschein nach als konstant, sicher kaum variabler als das zur Kreuzung benutzte Ausgangsmaterial.
 12. Es wird versucht, solche von F₂ ab sehr gleichmäßigen Formen durch das Zustandekommen schwer entmischbarer Gemische bei der Genenvermischung während der Reduktionsteilung in F₁ anschaulich zu machen.
 13. Das Entstehen so vieler weitgehend konstanter Formen in F₂ nach Bastardierung zweier aufs nächste verwandter Unterarten, ist für den Artbildungsprozeß sicher von besonderem Interesse. Auch erklärt es wohl das Zustandekommen der Variabilität, die früher, und auch von DARWIN, als rätselhaft und gegeben hingenommen wurde, für zahlreiche Fälle.

Literatur.

- BAUR, Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. Berlin 1911.
- COMPTON, R. H., Notes on *Epilobium* hybrids. Journ. Botan. 1911, S. 158—163.
- EAST, E. M. A., A Mendelian interpretation that is apparently continuous. Amer. Nat. 1910, **44**, S. 65—82.
- EMERSON, R. A., Inheritance of size and shapes in plants. Amer. Nat. 1910, **44**, S. 739—746.
- FOCKE, W. O., Die Pflanzenmischlinge. Berlin 1881.
- GÄRTNER, Versuche und Beobachtungen über die Bastarderzeugung im Pflanzenreich. 1849.
- HARS, H., Über das Abfallen von Blütenteilen. Kiel, Diss. 1911, S. 39.
- HOWARD, G. L. C., The inheritance of characters of *Nicotiana Tabacum*. Memoirs of the Department of Agriculture in India Bot.-Ser. 1913, **6**, S. 114.
- JOHANNSEN, W., Elemente der exakten Erbliehkeitslehre. Jena 1913.

- JORDAN et FOURREAU, Icones ad floram Europae. 1866—1868.
- JUEL, O., Studier öfver Veronica Blomman. Acta horti Bergiani 1, Nr. 5, 1891.
- LEHMANN, E., Wanderung und Verbreitung von Veronica Tournefortii. Abhandl. Isis, Dresden 1906, S. 91.
- Vorl. Mitt. über Aussaatversuche m. Veronicis der Gruppe *agrestis*. Ber. d. deutsch. bot. Ges. **25**, 1907, S. 464.
- Veronica *agrestis* im Mittelmeergebiet, Ostafrika und Asien. Bull. de l'herb. Boiss. **7**, 1907, S. 546.
- Geschichte und Geographie der Veronicagruppe *agrestis*. Ibid. **8**, 1908, S. 229.
- Über Zwischenrassen in der Veronicagruppe *agrestis*. Zeitschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 1909, II, S. 145.
- Einige Mitteilungen zur Kenntnis der Gattung Veronica. Österr. botan. Zeitschr. 1909, Nr. 7.
- Die Vererbung quantitativ differierender Merkmale. Sammelreferat. Zeitschr. f. Bot. 1914, S. 336.
- LIDFORS, Über den biologischen Effekt des Anthocyans. Botaniska Notiser, 1909, 65—81.
- LOTSY, Hybrides entre espèces d'Antirrhinum. 4. Conf. int. de génétique. Paris 1911.
- Versuche über Artbastarde und Betrachtungen über die Möglichkeit einer Evolution trotz Artbeständigkeit. Zeitschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 1912, **8**, S. 325.
- NAEGELI, C., Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1885.
- NILSSON-EHLE, Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen II. Lunds univ. aarskrift 1911.
- ROSEN, Die Entstehung der elementaren Arten von Erophila verna. Beiträge zur Biologie der Pflanzen **10**, 1911, S. 379.
- SCHUSTER, J., Neue Veronica-Bastarde. Mitt. d. bayer. bot. Ges. 1905, Nr. 36, S. 455—459.
- Veronicæ generis hybrida nova. Fedde, Repertorium III, 1907, S. 387.
- SOLMS-LAUBACH, Pflanzengeographie. 1907.
- TAMMES, T., Ein Beitrag zur Kenntnis von Trifolium pratense quinquifolium de Vries. Bot. Zeit. **62**, 1904, S. 211.
- Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung. Rec. d. trav. botan. **8**, 1911, S. 201.
- Einige Korrelationserscheinungen bei Bastarden. Ibid. **10**, 1913, S. 69.
- VRIES, H. DE, Ber. d. deutsch. botan. Ges. 1900.
- Mutationstheorie Bd. II, 1904.
- VÖCHTING, H., Über den Einfluß des Lichtes auf die Gestalt und Anlage der Blüten. Jahrb. wiss. Bot. **25**, 1893, S. 149.
- Über Blütenanomalien. Statistische, morphologische und experimentelle Untersuchungen. Ibid. **31**, 1898, S. 331.
- WICHLER, Untersuchungen über den Bastard Dianthus armeria $\times$ Dianthus deltoides nebst Bemerkungen über einige andere Artkreuzungen der Gattung Dianthus. Zeitschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. **10**, 1913, S. 177.