Ueber nichtgonorrhoeische Ophthalmoblen- norrhöen der Neugeborenen und Säuglinge.

Von Dr. C. Credé-Hörder, Frauenarzt in Berlin-Friedenau.

Es kommt sehr oft vor, daß Neugeborene und Säuglinge, trotzdem sie kunstgerecht mit den erprobten Mitteln eingeträufelt worden sind, an Ophthalmoblenorrhoe erkranken. Es handelt sich zwar meist um leicht verlaufende, oft aber um hartnäckige Erkrankungen, die trotz sorgfältiger Therapie einen schleppenden Verlauf nehmen. Bei diesen Erkrankungen bleiben schwere Folgen fast immer aus, solange es sich nicht um gonorrhoeische Affektionen handelt.

Der oberflächliche Beobachter hält meistens alle Blennorrhöen für mehr oder weniger schwer verlaufende Gonokokkenblennorrhöen, und deshalb sind viele Statistiken unzuverlässig. Eine einfache mikroskopische Untersuchung würde in vielen Fällen ergeben, daß die Diagnose der gonorrhoeischen Ophthalmoblenorrhoe viel zu häufig gestellt wird.

Das Bild einer nichtgonorrhoeischen Ophthalmoblenorrhoe ist folgendes: Verklebung der Augenlider, Rötung der Lidspalte und deren Umgebung, mäßige ödematöse Schwellung des oberen Lides, eitrig oder serös-eitrig Sekretion, Rötung der Conjunctiva bulbi und der Conjunctiva palpebrarum, weiße, dünne Auflagerungen auf der Conjunctiva palpebrarum, Cornea hell; also makroskopisch kein Unterschied mit einer beginnenden oder ausheilenden echten gonorrhoeischen Ophthalmoblenorrhoe.

Der Verlauf dieser nichtgonorrhoeischen Erkrankung unterscheidet sich aber ganz wesentlich von der echten gonorrhoeischen Affektion dadurch, daß die Cornea nicht beteiligt ist, und durch die geringe Sekretion, die mehr einen serösen, keinen rein eitrigen Charakter hat.

Die mikroskopische Untersuchung des Sekrets ergibt nur Leukozyten und wenige Epithelzellen, ferner das Vorhandensein von Bakterien verschiedener Art, aber in geringer Anzahl.

Die Bakterien, die ich in den von mir beobachteten Fällen gefunden habe, gehörten durchweg zu folgenden großen Gruppen:

In den meisten Fällen waren es Diplokokken. Diese Diplokokken waren Doppelkugeln, Gram-positiv. Sie ließen sich auf gewöhnlichem schwach alkalischen Agar-Agar züchten. Jedenfalls handelt es sich um einen sonst harmlosen Schmarotzer der Vagina, dessen genauere Bestimmung ich nicht geben konnte. In einem Fall einer sehr hartnäckigen Blennorrhoe konnte ich typische Pneumokokken finden, ein Befund, der die Angaben von Axenfeld bestätigt und der mit der Pathologie des menschlichen Auges völlig übereinstimmt, da die Ulcera corneae der Erwachsenen hauptsächlich durch Pneumokokken entstehen.

In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Befundes versuchte ich eine möglichst genaue Feststellung der Spezies dieser Diplokokken.

Im Ausstrich des Sekrets fand ich zwischen den zahlreichen Leukozyten in dem aus der serösen Flüssigkeit gebildeten Hintergrund zahlreiche einzelstehende, mit einem hellen Hof umgebene, dabei nicht vollkommen runde, Gram-negative Diplokokken. Auf Agar gab das Sekret neben einigen Staphylokokkenkulturen oberflächliche, dünne, runde, schmutzigweiße Kulturen, die aus typischen Pneumokokken bestanden. Auf Traubenzucker übertragen, im Brutschrank bei 37° C wuchsen sie innerhalb eines Tages sehr reichlich unter deutlicher Säurebildung.

An der Hand dieses Befundes glaube ich diese Diplokokken als Fränkelsche Pneumokokken feststellen zu können.

In drei weiteren sehr rasch und mild verlaufenden Fällen fand ich dicke, an den Enden abgerundete, plumpe Stäbchen, deren Länge 2—3 μ betrug. Vielfach waren diese Stäbchen in großer Anzahl intrazellulär gelagert, und oft bildeten sie ganze Felder zwischen den Leukozyten. Auf Agar bildeten sich im Brutschrank in 24 Stunden aus dem Sekret zahlreiche Staphylokokkenkolonien, daneben stecknadelkopfgroße, runde, durchsichtige, grauweiße Kolonien. Die Gelatine wurde nicht verflüssigt. Auf Traubenzucker übertragen, erzeugten diese letzteren Kulturen reichlich Säure und entwickelten Gas. Im hängenden Tropfen er-

sahen diese Bakterien langsam beweglich. Sie waren also *Bacterium coli commune*.

Der klinische Verlauf der nichtgonorrhoeischen Ophthalmoblennorrhoe der Neugeborenen und Säuglinge ist verschieden je nach den Erregern.

Die von Gram-positiven Diplokokken erzeugten Blennorrhöen sind meistens Spätformen. Sie entstehen vorzugsweise im Säuglingsalter, seltener bei Neugeborenen, also vom 6. bis 16. Lebenstage; die Sekretion war serös und enthielt nur Spuren von Eiter. Eine indifferente palliative Therapie durch Reinigung mittels Borsäurelösung brachte die Krankheit in acht bis zehn Tagen zum völligen Stillstand, Rezidive waren jedoch nicht selten.

Die durch Pneumokokken verursachte Blennorrhoe war viel schwerer. Sie entstand am achten Lebenstage, begann mit Rötung und Schwellung. Am zweiten Tag seröse Sekretion, am 3. Tag eitrige Sekretion, am vierten Tag geringe sanguinolente eitrige Sekretion und starkes Oedem, außerdem Erkrankung des anderen Auges. Auf der stark geröteten Conjunctiva palpebrae weiße, fibröse Auflagerungen, die bei der Spülung sich allmählich ablösten unter leichten Blutungen, Conjunctiva bulbi stark gerötet; Cornea intakt. Unter allmählichem Nachlassen der Sekretion und Abstoßung zahlreicher fibröser Membranen erfolgte nach 16 Tagen die Heilung des zuerst erkrankten Auges, und nach weiteren zehn Tagen die des später erkrankten Auges. Ich konnte das Kind noch vier Wochen lang beobachten und so eine vollkommene Heilung konstatieren. Als Therapie verwendete ich Spülungen mit Borsäurelösung, die alle Stunden ausgeführt wurden. Außerdem wurden Einträufelungen mit 1,3%igem *Argentum aceticum* am ersten und fünften Tage vorgenommen.

Die drei Fälle der durch *Bacterium coli* verursachten Blennorrhöen entstanden am fünften, siebenten und elften Tag nach der Geburt und dauerten vier bis neun Tage; dabei waren sie auf ein Auge beschränkt. Die Sekretion war hauptsächlich serös und enthielt wenig Eiter. Als Therapie verwandte ich nur Spülungen mit Borsäurelösung.

Ich konnte aus meiner persönlichen Erfahrung allein in relativ kurzer Zeit nicht mehr Material sammeln, jedoch erscheint mir eine genaue Prüfung der möglichen Folgen dieser nichtgonorrhoeischen Ophthalmoblennorrhöen sehr wichtig, da wahrscheinlich, wenn diese sonst meistens sehr harmlosen Erkrankungen nicht oder ungenügend behandelt werden, langdauernde chronische, später nicht mehr leicht heilbare Konjunktivitiden erzeugt werden, die sich dann jahrelang hinschleppen.

Die Therapie dieser Krankheiten ist technisch nicht schwer und, wenn auch für den Arzt und das Pflegepersonal mühsam, so doch sehr dankbar. Deshalb ist den Geburtshelfern, den Pädiatern und den praktischen Aerzten eine genaue Prüfung und eine gewissenhafte rechtzeitige Therapie der Augen der Neugeborenen dringend zu empfehlen.

Literatur: Ahlfeld, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 14. — Derselbe, Berichte. Diese Wochenschrift 1888. — Kroner, Archiv für Gynäkologie, Bd. 25. — Schröder, Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin. Neue Folge, Bd. 44.