(Aus dem pathologischen Laboratorium der Universität in Amsterdam.)

Paroxysmale Tachykardie.

Von

Dr. S. de Boer,

Privatdozent der Physiologie.

Mit 5 Textabbildungen.

(Eingegangen am 31. Oktober 1921.)

I. Einleitung.

Wir kennen in der Klinik Anfälle plötzlicher Herzbeschleunigungen, die charakteristische Unterschiede gegenüber den gewöhnlichen Beschleunigungen aufweisen. Diese Anfälle beginnen plötzlich und nehmen wieder ebenso plötzlich ein Ende. Hierauf folgt eine posttachykardische Pause. Die Dauer eines Anfalles kann zwischen einigen Sekunden und vielen Tagen wechseln. Die gewöhnlichen Ursachen der Herzbeschleunigung (psychische Aufregung, körperliche Anstrengung, Fieber) fehlen. Die Schlagfrequenz kann bis auf 240 per Minute steigen. Die Anfälle können bei Herzen auftreten, die keine anatomischen Abweichungen zeigen. Nach Lewis und Hering haben diese Anfälle stets einen heterotopen Ursprung: sie unterscheiden aurikuläre, atrio-ventrikuläre und ventrikuläre Formen.

Wenckebach dagegen unterscheidet neben der heterotopen paroxysmalen Tachykardie eine nomotope Form. Hierzu rechnet er diejenigen Formen, welche durch Vagusdruck beendet werden können und gleichzeitig die Anfälle, bei denen die Frequenz langsamer steigt und endigt (z. B. durch Digitalis). Die drei Untersucher sind sich darüber einig, daß paroxysmale Tachykardie durch das Aussenden von Reizen in einem frequenten Tempo von einer bestimmten Stelle des Herzens aus entsteht. Mit dieser kurzen Einleitung werde ich mich hier begnügen und verweise ich wegen weiteren Besonderheiten auf die Arbeiten Wenckebachs¹⁾ und Lewis²⁾.

¹⁾ K. F. Wenckebach, Die unregelmäßige Herztätigkeit und ihre klinische Bedeutung. 1914. Verlag: W. Engelmann. S. 131.

²⁾ Th. Lewis, The mechanism and graphic registration of the heart beat 1920, S. 241.

II. Experimenteller Teil.

1. Die verschiedenen Formen von paroxysmaler Tachykardie.

Bezüglich des Wesens und der Ursache der paroxysmalen Tachykardie tasten wir bisher vollkommen im Dunkeln. Wir verfügen nur über einige Andeutungen. So wissen wir, daß paroxysmale Tachykardie und Flimmern ineinander übergehen können¹⁾. Dies deutet darauf hin, daß beide Affektionen im Wesen einander verwandt sind. Wir werden uns bei der hier folgenden Auseinandersetzung an die alte Einteilung halten und nacheinander die ventrikuläre, die aurikuläre und die atrio-ventrikuläre Form von paroxysmaler Tachykardie behandeln. Diese Einteilung ist auch zufolge der hier gegebenen neuen Gesichtspunkte völlig gerechtfertigt.

A. Die ventrikuläre Form.

Diese Form wurde von Wenckebach²⁾ beschrieben als gehäufte Extrasystolen der Kammer, wobei der Vorhofrhythmus völlig ungestört ist. Experimentell wurde von mir gehäufte Kammerextrasystolie beim Froschherzen dadurch hervorgerufen, daß ich der Kammer direkt nach Ablauf des Refraktärstadiums einen Induktionsreiz verabfolgte. Die Erregung pflanzt sich dann verlangsamt in einer Richtung durch die Kammer fort und findet nach einem Umlauf den Ausgangspunkt wieder reizbar, so daß sie aufs neue rundkreist und dies in derselben Weise viele Male hintereinander wiederholen kann. Diese gehäuften Kammerextrasystolen erscheinen also, weil im Augenblicke des Entstehens, also direkt nach Ablauf des Refraktärstadiums, die Dauer einer erzeugten Kontraktion (und gleichzeitig des Refraktärstadiums derselben) kurz ist und die Erregung langsam durch die Kammer fortgeleitet wird.

Auch durch indirekte Reizung, also nach einer Extrasystole der Vorhöfe, kann gehäufte Kammerextrasystolie erzeugt werden. In diesem Falle muß der Bedingung entsprochen werden, daß nach der Extrasystole der Vorhöfe die Erregung die Kammer sofort nach Ablauf des Refraktärstadiums erreicht. Ausführlicher wurde diese Form experimenteller paroxysmaler Tachykardie von mir in Pflügers Archiv behandelt, worauf ich hier verweise³⁾. In der Klinik kommt diese Form auch vor und ist sie daran erkennbar, daß die Kammern, unabhängig von den Vorhöfen, ein sehr frequentes Schlagtempo unterhalten. Das Schlagtempo der Vorhöfe kann entweder ungestört sein oder aber die Vorhöfe können durch retrograde Reizleitung zu Extrasystolen angeregt werden. Ein schönes Beispiel von letzterem finden wir in dem Buche

¹⁾ S. de Boer, Arch. f. d. ges. Physiol. **187**, 220. 1921.

²⁾ L. c. S. 37, Abb. 19.

³⁾ Arch. f. d. ges. Physiol. **187**, 200 (III) und 212 (V).

Lewis¹⁾ abgebildet. Ferner ist die Form der Kammerelektrogramme atypisch und hängt sie von der Richtung ab, in welcher die Erregung rundkreist (im gleichen oder im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers).

Die Erfahrung aus der Klinik hat uns gelehrt, daß bei Patienten, die gehäufte Kammerextrasystolen aufweisen, das normale Schlagtempo wiederholt durch eine Kammerextrasystole unterbrochen wird. Es ist nun merkwürdig, daß dann diese eine Extrasystole in demselben frühzeitigen Zeitpunkt der Kammerperiode entsteht wie die erste Systole einer Häufung. Zugleich ist es von Wichtigkeit, daß das Elektrogramm dieser einen Extrasystole sich in nichts von den Kammerelektrogrammen einer Häufung²⁾ unterscheidet. Es ist also wohl wahrscheinlich, daß diese eine Extrasystole in derselben Weise entstanden ist wie die erste Systole einer Häufung. Es scheint mir denn auch, daß die erste Systole einer Häufung oder eine Extrasystole der Kammer in der folgenden Weise entsteht. Wenn eine Kammersystole vollendet ist, bleibt ein bestimmter Teil des Kammermuskels (und dies kann dann ein sehr kleines Gebiet sein) in Erregung. Von hier aus pflanzt sich dann die Erregung, sobald ein reizbarer Weg entstanden ist, mit einem verlängerten latenten Stadium in einer Richtung und dann verlangsamt fort. Die Form des Kammerelektrogrammes wird dann bestimmt durch die Richtung, in welcher die Erregung rundkreist. Die folgenden Systolen einer Häufung entstehen dann in derselben Weise wie im Experiment. Diese Erklärung über das Entstehen einer Extrasystole ist allein gültig für diejenigen Extrasystolen, die im Beginne der reizbaren Kammerperiode entstehen. Diese Genese erklärt auch die Tatsache, warum bei einem und demselben Patienten eine Extrasystole oft im selben Augenblick zu Beginn der Kammerpause entsteht. Schon 1903 hat Wenckebach darauf hingewiesen, „daß von der gewöhnlichen Extrasystole eine besondere Form unterschieden werden soll, in welcher die abnorme Systole regelmäßig und in festem zeitlichem Verhältnis zur vorhergehenden normalen Systole auftritt“. Es ist selbstredend, daß die vorstehend erwähnte Erklärung nicht für diejenigen Extrasystolen gültig ist, die im letzten Teile der Kammerpause entstehen. Diese letzteren Extrasystolen verdanken ihren Ursprung fraglos dem Umstande, daß nach der langen Kammerpause ein eigenes Zentrum in den Kammern aktiv wird und eine Erregung aussendet. Es ist selbstverständlich, daß die oben dargelegte Entstehungsmöglichkeit ventrikulärer paroxysmaler Tachykardie nicht die einzig denkbare ist. Hierneben müssen wir noch Ursachen annehmen, die in einer früheren Arbeit von mir angegeben wurden (siehe Dtsch. med. Wochenschr. 1921, Nr. 26).

¹⁾ Siehe hierfür das Buch Lewis (l. c. S. 258 Abb. 240).

²⁾ L. c. S. 258. Abb. 241.

B. Die aurikuläre Form.

Die aurikuläre paroxysmale Tachykardie bietet in Wesen und Ursache keine Unterschiede zu der ventrikulären dar. Diese Form wurde von mir beschrieben als gehäufte Extrasystolen der Vorhöfe¹⁾. Die Erregung kreist hierbei viele Male nacheinander durch die Vorhöfe, während nach jeder Vorhofsystole oder nach je 2,3 oder 4 Vorhofsystolen eine Systole der Kammer folgt. In der Klinik ist diese aurikuläre paroxysmale Tachykardie unter dem Namen Flattern bekannt. Diese kurze Andeutung möge genügen, und verweise ich wegen näherer Besonderheiten auf meine vorige Mitteilung.

C. Die aurikulo-ventrikuläre Form.

Diese Form von paroxysmaler Tachykardie unterscheidet sich bei Patienten dadurch von den beiden vorangehenden Formen, daß das P-R-Intervall gewöhnlich verkürzt und der P-Ausschlag oft negativ ist. Auch über diese Form besitze ich experimentelle Data, die uns über das Wesen und die Ursache derselben näher aufklären können. Wir werden also eine Besprechung der Experimente vorhergehen lassen und darauf zu einer Darlegung der klinischen aurikulo-ventrikulären paroxysmalen Tachykardie übergehen.

In Abb. 1 sind drei Reihen Kurven von entbluteten, doppelt suspendierten Froschherzen wiedergegeben. Zugleich wurden die Elektrogramme registriert mit einer unpolarisierbaren Elektrode auf den Vorhöfen und einer auf der Kammerspitze. (Die Spannung der Saite war eine solche, daß ein mV einen Ausschlag von $1\frac{1}{2}$ mm verursachte.) In jeder Reihe wurden oben die Suspensionskurven der Kammer registriert, dann folgen die Suspensionskurven der Vorhöfe und darunter die Elektrogramme. Unten wurden kleine senkrechte Striche angebracht, in dem Augenblicke, wo jedesmal ein periodischer Sinusimpuls die Vorhöfe erreichte. (Diese Augenblicke wurden von den Suspensionskurven der Vorhöfe aus gemessen; in Wirklichkeit erreichten also die periodischen Impulse die Vorhöfe etwas früher.) Bei diesen senkrechten Strichelchen wurden die Ziffern 1, 2, 3 usw. gesetzt. Wir werden nun die oberste Aufnahme näher betrachten. Bei 1²⁾ empfangen die Vorhöfe einen Induktionsreiz, wodurch eine Extrasystole der Vorhöfe erzeugt wird. Diese Vorhofextrasystole ist interpoliert, so daß der folgende Sinusimpuls wieder eine Systole der Vorhöfe hervorruft. Nach der Vorhofextrasystole folgt eine Systole der Kammer, die verfrüht auftritt.

¹⁾ Arch. f. d. ges. Physiol. **187**, 215.

²⁾ In dem Augenblicke des Reizes wird die Saite einen Moment weggeschlagen, so daß ein Hiatus in der Saitenkurve entsteht, wodurch also zugleich der Reizmoment registriert ist.

Wir bemerken nun, daß hierauf in einem stark frequenten Tempo eine Reihe von Kammersystolen folgt. Die Vorhöfe aber pulsieren in einem stark verlangsamten Schlagtempo. Wir sehen denn auch

auf je zwei Kammersystolen eine Systole der Vorhöfe auftreten. Nach Ablauf der Reihe frequenter Kammersystolen folgt eine verlängerte Kammerpause, wonach das normale Schlagtempo wieder einsetzt, und zwar mit genau derselben Frequenz wie zu Beginn der Auf-

nahme. Was geschieht nun im Herzen, wodurch das schnelle Schlagtempo der Kammern und das langsame Schlagtempo der Vorhöfe unterhalten wird? Man könnte nun denken, daß wir hier gehäufte Extrasystolen der Kammer vor uns haben, während dann die Vorhöfe unter dem Einfluß retrograder Impulse von der Kammer aus im halbierten Rhythmus pulsieren. Diese Auffassung ist jedoch nicht ohne nähere Ergänzung zu akzeptieren, da wir doch die Sinusimpulse, die in viel frequenterem Tempo Vorhofsystolen hervorrufen können, berücksichtigen müssen. Wir sehen denn auch bei 10 den Sinus die Leitung wieder aufnehmen, nach einer viel kürzeren Vorhofpause, als der vorangehenden. Auch ist das Schlagtempo des Sinus venosus verschoben und wir können genau verfolgen, wo dies geschehen ist. M. E. ist die Erklärung unserer Aufnahme die folgende: Nach der Extrasystole der Vorhöfe, die bei 1 erzeugt wurde, entsteht eine Häufung von Kammersystolen. Nun folgt auf jede zweite Kammersystole eine Systole der Vorhöfe. Wir können dies nun auf zwei Weisen erklären:

1. Die Erregung erreicht nach der Extrasystole der Vorhöfe die Kammer längs einem kleinen Teile des Atrio-Ventrikulartrichters und kreist dann in einer Richtung durch die Kammer. Wie dies in einer früheren Mitteilung¹⁾ beschrieben ist, entsteht nun eine Reihe von gehäuften Kammersystolen. Nach jeder zweiten Kammersystole folgt dann infolge retrograder Leitung der Erregung eine Systole der Vorhöfe.

2. Nach der Extrasystole der Vorhöfe geht, ebenso wie sub 1. angegeben ist, die Erregung in einer Richtung durch die Kammer. Von dort aus erreicht die Erregung den Bulbus arteriosus und kreist sie auch in einer Richtung in diesem rund. Danach wird die Kammer wieder erreicht. Die Erregung kreist dann aufs neue durch die Kammer und erreicht darauf wieder die Vorhöfe. Diese werden von der Erregung durchlaufen, wonach letztere wieder die Kammer erreicht. So führt die Erregung jedesmal folgenden Kreislauf aus: durch die Kammer — Bulbus arteriosus — Kammer — Vorhöfe — Kammer usw. — Diese zweite Erklärung ist wahrscheinlich die richtige, wie sich aus dem folgenden ergeben wird. Wir betrachten nun die Vorhofkurven. Nach der Extrasystole der Vorhöfe bei 1, die interpoliert ist, folgt auf Impuls 4 eine Systole der Vorhöfe. Der Impuls nach 5 prallt gegen die Vorhöfe an, die dann refraktär sind. Darauf wird das Sinustempo folgendermaßen verschoben. Nach der Vorhofsystole (A^1), die durch retrograde Reizleitung entsteht, wird auch eine Systole des Sinus venosus erzeugt. Auf diese Systole des Sinus venosus kann keine Vorhofsystole folgen, weil die Erregung von den Vorhöfen aus den Sinus venosus zur Kontraktion anregte. Wäre der Sinus venosus hier nicht

¹⁾ L. c.

durch retrograde Reizleitung zur Kontraktion veranlaßt worden, dann wäre bei 6 eine Vorhofsystole gefolgt.

Daher erreichen danach die Sinusimpulse die Vorhöfe wieder bei 7, 8, 9 usw. Zwischen 5 und 6 ist also das Sinustempo verschoben. Die Impulse 7 und 8 erreichen die Vorhöfe wieder während des Refraktärstadiums.

Bei 9 erreichen nun der Sinusimpuls und die in retrograder Richtung von der Kammer aus fortgeleitete Erregung die Vorhöfe zu gleicher Zeit. Die beiden Impulse stoßen in den Vorhöfen zusammen und erlöschen beide. Hiermit nimmt der Prozeß in den Vorhöfen, aber gleichzeitig in der Kammer ein Ende. Der Umstand, daß hiermit die Reihe der erwähnten Kammersystolen auch endigt, weist wohl darauf hin, daß die obengenannte zweite Auffassung sehr wahrscheinlich die richtige ist. Danach entsteht die posttachykardische Pause für die Kammer und dann wird das normale Schlagtempo wieder aufgenommen.

Nummehr wird bei 2 nochmals ein Induktionsreiz den Vorhöfen appliziert, aber später in der Kammerperiode; (die Lücke in der Elektrogrammkurve tritt später nach dem vorangehenden R-Ausschlag auf). Somit entsteht nun eine Extrasystole der Vorhöfe, der eine verfrühte Kammersystole folgt.

Die zweite Reihe Kurven wurde bei demselben Froschherzen aufgenommen. Nach dem Induktionsreiz bei 3 entstand hier eine Tachykardie von 10 Kammerschlägen, und auch ferner waren die Verhältnisse denjenigen der obersten Aufnahme gleich. Hier wurden auch die Momente angegeben, in welchen die Sinusimpulse die Vorhöfe erreichten, so daß diese Kurven keiner fernerer Erläuterung bedürfen. Die unterste Reihe Kurven wurde bei einem andern entbluteten Froschherzen registriert. Es ist nun merkwürdig, daß auch hierbei nach dem Induktionsreiz bei 5 gleiche Kurven entstanden wie in den beiden obersten Aufnahmen. Auch die Vorhöfe pulsierten hier im langsamen Schlagtempo während der Tachykardie der Kammer. Nach dem Reize bei 6, der später in der Kammerperiode verabfolgt wurde, entstand auch hier nur eine Extrasystole der Vorhöfe, auf welche eine Kammersystole folgte.

Wenn wir nun die Kammerelektrogramme näher betrachten, dann fällt es auf, daß in allen drei Aufnahmen während der Tachykardie ein deutlicher Alternans besteht, der übrigens auch bei den Suspensionskurven der Kammern vorhanden ist. Bezüglich des Wesens dieses Alternans geben uns aber diese Aufnahmen keine nähere Aufklärung.

Wir haben hier daher eine Kammertachykardie vor uns, die durch einen Induktionsreiz hervorgerufen wurde. Während dieser Tachykardie pflanzte sich die Erregung zunächst von den Vorhöfen nach der

Kammer fort, von dort wieder zurück nach den Vorhöfen (sehr wahrscheinlich über den Bulbus arteriosus) und dann wieder nach der Kammer; also: Vorhöfe — Kammer — Bulbus arteriosus — Vorhöfe — Kammer usw. Hiermit ist also der Beweis geliefert, daß sich die Erregung beim intakten Herzen längs dem angegebenen Wege fortpflanzen und so einige Zeit hindurch zirkulieren bleiben kann. Dieser Versuch erinnert uns an ein Experiment Mines. Dieser schnitt aus einem Froschherzen den inneren Teil der Vorhöfe und der Kammer weg. Dann erhielt er einen Muskelring, der zu einem Teile aus Vorhof- und zu einem andern Teile aus Kammermuskulgewebe bestand. In diesem konnte er eine Erregung zirkulieren lassen. Dieser Versuch ist eine Variation des Muskelringexperimentes Garreys und Mines, das ich in einer vorigen Publikation beschrieb¹⁾. Die hier von mir beschriebenen Experimente wurden jedoch beim intakten Froschherzen angestellt.

Das Wesen des Kammeralternans während dieser Tachykardie können wir nicht mit Sicherheit bestimmen. Die Kurven, die in Abb. 2 wiedergegeben sind, sind diesbezüglich deutlicher. Diese sind einem anderen entbluteten Froschherzen entlehnt. (Die obersten Kurven rühren von der suspendierten Kammer her; dann folgen die Suspensionskurven der Vorhöfe und danach die Elektrogramme. Die Art der Ableitung und Saitenspannung ist dieselbe wie in Abb. 1.)

Bei 1 empfangen die Vorhöfe einen Induktionsreiz, nach welchem eine Extrasystole der Vorhöfe entstand. Die Erregung nach dieser Extrasystole ruft eine verfrühte Kammerextrasystole hervor, worauf sie nach den Vorhöfen zurückgeht und eine Systole derselben erzeugt; dann erreicht sie die Kammer wieder und spornt diese zu einer Systole an, worauf sie aufs neue nach den Vorhöfen zurückgeht und diese zur Kontraktion veranlaßt; auch nach dieser Vorhofsystole folgt wieder eine Systole der Kammer.

Abb. 2.

¹⁾ Arch. f. d. ges. Physiol. 187, 194.

Jedesmal pflanzt sich die Erregung in einer Richtung durch die Kammer und die Vorhöfe fort und bleibt so während drei Kammer- und Vorhofsystolen zirkulieren. Der Extrareiz bei 2 wird in einem viel späteren Zeitpunkt der Kammerperiode den Vorhöfen verabfolgt. Daher folgt danach nur eine Vorhofsystole und eine verfrühte Kammer-systole. Bei 3 aber empfangen die Vorhöfe wieder in einem frühen Moment der Kammerperiode einen Induktionsreiz. Darum entsteht auch nun wieder eine Tachykardie von 3 Vorhof- und Kammersystolen. Die Erregung folgt auch hier wieder dem Wege: Vorhöfe — Kammer — Vorhöfe usw.

Der Kammeralternans, der bei diesen Tachykardien vorkommt, ergibt Elektrogramme, aus welchen wir ihr Wesen direkt ablesen können. Während der großen Alternanssystolen sind nämlich die Kammer-elektrogramme vollständig mit einem R- und einem T-Ausschlag; während der kleinen Alternanssystolen aber kommt allein die basale Komponente zum Ausdruck; die Kammerspitze ist bei den kleinen Systolen also inaktiv geblieben. Die Erregung hat somit während der kleinen Alternanssystolen allein durch die Basis der Kammer zirkuliert und bei den großen Alternanssystolen durch die ganze Kammer¹⁾. Wenn ich hier jedesmal von einer zirkulierenden Erregung spreche, dann beachte man dabei, daß das Muskelgebiet, welches die Erregung erreicht hat, danach während einiger Zeit in aktivem Zustand verharret. So bleibt auch für die Elektrogramme der auf diese Weise zustandegewordenen Kammersystolen die Interferenztheorie gültig. Auch hierbei kommt das Kammerelektrogramm also zustande als ein Interferenzprodukt der basalen und apikalen Negativität. Da jedes Muskelement der Kammer während einiger Zeit in aktivem Zustande beharrt, hat die Erregung schon die Vorhöfe wieder erreicht, während die Kammer noch kontrahiert ist.

Wir können also allein dann eine paroxysmale Tachykardie durch **einen** Induktionsreiz hervorrufen, wenn dieser die Vorhöfe direkt nach Ablauf des Refraktärstadiums trifft. Die Erregung kreist dann in **einer** Richtung und

¹⁾ Es ist interessant, die Kammerelektrogramme der beiden großen Systolen des Alternans miteinander zu vergleichen. Bei der ersten Systole ist der R-Ausschlag verbreitet und der T-Ausschlag verkleinert. Diese Veränderungen entstehen infolge einer Verlangsamung der Reizleitung durch die Kammer. Vor der letzten Alternanssystole ist die Kammerpause größer als vor der ersten. Infolgedessen wird die Erregung schneller durch die Kammer fortgeleitet; dementsprechend ist der R-Ausschlag auch viel schmaler. Doch der T-Ausschlag ist kleiner. Wenn hier die Form des Kammerelektrogrammes allein durch die Geschwindigkeit der Reizleitung bedingt würde, dann müßte der T-Ausschlag größer sein. Die Verkleinerung des T-Ausschlages ist eine Folge davon, daß während der vorigen Systole allein die Basis kontrahiert hat. Daher ist nun eine Hypersystolie der Spitze und vielleicht eine Hyposystolie der Basis vorhanden.

erreicht danach die Kammer direkt nach Ablauf des Refraktärstadiums an einer *circumscribed* Stelle, so daß die Kammer auch in einer Richtung durchlaufen wird und danach werden ebenfalls an einer *circumscribed* Stelle wieder die Vorhöfe erreicht.

Diese Theorie über die atrio-ventrikuläre paroxysmale Tachykardie beim Froschherzen habe ich aufgestellt auf Grund meines bei Fröschen erhaltenen Kurvenmaterials.

Aber auch beim Menschen kommt die atrio-ventrikuläre paroxysmale Tachykardie vor. Die anatomischen Verhältnisse in bezug auf die atrio-ventrikulären Verbindungssysteme sind hier aber ganz anders. Beim Froschherzen sind die Atria längs der ganzen Atrio-Ventrikulargrenze physiologisch mit der Kammer verbunden. Hier kann also die Erregung leicht an einer bestimmten Stelle die Kammer erreichen und von dort längs einem anderen Teile der atrio-ventrikulären Verbindungssysteme nach den Vorhöfen zurückkehren. Ein Rundkreisen der Erregung durch die Vorhöfe und die Kammer ist hier also leicht möglich. Beim Menschen aber besteht der Verbindungsweg nur aus dem schmalen Hisschen Bündel. Es ist für die Physiologie und Pathologie des Herzens von großer Bedeutung, daß Stanley Kent gefunden hat, daß die physiologische Verbindung zwischen den Vorhöfen und Ventrikeln nicht auf das Hissche Bündel beschränkt ist. Kent fand, daß bei Säugetieren und beim Menschen diese Verbindung multipel ist. So beschrieb er eine muskuläre Verbindung am rechten lateralen Rande des Herzens zwischen dem rechten Vorhofe und der rechten Kammer (rechte laterale Verbindung¹). Durch Experimente mit Säugetieren wies er nach, daß die Koordination zwischen den Vorhöfen und den Kammern bestehen blieb, wenn vorsichtig alles verbindende Gewebe zwischen Vorhöfen und Kammer (einschließlich des Hisschen Bündels) durchschnitten war, außer der rechten lateralen Verbindung. Außerdem wies Kent nach, daß diese Verbindungsfasern auch die Reize von der Kammer nach den Vorhöfen fortleiten können. Wenn wir nun die vorerwähnten Experimente, die mit Froschherzen angestellt wurden, ins Auge fassen, dann ist man geneigt, auch eine derartige Sachlage während der aurikulo-ventrikulären paroxysmalen Tachykardie beim Menschen anzunehmen. Diese Neigung wird noch bestärkt durch die Untersuchungen Kents.

Wir müssen dann die folgenden Tatsachen aus der Klinik der aurikulo-ventrikulären paroxysmalen Tachykardie berücksichtigen: 1. das Wesen des Kammerelektrogrammes (dieses kann typisch oder atypisch sein; 2. die Art des P-Ausschlages (dieser kann positiv oder

¹) Quarterly journ. of physiology 7, 193. 1913. British Association Section I; Ann. Report 1915. The structure and function of the Mammalian heart.

negativ sein); 3. die Stelle des P-Ausschlages (dieser kann nach Ablauf des Kammerelektrogrammes auftreten oder auch direkt nach dem R-Ausschlag); 4. die Dauer des P-R-Intervalles (dasselbe kann verkürzt, verlängert oder normal sein).

Wir können uns nun vorstellen, daß während einer aurikulo-ventrikulären paroxysmalen Tachykardie die Erregung sich längs dem Hisschen Bündel (oder längs dem rechten oder linken Zipfel desselben) nach der Kammer fortpflanzt, von dort längs den rechten lateralen Fasern nach den Vorhöfen und dann wieder längs dem Hisschen Bündel usw. Vielleicht kann auch die umgekehrte Richtung eingeschlagen werden. Wenn es noch weitere Verbindungsfasern gibt als die rechten lateralen, dann ist auch die Möglichkeit einer Leitung längs diesen ins Auge zu fassen. Bezüglich des Wesens der Kammerelektrogramme (Punkt 1) sei bemerkt: Wenn sich die Erregung längs des ganzen Hisschen Bündels nach der Kammer fortpflanzt, wird das Kammerelektrogramm typisch sein, dagegen atypisch (rechts- oder linksseitig), wenn sich die Erregung längs eines Zipfels fortpflanzt. Es ist klar, daß das Kammerelektrogramm auch atypisch sein wird, wenn die Erregung längs den rechten lateralen Verbindungsfasern die Kammer erreicht und also in entgegengesetzter Richtung zirkuliert.

Hinsichtlich der Art des P-Ausschlages (Punkt 2) sei folgendes bemerkt: Der P-Ausschlag wird negativ sein, wenn die Erregung relativ weit von dem pacemaker (Keith - Flackscher Knoten) von der Kammer aus in die Vorhöfe eintritt. Die Erregung pflanzt sich dann nicht allein von der Eintrittsstelle nach dem Hisschen Bündel fort, sondern zugleich in der Richtung des Keith - Flackschen Knotens. Der P-Ausschlag verdankt dann die Negativität dieser, der normalen Richtung entgegengesetzten Fortpflanzung. Dagegen wird der P-Ausschlag positiv sein, wenn die Erregung von den Kammern aus relativ dicht bei dem Keith - Flackschen Knoten in die Vorhöfe tritt.

Betreffs der Stelle des P-Ausschlages (Punkt 3) sei bemerkt: Wenn die Erregung durch die Kammer zirkuliert, ist es möglich, daß direkt nach dem Umlauf die Erregung sich nach den Vorhöfen fortpflanzt. In diesem Falle wird der P-Ausschlag verhältnismäßig bald auf den R-Ausschlag folgen. Dagegen kann die Erregung sich noch nach den Vorhöfen fortpflanzen, solange die Kammern noch in Kontraktion sind. Wenn nun die Erregung sich während des letzten Augenblickes der Kammerkcontraktion nach den Vorhöfen fortpflanzt, dann wird der P-Ausschlag auf dem Kammerelektrogramm folgen.

Bezüglich der Dauer des P-R-Intervalles (Punkt 4) sei folgendes bemerkt: Wenn die Erregung von den Kammern aus die Vorhöfe unweit des Tawaraschen Knotens erreicht, dann wird das P-R-Intervall

verkürzt sein. Eine Verlängerung des letzteren kann entstehen, wenn die Eintrittsstelle in die Vorhöfe weiter vom Tawaraschen Knoten entfernt liegt. Auch kann dann die Verlängerung infolge einer durch die Tachykardie verursachten Verlangsamung der Reizleitung durch die Vorhöfe und das Hissche Bündel entstehen. Ich gebe diese Auseinandersetzung hier mit der erforderlichen Reserve, nur als einen Versuch zur Erklärung; Änderung und Ergänzung werden sich vielleicht als nötig erweisen. Wenn die im Vorstehenden gegebene Darstellung richtig ist, dann werden verschiedene Formen paroxysmaler Tachykardie, die als aurikulär beschrieben sind, zu der aurikulo-ventrikulären Form gerechnet werden müssen. Zu der letzteren aurikulären Form möchte ich allein die Fälle von aurikulärem Flattern zählen, das übrigens die einzige Form reiner gehäufter Extrasystolie der Vorhöfe ist.

2. *Das künstliche Beendigen der paroxysmalen Tachykardie.*

In den drei Aufnahmen von Abb. 1 ist die paroxysmale Tachykardie in folgender Weise geendigt: Beim Beginn der letzten Vorhofsystole (während der Tachykardie der Kammer) erreicht der zirkulierende Impuls von der Kammer aus die Vorhöfe. Gleichzeitig erreicht aber ein periodischer Sinusimpuls (bei 9) die Vorhöfe, jedoch aus entgegengesetzter Richtung. Die beiden Impulse stoßen aufeinander und erlöschen dadurch, oder — für unsere Darstellung richtiger ausgedrückt — der zirkulierende Impuls wird durch das Aufprallen auf einen periodischen Sinusimpuls ertötet, und damit nimmt die Tachykardie ein Ende. Bei der Tachykardie von Abb. 2 ist das Ende in anderer Weise herbeigeführt. Die dritte und letzte Kammersystole folgt hier auf eine längere Pause als die beiden vorhergehenden. Wenn also nach der dritten Vorhofsystole die Erregung die Kammer erreicht, ist diese besser restauriert. Daher kann sich die Erregung dann in allen Richtungen durch die Kammer fortpflanzen, und da zugleich das Refraktärstadium nun länger dauert, treffen die in verschiedenen Richtungen verlaufenden Erregungen aufeinander und erlöschen. Außerdem kann die Erregung nicht nach den Vorhöfen zurücklaufen, weil nach der längeren Pause die Leitung längs des ganzen Atrio-Ventrikulartrichters stattgefunden hat. Von einem Weiterzirkulieren der Erregung kann also hier keine Rede sein. Wenn die Erklärung über das Beendigen der Tachykardie von Abb. 1 richtig ist, dann muß es auch möglich sein, eine Tachykardie künstlich zum Stillstand zu bringen; denn wenn es gelingt, der bereits zirkulierenden Erregung eine zweite Erregung entgegenzusenden, dann werden beide zusammenstoßen und erlöschen.

In der Tat gelingt dies im Experiment.

In Abb. 3 wurde beim ersten Ausschlage des Signals nach oben den Vorhöfen ein Induktionsreiz verabfolgt¹⁾. Darauf entsteht gehäufte Extrasystolie (Flutter) der Vorhöfe oder wenigstens eine zwischen Flattern und Flimmern liegende Form (die Kammer zeigt während dieses

Abb. 3.

Vorhofflatterns drei Systolen). Während dieses Vorhofflatterns kreist also die Erregung jedesmal durch die Vorhöfe rund. Nun läßt man bei dem zweiten Ausschlag des Signals nach oben einen neuen Induktionsreiz folgen. Dieser trifft

Abb. 4.

die Vorhöfe am Ende der Dilatationslinie einer Kurve. In diesem Augenblick hat die zirkulierende Erregung die Reizstelle noch nicht erreicht; die neue Erregung findet dieses Gebiet also noch reiz-

¹⁾ In der Abbildung sind oben die Suspensionskurven der Kammer registriert; dann folgen diejenigen der Vorhöfe, dann das Reizsignal. (Durch Öffnung des primären Stromkreises entsteht ein Ausschlag nach oben, durch Schließen desselben nach unten; die Schließungsreize sind abgeblendet.) Danach folgt die Zeit in Sekunden. In Abb. 5 sind die Verhältnisse dieselben.

Abb. 5.

bar und läuft der zirkulierenden entgegen, mit der sie zusammenstößt. Dadurch endigt also das Flattern. Im Schema von Abb. 4 sind diese Verhältnisse wiedergegeben. Wir sehen hier die Reizelektrode R bei A stehen. Von hier aus fing die Erregung an zu zirkulieren. Im Momente des Reizes ist die Erregung bei B. Nach dem Reiz läuft also die neue Erregung der bereits zirkulierenden entgegen, wie dies durch den kleinen Pfeil angegeben ist.

Aber auch eine aurikulo-ventrikuläre Tachykardie können wir durch einen Reiz endigen lassen. Ein Beispiel hiervon ist in Abb. 5 wiedergegeben (siehe letzte Fußnote). Die Reizelektrode ist nun in der Atrio-Ventrikularfurche angebracht.

Beim ersten Ausschlag des Signals nach oben wurde durch einen Öffnungsinduktionsreiz eine Extrasystole der Vorhöfe erzeugt, welcher keine Systole der Kammer folgte. Beim zweiten Ausschlag des Signals nach oben wird der Reiz wiederholt mit demselben Effekt. Aber nun entsteht in der verlängerten Kammerpause eine Extrasystole der Kammer, der sich in schnellem Tempo noch zwei Kammersystolen anschließen. Durch retrograde Reizleitung folgt nun auf jede Kammer-systole eine Systole der Vorhöfe. Während der gehäuften Kammersystolen pflanzt sich also der Reiz bei diesem Herzen leicht in retrograder Richtung fort. Nach dem dritten Ausschlage des Signals nach oben sehen wir, daß dies noch während einer Kammersystole wiederholt wird. Nach dem vierten Ausschlage des Signals nach oben wird wieder eine Extrasystole der Vorhöfe herbeigeführt, der keine Systole der Kammer folgt. Ehe das Ende der Extrapause erreicht ist, entsteht eine Extrasystole der Kammer, die durch retrograde Reizleitung eine Vorhofsystole verursacht. Darauf wird bei dem 5. Ausschlag des Signals nach oben wieder ein Induktionsreiz appliziert. Nun entsteht eine kleine Extrasystole der Kammer; danach geht die Erregung zurück nach den Vorhöfen, von dort wieder nach der Kammer usw. So folgen jedesmal auf die Kammersystolen Vorhofsystolen und umgekehrt. Während dieser Tachykardie wird viermal ein Reiz verabfolgt, ohne daß die Tachykardie zum Stehen gebracht wird. Wahrscheinlich ist dies darauf zurückzuführen, daß jedesmal die erzeugte Extrasystole der Vorhöfe zu spät der vorhergehenden folgt. Beim letzten Ausschlage des Signals nach oben aber sind sowohl die Kammer als die Vorhöfe reizbar. Daher entsteht jetzt eine Extrasystole der Vorhöfe und zugleich eine solche der Kammer und dadurch endigt nun notwendigerweise das Zirkulieren der Erregung. Denn nun ist sowohl in den Vorhöfen als in der Kammer ein Damm gegen die zirkulierende Erregung aufgeworfen. Nach einer verlängerten Pause wird das normale Schlagtempo wieder aufgenommen. Man könnte nun doch denken, daß wir hier nicht mit einer aurikulo-ventrikulären

Tachykardie zu tun haben, sondern mit einer künstlichen Umwandlung des halbierten Vorhof- und Kammerrhythmus in den doppelt so schnellen normalen und danach des normalen Rhythmus der Vorhöfe und Kammer in den halbierten. Dies ist aber ausgeschlossen aus folgenden Gründen:

1. Der Sinus venosus pulsierte während des langsamen Schlagtempos nicht doppelt so schnell wie die Vorhöfe und die Kammer.

2. Während der Tachykardie ist die Dauer zweier Vorhofperioden nicht der Dauer einer Vorhofperiode des langsamen Schlagtempos gleich.

3. Bei dem zweiten und vierten Induktionsreiz wurde früher nach der vorangehenden Vorhofsystole eine kleinere Extrasystole der Vorhöfe erzeugt als nach dem fünften Reiz. Die künstliche Rhythmusumwandlung hätte dann viel eher nach dem zweiten und vierten Reiz stattgehabt haben müssen.

Wir haben also fraglos eine aurikulo-ventrikuläre Tachysystolie vor uns. Auch während dieser Tachysystolie zeigen die Kammerkurven einen deutlichen Alternans.

Berichtigung.

Auf Seite 61 sind die Texte zu den beiden Tabellen I und II verwechselt worden. Der Text zur Tabelle I gehört unter Tabelle II, der zur Tabelle II unter Tabelle I.