Regel urplötzlich einsetzende Tod weniger durch die Blutung selbst, als durch die Behinderung der Herztätigkeit bedingt, die durch die in den Herzbeutel gelangenden Blutmassen hervorgerufen wird. In bezug auf die Schußverletzungen des Herzens gilt im allgemeinen dasselbe wie von den Stichverletzungen. Der Tod tritt gewöhnlich plötzlich ein, es kann aber vorkommen, daß er erst nach Stunden oder Tagen erfolgt, während andererseits auch Fälle von Heilungen nach Schußverletzung des Herzens beobachtet worden sind.

Fischer¹⁾ fand unter 452 Fällen von Herzverletzungen 72 Heilungen, und zwar waren es 36 Fälle, die durch eine Sektion sichergestellt waren, und 36, bei denen durch die Symptome die Herzverletzung und die Heilung vermutet war. In zwölf Fällen fand Fischer Fremdkörper im Herzen, und zwar waren es sechsmal Nadeln, in fünf Fällen Kugeln, und in einem Falle war es ein Dorn, der im Herzen eingeheilt vorgefunden war. Auch Strassmann²⁾ führt aus, daß Verletzungen des Herzens keineswegs immer zu sofortiger Verblutung führen und daß zahlreiche Beispiele vorhanden sind, die dafür sprechen, daß Herzverletzungen vielfach verheilen, was nicht nur für Stich- und Schnittwunden, sondern auch für Schußwunden gelte. Strassmann verweist auf die diesbezüglichen Zusammenstellungen von Raimondi³⁾ und Brentano⁴⁾, Laforgue⁵⁾ und Nobiling⁶⁾.

Nach Verletzungen mit kleinen Spitzkugeln, namentlich mit Revolverkugeln, kann natürlich eine Heilung leichter eintreten, als wenn die Herzwunde durch ein Projektil älteren Kalibers mit großem Substanzverluste der Herzmuskulatur hervorgerufen wird.

Von großer Wichtigkeit scheint es zu sein, ob die Herzverletzung die Herzhöhle selbst eröffnet, also penetrierend ist, oder ob sie nicht penetrierend ist; in Beziehung auf den Ausgang soll indessen diese Tatsache nicht so sehr in Betracht kommen, und nach Albert⁷⁾ ist für die Beurteilung des Ausganges der Verletzung von augenscheinlich hervorragender Bedeutung die Menge des ausgetretenen Blutes, die allerdings im allgemeinen mit der Größe der Herzverletzung im Einklange steht, wobei allerdings auch kleine Verletzungen, die eine Herzhöhle nicht eröffnen, sehr große Blutungen hervorrufen können, wenn sie zufällig ein Herzgefäß selbst treffen.

In der letzten Zeit hat Tegeler⁸⁾ über eine Schußverletzung der Aorta mit eingeheilter Kugel in der Herzklappe berichtet, bei der 13 Monate nach erfolgtem Suizidversuche die Sektion einen völlig ausgeheilten Aortenschuß mit der wunderbaren Einheilung der Kugel in einer halbmondförmigen Klappe zutage förderte. Die Sektion war angeordnet worden, da der Verstorbene, ein Bergmann und Kesselreiniger, durch den elektrischen Strom bei Benutzung einer defekten Handlampe, wie amtlich festgestellt war, getötet wurde.

Bei der Sektion eines in der hiesigen Anstalt verstorbenen Kranken fand ich in dem Herzen ebenfalls eingeheilt eine 7 mm Revolverkugel, die mit dem erfolgten Tod unseres Kranken nicht in Verbindung stand. Die Veröffentlichung des Sektionsbefundes rechtfertigt einerseits einmal die Seltenheit ausgeheilter Herzverletzungen an und für sich, andererseits aber die Tatsache, daß der Verletzte (in unserem Falle infolge eines Suizidversuches) nach der doch immerhin schweren Herzverletzung noch tagelang seinen Dienst verrichtet hat und dann erst, aber nicht wegen der Herzverletzung, sondern wegen des Ausbruches einer Psychose (Paralyse) in ärztliche resp. Krankenhausbehandlung kam.

Krankengeschichte: F. D. 40 Jahre alt, stammte aus einer in psychischer Hinsicht nicht belasteten Familie; sowohl der Vater wie auch die Mutter waren indessen an Zuckerkrankheit gestorben. Ueber Krankheit in der Jugend war nichts bekannt geworden. Der Patient hatte sich vor etwa 14 Jahren syphilitisch infiziert. D. wurde im Jahre 1907/1908 sehr nervös, was er auf die frühere Syphilis zurückführte. Im März 1908 machte der Patient, weil er glaubte unheilbar krank zu sein, einen Selbstmordversuch, indem er sich, soweit festgestellt ist, zweimal in die Brust schoß. Er tat als Rendant und Standesbeamter auf einem Gute in Ostpreußen

1) Zitiert nach v. Hoffmann, Lehrbuch der gesamten Medizin 1903. — 2) Lehrbuch 1895. — 3) Rivista sperimentale, Bd. 13. — 4) Dissertation, Berlin 1890. — 5) Thèse de Paris 1894. — 6) Virchow-Hirsch's Jahresbericht 1895. — 7) l. c. — 8) Münchener medizinische Wochenschrift 1909.

Aus der Provinzial-Heilanstalt bei Ueckermünde.
(Direktor: Geh. San.-Rat Dr. Knecht.)

Ein Beitrag zur Lehre der Herzverletzungen.

Ein interessanter Sektionsbefund.

Von Oberarzt Dr. Kurt Halbey.

Die klinischen Symptome, die eine Herzverletzung durch Stich oder Schuß im Gefolge hat, sind sehr verschiedenartig. In den meisten Fällen allerdings führen Herzwunden zu einem sofortigen Tode, und der Ausgang der Verletzungen hängt am Ende von der Blutung ab, die das Interesse des Chirurgen wachruft.¹⁾

Im speziellen gehören Stichwunden des Herzens zu den gefährlichsten in bezug auf das Leben, und zwar wird der in der

1) Albert, Lehrbuch 1897.

noch vier Tage nach dem Suizidversuche Dienst, ohne daß er schwach wurde. Am 5. Tage, als er gerade eine Trauung vornahm, riß er sich plötzlich die Kleider auf und rief: „Nun kann ich es nicht mehr aushalten!“ Der Kranke wurde wegen Aufregungs- und Verwirrheitszuständen nach Königsberg i. Pr. zum Arzte gebracht und kam nach Berlin in die Charité, in der die Diagnose: „Progressive Paralyse“ gestellt wurde. Später kam D. in die psychiatrische Klinik nach Greifswald, von der er am 23. Februar 1909 in unsere Anstalt überführt wurde.

D. bot das typische Bild der progressiven Paralyse mit Pupillendifferenz ($L > R$) und aufgehobener Lichtreaktion beiderseits, Größenvorstellungen, Unorientiertheit und dauernder psychomotorischer Unruhe. Dann verfiel der Kranke körperlich infolge mangelhafter Nahrungsaufnahme und der fortwährenden Unruhe, bis am 5. September 1909 auf dem Boden der Herzschwäche plötzlich der Exitus eintrat.

Am 6. September 1909 wurde die Leichenöffnung vorgenommen, aus deren Protokoll ich nur die uns interessierenden, wichtigsten Tatsachen mitteilen will. Um die linke Mamilla waren drei ungefähr Fünzigpfennigstückgroße, hellweiße Hautstellen gruppiert, von denen zwei in der Mitte eine dunkelschwarze Pigmentierung aufwiesen. Unter der linken Mamilla am nächsten liegenden Stelle fühlte man bei Verschieben der Haut einen länglich-runden, harten Gegenstand, der, herausgeschnitten, sich als ein 7 mm Projektil eines Revolvers herausstellte, das fest in das Bindegewebe eingeheilt war. Eine Kantenverletzung der Rippe und eine Weichteilverfärbung in der Gegend der eben beschriebenen Stelle war nicht vorhanden. Die Rückseite des Brustbeins war überall glatt und glänzend, zeigte keine Narben und keine blutige Verfärbung; dasselbe galt für die gesamte Innenfläche des Brustkorbes. Beim Einschnitte in den zum größten Teile freiliegenden Herzbeutel stellte sich heraus, daß eine totale Verklebung desselben mit dem Herzen vorlag, sodaß das Herz mit dem Herzbeutel herausgeschnitten werden mußte. Schon beim Herausnehmen des Herzens fühlte man an der Spitze nahe der rechten Seite hin einen länglich-runden und harten Gegenstand, der sofort als eine Revolverkugel imponierte. Bei der Eröffnung des rechten Ventrikels fand sich in der Herzmuskulatur nahe der Spitze ein Revolverprojektil von 7 mm, gleich dem in der Brustwand gefundenen, eingeheilt, in der Richtung von rechts oben nach links unten liegend. Das Projektil reichte bis dicht unter die Herzinnenhaut, die sich durchscheinend um das Projektil legte. Ein Schußkanal war nicht nachzuweisen. Die Klappen waren überall intakt, auch das Herzohr und die großen Gefäße. Auch ließ sich keine Verletzung des Herzbeutels nachweisen. Die Abbildung zeigt deutlich den Sitz der eingeheilten Revolverkugel.

Wenn wir uns auf Grund des Sektionsbefundes ein Bild über das Zustandekommen der Herzverletzung machen wollen, so müssen wir annehmen, daß die fragliche Kugel durch die vordere Brustwand und durch den Herzbeutel gedrungen und im Herzmuskel, nahe der Herzspitze stecken geblieben ist. Sicher hat eine Blutung in dem Herzbeutel stattgefunden, auf deren Basis sich eine chronische Herzbeutelentzündung eingestellt hat, die jetzt als totale Synechie in die Erscheinung trat. Bemerkenswert und interessant ist, daß der Kranke trotz dieser schweren Verletzung in der Lage war, seinen Dienst noch zu versehen, und daß er nach der Herzverletzung noch ungefähr 17 Monate gelebt hat. Es ist anzunehmen, daß der Kranke noch lange mit der eingeheilten Kugel gelebt hätte,

wenn nicht die Paralyse resp. der Marasmus paralyticus seinem Leben ein Ziel gesetzt hätte. Unser Fall beweist wieder, daß Herzschußverletzungen nicht tödlich auszugehen brauchen und daß selbst ein Fremdkörper nach Verletzung des Herzbeutels und des Herzens selbst im Herzen stecken bleiben und einheilen kann, ohne dem Betroffenen große Störungen zu verursachen, selbst nicht einmal unmittelbar nach der Herzverletzung.