Beobachtungen auf der Sternwarte der k. u. k. Kriegs-Marine in Pola.

Die Beobachtungen nahmen am Abend des 13. November 1898 ihren Anfang. Diese Nacht war jedoch grösstentheils bewölkt und keine Sternschnuppe zu sehen.

Am 14. d. M. umzog sich der Himmel erst gegen 12^h und auch in dieser Nacht war kein Erfolg zu verzeichnen.

Erst am 15. November blieb die Nacht bis 18^h m. P. Z. ziemlich klar; von 15^h m. P. Z. an bedeckten leichte Wolken-schleier den Himmel, die jedoch nicht störten. Um 18^h m. P. Z. trat vollständige Bewölkung ein.

Die Aufschreibungen wurden tourenweise von je einem Beobachter durchgeführt, so dass wohl nur ein kleiner Theil der wirklich erfolgten Meteoritenfälle zur Wahrnehmung und Einzeichnung gelangte; das Hauptaugenmerk war dabei auf die nähere Umgebung des Sternbildes Leo major gerichtet.

Von 8^h Abends bis ungefähr 11^h m. P. Z. kamen die Meteoriten aus verschiedenen Gegenden und erst von letzter

Zeit an (das Sternbild war ca. 12^h m. P. Z. aufgegangen) nahm der grösste Theil seinen Ursprung im Löwen; eine kleine Anzahl der von 11^h bis 14^h 30^m m. P. Z. beobachteten Fälle kam aus der Gegend des Auriga. Die weiter bis 18^h m. P. Z. verzeichneten Sternschnuppen waren fast lauter Leoniden und das Maximum der Fälle trat um ungefähr 16^h 48^m ein. Im Ganzen waren 83 Meteoritenerscheinungen wahrgenommen worden, unter denen 34 der Gegend des Löwen entstammten. Nachstehend angeführte genauer verzeichnete 22 Bahnen bildeten das Material, aus dem der Radiant graphisch bestimmt wurde. Er ergab sich als in der Position $\alpha = 10^h 12^m$; $\delta = +26^\circ 30'$, also sehr nahe dem Stern μ Leonis liegend.

Am 16. November blieb der Himmel die ganze Nacht vollständig bewölkt.

Beobachter waren die Herren Linien-schiffs-Fähnriche *Eugen Kavic*, *Karl Stockert* und *Felix Neuffer*.

Verzeichniss der wahrgenommenen Leoniden 1898 Nov. 15.

Nr.	Mittlere Zeit Pola	Meteoritenbahn				Nr.	Mittlere Zeit Pola	Meteoritenbahn			
		Anfangspunkt		Endpunkt				Anfangspunkt		Endpunkt	
		α	δ	α	δ			α	δ	α	δ
1*	8 ^h 57 ^m	—	—	—	—	62*	14 ^h 50 ^m	—	—	—	—
23	12 9	15 ^h 53 ^m	+65°5	16 ^h 56 ^m	+61°0	65*	15 11	—	—	—	—
24	12 11	9 40	+57.0	8 16	+66.0	66*	15 22	—	—	—	—
25	12 21	11 12	+42.0	11 56	+48.0	67*	15 35	—	—	—	—
26	12 24	10 28	+45.0	10 52	+52.5	68*	15 40	—	—	—	—
27	12 33	8 28	+10.0	8 4	+ 6.0	69	15 46	8 ^h 24 ^m	+ 6°5	8 ^h 6 ^m	+ 3°0
33	12 56	9 56	+51.0	10 4	+60.0	71	16 31	5 52	+ 5.5	5 8	— 0.5
36	13 8	—	—	—	—	72	16 33	5 30	—12.0	5 20	—17.0
42*	13 26	—	—	—	—	73*	16 35	—	—	—	—
47	13 44	8 51	— 3.0	8 42	— 9.0	74	16 45	13 8	+38.0	13 28	+40.5
48	13 53	9 35	— 3.0	9 24	—12.0	76	16 49	9 52	+35.0	9 38	+27.0
50	14 6	7 52	—18.5	7 40	—21.0	77	16 53	11 28	+35.0	11 42	—39.0
51	14 8	8 40	0.0	8 32	— 4.0	78	17 0	13 3	+49.0	13 57	+54.0
52	14 14	8 48	+16.0	8 32	+11.5	79	17 2	11 10	+14.0	11 28	+11.5
53	14 17	10 48	+31.0	11 38	+25.5	80*	17 11	—	—	—	—
54	14 29	9 16	—11.0	9 10	—17.0	81*	17 31	—	—	—	—
56*	14 32	—	—	—	—	82*	17 35	—	—	—	—
57*	14 37	—	—	—	—	83*	17 35	—	—	—	—
61	14 46	11 20	+32.0	11 40	+32.5						

Pola, 1898 November 18.

I. Frhr. von Benko.

*) Leoniden, deren Positionen nicht sicher genug festgestellt sind, theils wegen Verschwindens im Horizont, theils wegen ungenauer Einzeichnung, und die daher bei der Construction des Radianten ausgelassen wurden.

Beobachtungen auf der Sternwarte in Taschkent.

L'observation de cet essaim, commencée le 13 novembre, m'a montré tout de suite que le nombre des Léonides était plus grand que celui des deux années précédentes.

D'après mes observations à peu près 15 Léonides sont tombés par heure.

Leur répartition par ordre de grandeur a été:

19 Léonides de 1^{re} grandeur

5 » » 2^e »

11 » » 3^{me} »

9 » » 4^{me} »

2 » » 5^{me} »

Les Léonides au-dessous de la 4^{me} grandeur sont difficiles à observer. Les météores n'appartenant pas à cet essaim n'ont pas été comptés.

Pour ce qui concerne la couleur des Léonides, tous les brillants étaient de la couleur un peu bleuâtre, à l'exception d'un seul dont la nuance était jaunâtre, mais qui ne faisait pas sûrement partie de cet essaim. Cette observation confirme bien celle de M. Hansky (C. R. CXXV, 759). Mon impression est que la couleur des Léonides se rapproche beaucoup de celle de Sirius.

Quant à leur vitesse, elle a été très variable.

La nuit du 14 novembre a été très défavorable pour les observations: des nuages ont souvent obscurci le ciel. A 13^h 8^m toute observation est devenue impossible.

Les observations que j'ai pu faire pendant les grandes éclaircies m'ont cependant suffi pour constater l'accroissement du nombre des Léonides. Le ciel ayant été tout le temps plus ou moins brumeux, je n'ai pu voir que les météores dont l'éclat égalait ou surpassait celui des étoiles de la 2^e grandeur. Ce n'est qu'une partie de la région entourant le Lion qui était observable à la fois. J'ai pu noter, par

exemple, entre 12^h 36^m et 12^h 48^m, 6 Léonides brillants dans une région qui n'avait que $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{5}$ de toute l'étendue de celle où l'on pouvait attendre des Léonides.

C'est en me basant sur ce fait que je pense qu'on aurait pu voir, cette nuit-là, jusqu'à 100 Léonides dans toute la région entourant le Lion, si le temps eût été tout à fait favorable.

Le 15 novembre les nuages ont empêché toute observation.

Je donne la position des Léonides que j'ai inscrites sur la carte:

No.	T. m. Tachkent	Apparition		Disparition		Notes
		α	δ	α	δ	
13 Novembre.						
1	12 ^h 38 ^m	146°0	+ 14°0	144°2	+ 11°5	= Sirius. Lent, presque stationnaire, d'une couleur bleuâtre. La trace restait visible 30 ^s
2	13 25	146.2	+ 24.2	154.0	+ 31.5	= * 4.5 gr. Rapide
3	13 37	140.3	+ 18.0	142.5	+ 14.0	= * 3 gr. Incertain
4	13 44	131.3	+ 15.0	122.7	+ 8.5	= * 5 gr. Rapide
5	14 8	99.0	- 16.8	88.1	- 20.8	= * 1 gr. Très rapide
6	14 15	164.2	+ 20.0	165.5	+ 14.1	= * 3 gr.
7	14 23	100.5	+ 1.0	89.5	- 2.8	= * 3 gr.
8	14 27	176.7	+ 20.4	186.2	+ 21.8	= Sirius. Incertain
9	14 28	115.0	+ 21.4	102.0	+ 17.0	= Sirius. Lent, la trace restait visible 3 ^s
10	14 34	157.0	+ 46.6	162.0	+ 51.2	= * 3 gr. Rapide
11	14 38	162.5	+ 27.0	162.7	+ 35.2	= * 4 gr. Rapide
12	14 39	168.7	+ 18.8	172.7	+ 12.9	= * 2 gr. Rapide
13	14 50	174.0	+ 41.2	183.7	+ 47.2	= * 1 gr. Rapide, trace de 2 ^s
14	14 56	165.3	+ 17.0	170.3	+ 28.7	= * 1 gr. Trace de 2 ^s
15	15 0	173.7	+ 22.0	179.2	+ 18.7	= * 4 gr. Rapide
16	15 5	167.7	+ 19.2	172.1	+ 17.0	= * 4 gr.
17	15 10	154.5	+ 46.0	220.0	+ 74.8	= * 1 gr. Lent, avec une trace
18	15 38	136.5	+ 14.0	129.5	+ 11.0	= * 3 gr. Rapide
19	15 47	169.7	+ 7.1	172.5	+ 3.0	= * 1.5 gr. Lent, avec une trace
20	15 50	162.5	+ 27.0	174.7	+ 24.2	= * 2 gr. Lent
21	15 53	176.7	+ 21.0	184.2	+ 16.3	= * 4 gr. Rapide
22	15 57	147.2	+ 18.6	146.7	+ 17.2	= * 1 gr. Très lent, presque stationnaire, trace de 3 ^s
23	16 2	143.7	+ 20.5	143.5	+ 16.0	= * 3 gr. Rapide
24	16 6	132.7	+ 40.0	128.7	+ 47.0	= * 1 gr. Rapide, avec une trace
25	16 15	200.5	+ 29.3	206.1	+ 28.0	= * 1 gr. Rapide
26	16 18	141.7	+ 1.5	141.5	- 2.0	= * 2 gr. Rapide
27	16 23	186.5	+ 28.0	192.3	+ 29.2	= * 1 gr. Avec une trace.
14 Novembre.						
28	12 36	130.3	+ 31.0	126.7	+ 32.5	= * 2 gr. Vu à travers un léger brouillard, mais assez bien observé
29	12 43	167.3	+ 56.2	170.2	+ 63	= * 2 gr. Vu à travers une légère brume
30	12 44	154.7	+ 42.6	164.3	+ 54.8	= * 1 gr. Avec une trace. Vu à travers une légère brume
31	12 45	171.3	+ 55.7	222.7	+ 73.0	= * 1 gr. Vu à travers une légère brume. En même temps vu encore 2 Léonides, de 2 ^{me} gr.
32	13 5	161.1	+ 41.0	164.1	+ 48.0	= * 2 gr. Vu à travers un léger brouillard

D'où on reçoit le radiant

$$\alpha = 151^{\circ}5 \quad \delta = +24.0$$

Tachkent, Observatoire, 1898 Nov. 21.

W. Stratonoff.