Zweitens ist die Gleichartigkeit in der Zusammensetzung der Asche des venösen und arteriellen Bluts nicht meiner Ansicht widersprechend, indem die Einäschierung ebenso auf das phosphorhaltige Fett der Blutkörperchen einwirkt, wie die Respiration. Der Unterschied in der Zusammensetzung der Aschen beider Blutarten zeigt sich daher nur, wenn das Serum derselben, ohne Blutkörperchen eingeäschert wird.

Der grosse Unterschied, den ich zwischen dem venösen und arteriellen Blutserum beobachtet habe, lässt mich glauben, dass die Menge des circulirenden Bluts weit geringer ist, als man gewöhnlich voraussetzt. —

XXIII.

Untersuchung der Ochsen-galle.

Von

Adolph Strecker.

(Annal. der Chemie und Pharm. LXV, 1.)

(Im Auszuge.)

Die Untersuchung begann mit der krystallisirten Galle, die der Verf. auf die Weise darstellte, dass zuerst im Wasserbade abgedampfte und zuletzt im Oelbade bei 120° getrocknete Ochsen-galle in möglichst wenig kaltem absolutem Alkohol gelöst und ohne die Lösung zu entfärben, mit etwas Aether versetzt wurde. Die hierbei niederfallende pflasterartige Masse ist stark gefärbt und zeigt nach längerem Stehen durch die ganze Masse Gruppen von sternförmigen Nadeln, deren Zwischenräume mit einer amorphen Substanz durchzogen sind. Die überstehende Flüssigkeit giebt bei weiterem Behandeln mit Aether noch eine grössere Menge dieser Nadeln. Die Krystalle wurden mit ätherhaltigem Weingeist ausgewaschen, stark ausgepresst und über Schwefelsäure getrocknet, worauf sie an der Luft nicht mehr zerfliessen. Der Kochsalzgehalt dieser Krystalle ist nur sehr unbedeutend. Die bei 100° getrockneten Krystalle gaben beim Verbrennen mit

chromsaurem Bleioxyd 60,5 — 60,6 Kohlenstoff und 8,63 — 8,67 Wasserstoff. Der Aschengehalt variirte von 14,0 — 15,1 p. C. Der Schwefelgehalt betrug 2,5 — 2,7 p. C. und der Stickstoffgehalt 2,8 p. C.

Cholsäure.

Die wässrige Lösung dieser Krystalle wurde mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, bis sich eine geringe Trübung zeigte. Nach einiger Zeit bildeten sich sternförmig gruppirte Nadeln, zwischen denen sich ölartige Tropfen zeigten; nach 12 Stunden bildete die Flüssigkeit eine weisse Masse, die auf ein Filter gebracht und mit kaltem Wasser ausgewaschen wurde; die zurückbleibende, schneeweisse, voluminöse Krystallmasse wurde zwischen Papier ausgepresst. Die Darstellung dieser Krystalle gelingt auch, indem man den aus der nach Theyer und Schlossers Methode durch Schwefelsäure gereinigten Galle erhaltenen Niederschlag mit Aether übergiesst. — Die von anhängender Schwefelsäure befreiten Krystalle, wurden mit Wasser gekocht, wobei sie sich zum grösseren Theil lösten; die kochend filtrirte Lösung schied beim Erkalten eine Menge von feinen Nadeln aus, zu welchen die ganze Flüssigkeit erstarrte. Diese Krystalle besaßen vollkommen die Eigenschaften von Gmelins Cholsäure. Es sind weisse, feine Nadeln, die auf dem Filter sehr voluminös sind, nach und nach sich zusammenziehen und das Papier als ein dünnes, seidenglänzendes Blatt bedecken. 1000 Th. Wasser lösen 3,3 Th. 1000 Th. siedendes Wasser 8,3 Th. der Säure. Die Säure löst sich äusserst leicht in Alkohol, die Lösung hinterlässt beim Abdampfen im Wasserbade eine syrupdicke, dann noch consistentere, harzartige Masse; in Aether ist die Säure sehr wenig löslich; in concentrirter kalter Schwefelsäure, sowie in Salzsäure und Essigsäure löst sie sich in reichlicher Menge; in wässrigem Ammoniak, verdünnter Kali- und Natronlauge löst sie sich ebenfalls leicht, auf Zusatz von Säuren fällt ein harzähnlicher Niederschlag, der sich nach längerem Stehen in Wawelit-ähnliche Krystalle verwandelt. Schneller geschieht diese Umwandlung der Säure in Krystalle durch Aether. Die wässrige Lösung giebt mit Kalk-, Baryt-, Strontian- und Talkerdesalzen keinen Niederschlag, mit essigsaurem Bleioxyd entsteht ein flockiger, worauf mit Bleiessig ein neuer, geringer Niederschlag entsteht.

Kupfersalze erzeugen bläulich-weiße, Eisenchlorid gelbliche Flocken; salpetersaures Silberoxyd giebt mit einer Lösung von 1 p. C. Cholsäure, einen starken, gallertartigen Niederschlag, der sich beim Kochen von verdünnter Lösung ganz auflöst und beim Erkalten wieder abscheidet; durch langsames Abkühlen oder durch Eintröpfeln von Aether lässt sich dieser Niederschlag krystallinisch erhalten.

Paracholsäure.

Diejenige Substanz, welche bei der Behandlung des durch Schwefelsäure aus der krystallisirten Galle erhaltenen Niederschlags mit siedendem Wasser zurückblieb, wurde wiederholt mit Wasser ausgekocht, bis das Filtrat beim Erkalten keine Krystalle mehr absetzte. Der auf dem Filter zurückbleibende Rückstand stellte perlmutterglänzende Blättchen dar; dieselben Krystalle zeigten sich auch bei der mikroskopischen Untersuchung der aus der wässrigen Lösung krystallisirten Cholsäure, zwischen den beinahe haarförmigen Krystallen derselben, beim Kochen mit Wasser blieben die Blättchen ungelöst zurück. Mit Ausnahme der Verschiedenheit der Form und der Löslichkeit in Wasser konnte ich keinen Unterschied von der Cholsäure wahrnehmen. Sie lösten sich leicht in Alkohol und wurden aus dieser Lösung durch Wasser in nadelförmigen Krystallen gefällt, die sich nun grösstentheils in Wasser lösten und sich wie Cholsäure verhielten. Es hatte offenbar eine Umwandlung der in Wasser unlöslichen Substanz in Cholsäure stattgefunden, so wie sich umgekehrt bei der Krystallisation aus Wasser letztere Säure theilweise in die erstere umgesetzt hatte. Da die Analyse keinen Unterschied in der Zusammensetzung beider Substanzen zeigte, so lassen sich beide als Modificationen derselben Säure ansehen; ich bezeichne die unlösliche mit dem Namen *Paracholsäure*. In den Salzen beider Säuren schienen die Modificationen nicht fort zu bestehen. Um zu untersuchen, ob die Cholsäure fertig gebildet in der krystallisirten Galle enthalten, oder erst als Zersetzungsproduct durch Schwefelsäure zu betrachten sei, wurde frische Galle mit Bleizuckerlösung gemischt, der gelbe, flockige Niederschlag abfiltrirt und gewaschen. Die alkoholische Lösung desselben wurde mit Schwefelwasserstoff zersetzt, das Schwefelblei abfiltrirt und Wasser hinzugesetzt, bis die Flüssigkeit sich

trübte; nach 12 Stunden hatte sich das luftdicht verschlossene Gefäss mit einer Menge von weissen, sternförmigen Nadeln angefüllt, die aus einem Gemenge von *Cholsäure* und *Paracholsäure* bestanden. Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass die Cholsäure fertig gebildet in der frischen Ochsen-galle vorkommt und hauptsächlich in dem durch Bleizucker bewirkten Niederschlage enthalten ist. Beide Säuren zeigen die Pettenkofer'sche Gallenreaction mit Schwefelsäure und Zucker in hohem Grade.

Die Analysen dieser Säuren führten zu der Formel:

welche folgende Zusammensetzung giebt:

	Aequiv.		Theorie.	Mittel d. Analysen.
Kohlenstoff	52	312	67,10	67,13
Wasserstoff	43	43	9,25	9,31
Stickstoff	1	14	3,01	2,98
Sauerstoff	12	96	20,64	20,58
		<hr/> 465	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00.

Cholsaures Natron. Die Cholsäure löst sich in verdünnter Aetznatron- oder kohlen-saurer Natronflüssigkeit leicht auf, und auf Zusatz von concentrirter Natronlösung scheidet sich cholsaures Natron als amorphe, weisse Masse aus. Zur Darstellung des reinen Salzes wurde Cholsäure in kohlen-saurem Natron gelöst, die möglichst neutrale Lösung im Wasserbade zur Trockne verdampft, der Rückstand in absolutem Alkohol gelöst und die Lösung mit Aether versetzt; das Salz schied sich binnen Kurzem in sternförmig gruppirten, weissen Nadeln aus. Es löst sich leicht in Wasser, weniger in absolutem Alkohol. Beim Erhitzen schmilzt das Salz, brennt mit russender Flamme und hinterlässt eine leicht schmelzbare Asche, welche cyansaures Natron enthält. Die Analyse dieses Salzes giebt die Formel:

das *Kalialz* gleicht dem Natronsalz in jeder Beziehung.

Cholsaures Ammoniak. Leitet man durch eine Lösung von Cholsäure in absolutem Alkohol trocknes Ammoniakgas, so bilden sich nach kurzer Zeit nadelförmige Krystalle; schneller noch bilden sich dieselben auf Zusatz von Aether zur alkoholischen Lösung. Sie gleichen dann denen des Kali- und Natronsalzes; sie lösen sich leicht in Wasser; mit Wasser gekocht

geben sie Ammoniak ab, so dass nach längerem Kochen das Wasser stark sauer reagirt; die Analyse gab die Formel:

Cholsaurer Baryt, durch Auflösen von Cholsäure in Barytwasser, Ausscheiden des überschüssigen Baryts durch Kohlensäure und Abdampfen der Lösung erhalten, erscheint amorph; die wässrige Lösung dieses Salzes ist von stark süssem und wenig bitterem Geschmacke.

Nachdem der Verf. nachgewiesen hat, dass seine Cholsäure von der von Berzelius verschieden ist, scheint es völlig erwiesen zu sein, dass die Ochsen-galle zwei Säuren, eine stickstoffhaltige und schwefelfreie Säure, enthält, hauptsächlich mit Natron gebunden, und es erklärt sich zugleich hieraus die Verschiedenheit, die zwischen den Gallen der verschiedenen Thierklassen existirt. Ueber die in der Galle enthaltene schwefelhaltige Säure wird der Verfasser später mittheilen.

Zersetzungsproducte der Cholsäure.

a) *Durch Alkalien.* Durch Behandeln einer Lösung eines cholsauren Salzes mit Kalilauge, doch so, dass cholsaures Kali nicht abgeschieden wird, entweicht Ammoniak und es bleiben, nachdem die Flüssigkeit 24—36 Stunden im Sieden erhalten worden war, Krystalle zurück, aus denen sich durch Zersetzen mit Chlorwasserstoffsäure eine harzartige, weisse Masse ausscheidet, welche durch Auflösen in einer siedenden Mischung von Aether und Alkohol krystallinisch erhalten werden kann.

Diese Krystalle haben alle Eigenschaften der Cholsäure Demarcay's; der Verf. giebt derselben den Namen *Cholalsäure*. Diese Säure besteht aus Tetraëdern, seltener Quadratocctaëdern, welche farblos, glasglänzend und leicht zerbrechlich sind. An trockner Luft werden dieselben unter Wasserverlust undurchsichtig; sie sind von bitterem und unbedeutend süssem Nachgeschmack, sie lösen sich in 750 Th. siedenden und 4000 Th. kaltem Wasser, in weit grösserer Menge in kochendem Alkohol und Aether. Die Analyse der bei 100° getrockneten, krystallisirten Cholalsäure gab folgende Resultate:

	Aequiv.	Theorie.		Versuch.		
				I.	II.	III.
Kohlenstoff	48	288	70,59	70,54	70,49	69,91
Wasserstoff	40	40	9,80	9,84	9,90	9,70
Sauerstoff	10	80	19,61	19,62	19,61	20,39
		<u>408</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Die Formel der wasserfreien Cholsäure ist demnach:

und die der krystallisirten:

Cholalsaure Salze: Das *Kalisalz* ($\text{C}_{48}\text{H}_{39}\text{O}_9 + \text{KO}$).

Man neutralisirt die weingeistige Lösung der Cholsäure mit Kali und versetzt mit Aether; das Kalisalz scheidet sich nach kurzer Zeit in Nadeln aus. Das Salz kann bis auf 150° ohne Veränderung erhitzt werden, bei höherer Temperatur schmilzt es und verbrennt endlich unter starkem Aufblähen.

Das *Natronsalz* gleicht in jeder Beziehung dem Kalisalze.

Das *Ammoniaksalz* wird durch Hindurchleiten von Ammoniakgas durch eine weingeistige Lösung von Cholsäure und Versetzen mit Aether dargestellt, das Salz scheidet sich in prismatischen oder nadelförmigen Krystallen aus. Beim Kochen einer wässrigen Lösung desselben entweicht Ammoniak, dasselbe geschieht bei längerem Stehen des Salzes an der Luft.

Das *Barytsalz* durch Lösen der Cholsäure in Barytwasser, Ausfällen des überschüssigen Barytes durch Kohlensäure und Verdampfen der abfiltrirten Lösung erhalten, ist eine krystallinische Masse, die in ihrer wässrigen Lösung durch Kohlensäure leicht zersetzt wird. Das *Kalksalz*, durch Behandeln der wässrigen Lösung dieses Salzes mit Chlorcalcium dargestellt, giebt einen dicken, wolkigen Niederschlag, der auf Zusatz von Aether krystallisirt.

Das *Silbersalz*, durch Füllen einer Lösung von cholsaurem Baryt mittelst salpetersaurem Silberoxyd dargestellt, ist anfänglich ein Niederschlag, der durch Kochen krystallinisch erhalten werden kann; dieses Salz wird bei 100° allmählich schwarz; es löst sich leicht in Alkohol.

Der Verf. vermuthet, dass, da die Cholsäure weniger Kohlenstoff als die Cholsäure enthält und dieser Kohlenstoff nicht als Kohlensäure ausgetreten sein kann, das hierbei in so ge-

ringer Menge entweichende Ammoniak, ein secundäres Zersetzungsproduct sei.

Die Formel der Cholsäure ist: $C_{52}H_{43}NO_{12}$

Die Formel der Cholalsäure ist: $C_{48}H_{40}O_{10}$

Daher Unterschied $C_4 H_3 NO_2$

Addirt man hierzu Wasser $H_2 O_2$

so erhält man die Formel des Glycocolls $C_4 H_5 NO_4$.

Der Verf. bemühte sich nun, das zweite Zersetzungsproduct, das Glycocoll aufzufinden, was ihm auf folgende Weise gelang. Er fällte, nachdem die Cholalsäure aus der Barytlösung durch Chlorwasserstoffsäure gefällt worden war, sämmtlichen Baryt mittelst Schwefelsäure, schied die Salzsäure und Schwefelsäure durch Kochen mit Bleioxydhydrat und das aufgelöst gebliebene Bleioxyd mittelst Schwefelwasserstoff aus. Die vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit gab beim Abdampfen Krystalle, welche die Eigenschaften und die Zusammensetzung des Glycocolls hatten, die Analyse gab die Formel:

In Bezug auf die Constitution der Cholsäure bleibt über die Analogie derselben mit der Hippursäure kein Zweifel, denn:

Hippursäure $C_{18}H_9NO_6$

Benzoësäure $C_{14}H_6O_4$

$C_4 H_3 NO_2$

+ 2 At. Wasser $H_2 O_2$

Glycocoll $C_4 H_5 NO_4$.

Man könnte demnach die Cholsäure als eine gepaarte Säure, aus Cholalsäure und Glycocoll bestehend, betrachten, obgleich das Glycocoll darin als ein hypothetischer Körper, dessen Zusammensetzung sich von der des Glycocolls durch einen Mindergehalt von 2 Atom Wasser unterscheidet, enthalten ist:

Cholalsäure

Cholsäure.

b) Zersetzungsproducte der Cholsäure durch Säuren.

Erhitzt man eine Lösung von Cholsäure in starker Salzsäure oder in concentrirter Schwefelsäure bis zum Kochen, so scheiden sich ölartige Tropfen ab, die beim Erkalten fest und harzartig werden. Die von diesem harzartigen Körper getrennte

Flüssigkeit giebt beim Abdampfen nur eine geringe Menge eines Rückstandes, der aus einem harzartigen Körper und im Fall Salzsäure angewendet wurde, aus Spuren von salzsaurem Glycocolle besteht. Die harzartige Masse besitzt die Eigenschaften einer schwachen Säure; beim Trocknen im Wasserbade schmilzt sie und wird bei längerem Verweilen nach und nach fester und beim Erkalten hart und spröde; sie verliert hierbei fortwährend Wasser. Die Analyse ergab die Formel:

diese Säure lässt sich als ein Zwischenproduct bei der Zersetzung der Cholsäure durch Säuren betrachten.

Löst man Cholsäure in Wasser auf und fährt mit dem Kochen fort, bis der harzähnliche Körper sich ausgeschieden hat, so wird nach und nach der flüssige Körper immer fester und bleibt zuletzt in der kochenden Flüssigkeit ungeschmolzen. Als Endproduct der Zersetzung tritt das *Dyslysin* von Berzelius auf; ausser diesem findet sich noch eine stickstofffreie Säure, die alle Eigenschaften der *Choloidinsäure* von Demarcay besitzt. Diese Säure ist bei gewöhnlicher Temperatur fest, weiss, pulverisirbar, schmilzt in siedendem Wasser, löst sich in Alkohol und wird aus dieser Lösung durch Alkohol ausgeschieden; diese Lösung reagirt sauer; in Aether löst sie sich nur in sehr geringer Menge. Sie verbindet sich mit Basen und treibt Kohlensäure aus den Lösungen der kohlensauen Salze beim Erwärmen aus. Die Analyse führte zu der Formel: $\text{C}_{48}\text{H}_{39}\text{O}_9$. Es wurde schon oben erwähnt, dass sich nach dem Abscheiden der Choloidinsäure, beim Abdampfen der sauren Lösung Glycocolle findet. Die Zersetzung der Cholsäure durch Säuren lässt sich demnach durch folgende Formeln darstellen:

Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure auf Choloidinsäure.

Lässt man die durch Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure auf Cholsäure erhaltene Cholalsäure längere Zeit mit ersterer Säure sieden, so erhält man ein in Alkohol unlösliches Endpro-

duct, das *Dyslysin*. Dieser Körper und die *Choloïdinsäure*, welche mit Berzelius's Fellinsäure übereinstimmt, sind wohl die einzigen, wohl charakterisirbaren Substanzen, welche hierbei entstehen.

Das *Dyslysin* wird rein dargestellt, indem man das gepulverte, beim Kochen mit der sauren Flüssigkeit nicht mehr schmelzende Harz, zuerst mit Wasser, dann mit kochendem Alkohol behandelt und endlich in Aether löst; durch Zusatz von Alkohol zu dieser Lösung fällt das Dyslysin pulverförmig heraus und bildet nach dem Trocknen eine grauweisse Masse, die sich in Wasser und kaltem Alkohol nicht, wenig in siedendem Alkohol und leicht in Aether löst. Durch Kochen mit einer weingeistigen Kalilösung oder nach dem Schmelzen mit Kalihydrat scheidet sich auf Zusatz von Säuren Choloïdinsäure aus. Die Analyse bei 120° getrockneten Dyslysins gab folgende Resultate:

	Aequiv. Theorie.		Versuch.	
			I.	II.
Kohlenstoff	48	288	77,4	77,6
Wasserstoff	36	36	9,6	9,6
Sauerstoff	6	48	13,0	13,1
		372	100,0	100,0.

Die Entstehung des Dyslysins aus Choloïdinsäure findet demnach durch Austritt von 3 Atomen Wasser statt, denn:

Einwirkung der Säuren auf Cholalsäure. Kocht man letztere Säure längere Zeit mit starker Chlorwasserstoffsäure, so erhält man einen harzartigen Körper, der alle Eigenschaften der Choloïdinsäure besitzt. Durch längere Zeit fortgesetztes Sieden verschwindet diese Säure und macht endlich dem Dyslysin Platz.

Choleïnsäure.

Die einzigen bei der Zersetzung des basischen Bleiniederschlags aus Ochsen-galle erhaltenen Producte sind: *Cholalsäure*, *Taurin* und *Glycocol*. Ich habe aber schon früher nachgewiesen, dass dieses Bleisalz noch eine andere Säure, die *Choleïnsäure* enthält; während sich die Cholsäure in Cholalsäure und Glycocol spaltet, spaltet sich die Choleïnsäure in Cholal-

säure und Taurin. Choleinsäure ist daher eine mit Taurin gepaarte Cholalsäure.

Der Verf. sucht darauf auf synthetischem Wege die Richtigkeit der von ihm angenommenen Formel der Choleinsäure zu begründen.

Die choleinsauren Salze mit alkalischer Basis sind in Wasser und Alkohol leicht löslich, in Aether unlöslich; die wässrige Lösung schmeckt sehr süß mit einem bitteren Nachgeschmack; die mit Säure versetzte Lösung lässt sich einen Augenblick ohne Zersetzung kochen, nach kurzer Zeit aber scheiden sich ölartige Tropfen von Choloidinsäure aus; die Flüssigkeit enthält hierauf Taurin gelöst. Essigsaures Kupferoxyd giebt mit den wässrigen Lösungen der choleinsauren Alkalien keinen Niederschlag, salpetersaures Silberoxyd, selbst auf Zusatz von Ammoniak ebenfalls nicht. Beim Kochen wird ein Theil des Silbers reducirt. Eisenchlorid giebt anfangs eine Fällung, die auf Zusatz von Eisenchlorid wieder verschwindet.

Quecksilberchlorid giebt keinen Niederschlag. Salpetersaures Quecksilberoxydul und Zinnchlorür geben weisse Flocken. Mit Schwefelsäure und Zucker erwärmt, geben sie dieselbe violette Farbe, wie die salzsauren Salze.

In Bezug auf die Cholalsäure bemerkt der Verf. noch, dass dieselbe nur mit wenigen anderen Säuren in naher Beziehung zu stehen scheint; diese Säuren sind die Lithofellinsäure, die Lichesterinsäure und die Roccellsäure.

Durch die im Vorstehenden mitgetheilten Untersuchungen wird die hauptsächlich von Demarcay, Liebig, Thayer und Schlosser vertretene Ansicht von der Constitution der Galle im Wesentlichen bestätigt, dass nämlich der organische Bestandtheil derselben einen sauren Character besitzt.