glühen durch dasselbe aus Niobsäure Schwefelniob zu erhalten. Es ist indessen schwierig, dasselbe von grosser Reinheit darzustellen.

Wird niobsaures Natron beim Rothglühen mit Schwefelwasserstoffgas behandelt, so bildet sich, da das Schwefelniob kein Sulfid ist, kein Schwefelsalz desselben. Es erzeugt sich Schwefelniob, und Schwefelwasserstoff-Schwefelnatrium, das durch Auflösen in Wasser vom ersteren getrennt werden kann. Aber das Schwefelniob ist nicht rein, sondern enthält noch saures niobsaures Natron, das durchs Glühen unlöslich in Wasser geworden ist.

VIII.

Ueber das Niobfluorid.

Von

H. Rose.

(A. d. Ber. d. Berl. Academie.)

Das Hydrat der Niobsäure löst sich in wässriger Fluorwasserstoffsäure leicht auf, und diese Lösung giebt mit anderen Fluormetallen und mit Fluorwasserstoff eine Reihe von krystallisirten Doppelsalzen, von denen nur einige dargestellt wurden.

Niobfluorkalium. — Wird die Lösung der Niobsäure in überschüssiger Fluorwasserstoffsäure mit kohlensaurem Kali versetzt, so entsteht zuerst ein voluminöser Niederschlag, der, wenn die Lösung sich der Neutralität nähert, verschwindet. Durchs Erkalten der warmen Lösung schied sich das Salz $KF + NbF_2$ aus. Die Lösung desselben röthet stark das Lakmuspapier. In einem Platinlöffelchen schmilzt es leicht bei geringer Hitze, bei stärkerer Hitze wird es unschmelzbar, und ganz blau. Der Rückstand bläut das Lakmuspapier.

Die vom Salze getrennte Lösung gab nach dem Ein-

dampfen ein anderes Salz, das mehr Fluorkalium enthielt und dessen Zusammensetzung durch $4\text{KF} + 3\text{NbF}_2$ ausgedrückt werden kann. Der Verfasser lässt es unentschieden, ob diese Verbindung eine eigenthümliche sei oder eine Mischung des vorigen Salzes mit Fluorkalium.

Aus der Mutterlauge von diesem Salze wurde durch ferneres Eindampfen eine bedeutende Menge von einem zerfliesslichen, krystallinisch-fasrigen Salze erhalten, das aus reinem wasserhaltigen Fluorkalium bestand.

Wird die Lösung der Niobsäure in Fluorwasserstoffsäure mit Kalihydrat so vermischt, dass sie noch sauer bleibt, und dann bis zur Krystallhaut abgedampft, so erhält man die Verbindung $(\text{KF} + \text{NbF}_2) + (\text{KF} + \text{HF})$.

Niobfluornatrium. — Wurde die Lösung von Niobsäure in Fluorwasserstoffsäure mit so vielem kohlen sauren Natron versetzt, dass sie noch schwach aber deutlich sauer reagirte, so entstand ein krystallinischer Niederschlag von der Zusammensetzung $(2\text{NaF} + \text{NbF}_2) + (\text{NaF} + \text{HF})$. Wird dieses Salz im Platinlöffelchen erhitzt, so wird es blau, schmilzt aber nicht; bei stärkerer Hitze wird es wieder weiss.

Die von diesem Salze getrennte Flüssigkeit gab durchs Abdampfen ein zweites krystallinisches Salz von der Zusammensetzung $(\text{NaF} + \text{NbF}_2) + (\text{NaF} + \text{HF})$.

Die Mutterlauge von diesem Salze, längere Zeit in einer Platinschale aufbewahrt, setzte ein blätterig krystallinisches Salz von der Zusammensetzung $\text{NaF} + \text{NbF}_2$ ab.

Man sieht aus diesen Versuchen, dass das Niobfluorid sich in vielen Verhältnissen mit den alkalischen Fluormetallen und mit Fluorwasserstoff verbinden kann und wahrscheinlich wird dasselbe sich mit andern Fluormetallen auf eine ähnliche Weise in mannigfaltigen, aber doch einfachen Verhältnissen vereinigen können.

Auffallend ist es aber, dass unter den dargestellten Verbindungen keine sich findet, die den neutralen niobsauren Salzen entspricht. Eine solche Verbindung müsste von der Zusammensetzung $\text{RF} + 2\text{NbF}_2$ sein.

Die Lösungen der Verbindungen des Niobfluorids mit den alkalischen Fluormetallen zeichnen sich dadurch aus,

dass in ihnen Schwefelsäure keine Trübung hervorbringt, und Niobsäure aus ihnen nicht fällt. Um das Niobfluorid in Niobsäure zu verwandeln, muss die Lösung mit einem Ueberschuss von Schwefelsäure abgedampft werden.

IX.

Chemische Mittheilungen.

Von

C. F. Schönbein.

(Aus den Verh. d. naturforschenden Gesellsch. in Basel.)

(Nachtrag zu der in diesem Journ. Bd. LXXIV, p. 328 gemachten Mittheilung.)

1. Ueber das Verhalten des Bittermandelöles zum Sauerstoff.

Aus den Thatsachen, welche über diesen Gegenstand a. a. O. mitgetheilt sind, glaubte ich den Schluss ziehen zu dürfen, dass wie die Elektricität und der Phosphor, so auch das Bittermandelöl das Vermögen besitze, unter Mitwirkung des Lichtes den gewöhnlichen Sauerstoff zu allotropisiren. Nachstehende Angaben lassen meines Bedünkens über die Richtigkeit dieser Folgerung keinen Zweifel übrig.

Oxydation metallischer Elemente.

1. *Arsen.* Meine früheren Versuche haben gezeigt, dass dieses Metall von dem ozonisirten Sauerstoff schon in der Kälte rasch zu Arsensäure oxydirt wird, während der gewöhnliche Sauerstoff diess nicht thut. Aus diesem Verhalten von $\overset{\circ}{\text{O}}$ zu As erklärt sich die Thatsache, dass Arsenflecken vor einen durch O gehenden elektrischen Büschel gehalten, oder in stark ozonisirte Luft gebracht, schell verschwinden unter Zurücklassung von Arsensäure