N o t e s.

1850 Dec. 27. Wind loud, and sky unsettled.
 1851 Jan. 6. Fog prevented further comparisons. γ' , the brighter star of γ Leonis was used.
 Febr. 8. Set 5. R. A. and N. P. D. measures taken separately.

Febr. 8. Set 6. Observed with difficulty on the meridian.
 17. Set 9. Measures very satisfactory, but star indifferent.
 Set 10. Meridian. N. P. D. probably indifferent.
 23. Star in a difficult position. Interrupted by fog.

Mean places of the Stars of comparison used at Durham, and of certain other Stars near the path of Metis during the Opposition of 1850—51, observed on the meridian at Durham. *)

Set.	Name.	Mag.	R. A.	1851,0	N. P. D.	No. of obs.
	(a)	8	9 ^h 4 ^m 53 ^s 57		65° 5' 48" ²	1
14, 15	Lalande 18184	6	5 46,60		64 22 27,9	3
	18259	9	8 5,83		64 44 40,4	3
	18482	8	15 43,66		65 47 4,8	1
	(b)	9	16 36,45		64 37 39,6	3
13	(c)	8	21 30,35		64 40 15,8	3
11, 12	(d)	9	22 55,32		64 55 56,5	2
9	(e)	10	28 9,88		65 2 6,4	**)
	(f)	8	29 2,60		64 56 11,9	3
7, 8	(g)	9	29 24,70		65 15 59,4	2
5	B. A. C. 3327	7	36 47,17		65 50 32,8	2
	Lalande 19329	8	44 27,84		66 40 56,1	5
	19522	7	51 9,92		67 58 10,0	4
	B. A. C. 3423	7	54 30,00		67 20 1,9	1
4	Lalande 19677	9	9 56 55,60		69 21 50,7	2
2	(h)	9	10 0 3,24		70 30 30,5	2
1	B. A. C. 3460	7	0 57,40		70 44 21,4	2
	Lalande 19900	9	6 58,83		70 8 16,8	1
3	γ' Leonis.	2	10 11 45,05		69 24 25,4	4

I should state in reference to the Star-observations, that I find the average error of a single observation of a Naut.-Almanac. Star, with the Durham transit-circle, to be, in R. A. $\pm 0'05$, and in N. P. D. about $\pm 1''0$, the circle

being small. The N. P. Ds. are obtained differentially from Naut. Alm. Stars, the zero of the circle being too unstable for independent measures of Zenith-Distance.

*) Star (d) was kindly observed for me at Cambridge by Mr. James Breen.

**) The place of Star (e) depends on a single Comparison with (f): it was too faint for the transit. The other Stars were observed during last February; circumstances unexpectedly occurred which prevented a greater number of observations of each being secured. The corrections to Naut. Alm. Stars at present in use at Greenwich were applied throughout in finding Clock-error.

R. C. Carrington.

Beobachtungen der Irene, von Herrn W. W. Boreham.

Haverhill 1851. Juni 6.

1851		Greenw. M. T.	AR.	N. P. D.			Observ.	Stars of Comp.
May	21	11 ^h 0 ^m 2 ^s	16 ^h 2 ^m 14 ^s .89	—0,012 p	103°26' 26"62	—0,904 p	6	Weisse XVI. 78.
	22	11 6 00	16 1 14,25	—0,0119 p	28 1,12	—0,903 p	6	—
	23	10 33 51	16 0 16,60	—0,0128 p	29 42,64	—0,903 p	7	Weis. XV. 1118, cloudy, doubtful.
	28	11 15 39	15 55 16,33	—0,0026 p	39 12,24	—0,911 p	5	— good.
	30	11 16 28	15 53 19,59	—0,00 p	43 22,61	—0,912 p	3	Greenw. 12-y. Cat. 1308.
	31	10 21 14	15 52 25,22	—0,009 p	45 31,89	—0,908 p	6	—
June	1	10 31 25	15 51 28,14	—0,006 p	47 52,27	—0,911 p	5	—
	4	10 28 31	15 48 45,00	—0,005 p	103 55 45,97	—0,912 p	6	— pretty good.

p = Horizontal Equatoreal Parallax.

Mean places for 1851,0 of Stars of Comparison.

	AR.	N. P. D.
Weisse XVI. 38	16 ^h 2 ^m 43 ^s 22	103° 35' 54" 28
— XV. 1118	15 58 46,02	103 40 1,94
Greenw. 12y. Cat. 1308	15 49 51,10	103 50 43,19

Greenwich Meridian Observations of Irene.

	Greenwich Mean Solar Time.	Observed R. A.	N. P. D. uncorrected for Parallax.
1851 May 28	11 ^h 31 ^m 38 ^s 3	15 ^h 55 ^m 15 ^s 16	103° 39' 10" 0
29	26 44,2	54 16,87	41 15,2
30	21 51,1	53 19,64	43 23,2
31	16 58,6	52 22,77	45 40,0
June 2	11 7 15,7	50 31,38	50 24,1
4	10 57 36,6	15 48 43,88	103 55 21,1

Beobachtungen der Astraea auf der Hamburger Sternwarte.

1851	Hb. m. Zt.	Sch. AR.	Sch. Decl.	Zahl der Vergl.	1851 mittl. AR.	Prec.	mittl. Decl.	Prec.
Mai 4	10 ^h 36 ^m 59 ^s	217° 33' 7" 3	—5° 29' 11" 6	9	14 ^h 16 ^m 28 ^s 20	3,131	—4° 38' 35" 0	—16,60
7	10 12 15,3	216 54 22,5	5 17 27,3	2	18 43,78	3,135	4 49 1,1	16,50
8	9 52 0,5	216 41 57,3	5 13 56,9	20	49 27,65	3,136	4 50 23,5	16,46
10	10 22 39,3	216 16 46,0	5 7 3,1	23	25 18,87	3,138	4 49 12,5	16,15
17	10 2 51,3	214 56 56,6	4 48 14,8	18	25 22,13	3,142	5 7 56,6	16,15
21	9 54 51,4	214 17 14,0	—4 41 16,3	2	27 37,53	3,143	5 10 39,6	16,04
					31 10,34	3,144	5 8 23,4	—15,85

Die Declinationen sind nicht für Parallax verbessert.

Hierbei noch die am Meridiankreise bestimmten mittleren Oerter für Jan. 0 1851 einiger in der Bahn der Astraea gelegenen Fixsterne:

C. Rümker.

Addendum to the „Suggestions to Astronomers for the Observation of the Total Eclipse of the Sun.“

It is recommended that a careful examination of the Sun's disc be made, for the discovery of conspicuous faculae or maculae, in the neighbourhood of the limb. Before the eclipse, the examination should be made round the whole circumference: after the eclipse, those parts should be particularly examined near which red prominences may have been seen.

Cometen - Circular.

Herr Dr. d'Arrest hat in der Nacht zwischen dem 27^{ten} und 28^{ten} Juni auf der Leipziger Sternwarte, einen sehr lichtschwachen Cometen in dem Sternbilde der Fische entdeckt, dessen scheinbaren Ort er wegen der bald darauf eintretenden Dämmerung nur schätzen konnte:

	M. Zt. Leipzig.	AR.	Decl.
Juni 27	13 ^h 10 ^m	7° 49'	+10° 32'

Die nächste Nacht war der Himmel dunstig und der Comet nicht zu finden, hingegen gelangen in der darauf folgenden Nacht zwei Vergleichungen mit Weisse 0^h 690, die Herr Dr. d'Arrest für etwa so genau hält, als solche bei der grossen Lichtschwäche des Cometen überhaupt anzustellen möglich waren.

	M. Zt. Leipzig.	AR.	Decl.
Juni 29	13 ^h 14 ^m 5 ^s	10° 4' 47"	+10° 37' 35"

Die Schätzung Juni 27 kann einige Minuten unsicher sein.

P.