Polar-Distanzen des Mondes in Paramatta beobachtet.

	Bar.	Therm.	Refr.	Polar-Distanz.
	$\overset{z}{\text{Bar.}}$	$\overset{o}{\text{Therm.}}$	$\overset{''}{\text{Refr.}}$	$\overset{o}{\text{Polar-Distanz.}}$
Mai 3.	30,21	53	28,58	82 2' 44,0
— 27.	29,87	58,5	57,50	101 25 54,5
— 28.	30,00	55	47,07	95 28 4,5
— 29.	29,93	48,5	38,26	89 28 32,5
— 30.	29,75	49	30,12	83 39 46,8
— 31.	29,57	54	22,98	78 12 12,2
Juni 1.	29,70	52	17,59	73 16 59,2

	Bar.	Therm.	Refr.	Polar-Distanz.
	$\overset{z}{\text{Bar.}}$	$\overset{o}{\text{Therm.}}$	$\overset{''}{\text{Refr.}}$	$\overset{o}{\text{Polar-Distanz.}}$
Juni 2.	29,92	48	13,31	69 5' 29,7
— 3.	29,71	51	9,72	65 50 15,0
— 14.	30,00	42	64,84	103 50 24,8
— 28.	30,00	50	19,36	74 43 51,6
— 29.	29,99	48	14,56	70 17 12,2

Die angegebenen Polardistanzen müssen noch wegen Refraction corrigirt werden.

R ü m k e r.

Zusätze zu Herrn Rümkers Brief von Herrn Clausen.

Die Polardistanz des Phomalhut ist für 1823:

59° 26' 30,8	Rümker
27,8	Bessel
30,5	Pond N. A. 1824
33,0	Bessel A. N. Nr. 73.

Um die Rümkerschen Micrometermessungen der Sonnenfinsternis zu berechnen, nehme ich an, daß die Declinationsdifferenzen zur Zeit des Durchgangs durch den Stundenfaden gemessen sind, und daß man vorher eine Ephemeride der Halbmesser des Mondes und der Sonne, und der AR. und Decl. des Mondes, der Sonne und beider Hörner berechnet habe, um alles für jede Beobachtung auf eine Zeit reduciren zu können.

Durch Rümkers Beobachtung des ersten Sonnenrandes ist der Durchgang des Mittelpuncts bestimmt, man hat also unmittelbar die Unterschiede der AR. des Sonnenmittelpuncts und der beiden Hörner; auch hat man den Declinationsunterschied des Mondes und des einen Horns.

Ist nun der Declinationskreis die Axe der y ; und sind die Coordinaten:

des Sonnenmittelpuncts	o	y
des Mondmittelpuncts	x	o
des nördlichen Horns	a	b
des südlichen —	$a^{(1)}$	$y^{(1)}$

a , b und $a^{(1)}$ sind gegeben, und der Anfangspunct der x wird im Mittelpuncte der Sonne, der der y im Mittelpuncte

des Mondes angenommen. Sei Halbmesser der Sonne ... R des Mondes ... r

$$\begin{aligned} \text{so hat man } a^2 + (b-y)^2 &= R^2 \\ (a-x)^2 + b^2 &= r^2 \quad \text{mithin} \\ y &= b \pm \sqrt{R^2 - a^2} \\ x &= a \pm \sqrt{r^2 - b^2} \end{aligned}$$

y ist Unterschied der Decl. der Sonne und des Mondes
 $\frac{x}{\cos D}$ — — — Rectascensionen

Die Beobachtungen des zweiten Horns wären also nicht nöthig gewesen. Sie geben indessen:

$$\begin{aligned} (y^{(1)} - y)^2 + a^{(1)2} &= R^2 \\ y^{(1)2} + (a^{(1)} - x)^2 &= r^2 \\ y^{(1)} &= y \pm \sqrt{R^2 - a^{(1)2}} \\ &= \pm \sqrt{r^2 - (a^{(1)} - x)^2} \end{aligned}$$

woraus $y = \pm \sqrt{r^2 - (a^{(1)} - x)^2} \pm \sqrt{R^2 - a^{(1)2}}$
eine Bedingungsgleichung zwischen x und y folgt.

Es wäre zu wünschen gewesen, daß Rümker eine Zeitlang die AR.differenzen zwischen dem ersten Mond- und Sonnenrande, die er unmittelbar erhalten konnte, beobachtet hätte. Die Chordenmessungen sind zu früh angefangen, denn ein Fehler derselben verdoppelt sich beim Anfange in der Ableitung der Distanz der Mittelpuncte der Sonne und des Mondes. Es wäre damals zweckmäßiger gewesen, grade Aufst. des ersten Mond- und Sonnenrandes und der Hörner, und Decl. eines der Sonnenränder und der Hörner zu messen.

Th. Clausen.

De reductione temporis, quo oscillationes quocumque penduli, ab amplitudinibus magnis incipientes, absolvuntur, ad tempus, quo totidem oscillationes amplitudinis infinite parvae perficiuntur.

Experientia docuit amplitudines oscillationum penduli liberi vel acus magneticæ, ob æris resistentiam, tempore ratione arithmetica crescente, ratione geometrica decrescere. Hoc non solum pro numero oscillationum integro, sed etiam pro minimis eorum partibus valere suppono. Sit itaque dt' tempusculum, quo particula oscillationis amplitudinis e ; dt tempusculum quo similis particula oscillationis infinite parvæ amplitudinis absolvitur; tunc habetur.

$$\begin{aligned} dt' &= dt \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2 \frac{1}{2} e + \left(\frac{1.3}{2.4}\right)^2 \sin^2 \frac{1}{2} e + \left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^2 \sin^2 \frac{1}{2} e + \text{etc.} \right\} \\ &= dt \left\{ 1 + \frac{1}{16} e^2 + \frac{11}{3072} e^4 + \frac{173}{2^{14}.45} e^6 + \frac{22931}{2^{12}.315} e^8 + \text{etc.} \right\} \end{aligned}$$

Formula $e = ac^{-bt}$, denotante c basin logarithmorum naturalium, relationem inter tempus et amplitudinem, modo nominatam, exprimit. Quo valore ipsius e substituto, prodit

$$dt' = dt \left\{ 1 + \frac{1}{16} a^2 c^{-2bt} + \frac{11}{3072} a^4 c^{-4bt} + \frac{173}{2^{14}.45} a^6 c^{-6bt} + \frac{22931}{2^{12}.315} a^8 c^{-8bt} + \dots \right\}$$