Beobachtungen des Lichtwechsels von Mira (o) Ceti.

(Vorgelesen im naturwissenschaftl. Verein der Universität zu Klausenburg.)

Beobachtetes Maximum: 1885 Febr. 7 = 3^m0.

Die zur Ableitung der nachfolgenden Daten construierte Lichtcurve wurde aus allen, zu Tagesmitteln vereinigten Beobachtungen des Veränderlichen, unter Zugrundelegung der gleichzeitig bestimmten Helligkeitsscala der Vergleichsterne erhalten. Die genauen Beobachtungen begannen erst Jan. 17, als o = 3^m5 erschien, jedoch erleidet die Bestimmung des grössten Lichtes hierdurch keine Einbusse.

Die Helligkeit nahm seit Anfang Januar von 5.6^m an rasch zu; deutlich ist ein secundäres Maximum Jan. 20-21 = 3^m25 angezeigt. Darauf nahm die Lichtstärke wohl ein wenig ab, oder trat kurzer Stillstand ein; leider störte hier der Mondschein etwas. Zur Zeit des grössten Lichtes war der Lichtwechsel verhältnissmässig rasch. Die Abnahme verlief ziemlich regelmässig, im letzten Drittel des Februar trat geringe Verzögerung ein. März 13 ward die Grösse des Sterns zu 3^m8 beobachtet, später stand er der Sonne zu nahe.

Die Abweichungen der Beobachtungen vom mittleren Zug der Lichtcurve zeigen eine untergeordnete Periode von 6½ Tagen an. Obwohl die Beträge oft kaum grösser als die möglichen Beobachtungsfehler sind, verdient diese Unregelmässigkeit immerhin einige Aufmerksamkeit, da sie auch in früheren Erscheinungen angedeutet ist. Die Helligkeiten der Vergleichsterne sind:

$\alpha = 2^m 7$ (?)	$\nu = 5^m 35$
$\gamma = 3.55$	108 Heis = 5.8 (?)
$\delta = 3.95$	105 » = 6.7
$\xi^2 = 4.4$	

Beobachtetes Maximum: 1886 Jan. 7 = 5^m35.

Die diesjährige Erscheinung zeichnet sich durch geringe Lichtentwicklung besonders aus. Seit der ebenso kleinen Maximalgrösse im November 1868 sind 19 Perioden verflossen; rückwärts damit gerechnet, treffen wir auf Juli 1851, wo Heis die Grösse 3^m95 bis 4^m0 beobachtete. Diese blieb zwar auch merklich unter dem Mittel, aber doch nicht so stark, da 1847 im November und 1876 im Februar wohl noch etwas geringere Maximalhelligkeiten erreicht wurden. Hiernach scheint eine bestimmte Periode dieser schwachen Lichtentwicklung nicht vorhanden zu sein.

Für mein Auge ward der Stern zuerst 1885 Dec. 2 = 6^m9 sichtbar; gleiche Helligkeit erreichte er in der Ab-

Klausenburg in Siebenbürgen 1886 April.

nahme 1886 Febr. 25. Er war nur 65 Tage heller als 6^m und blieb für lichtempfindliche Augen bloss 85 Tage sichtbar.

Die Zunahme der Helligkeit war seit 1885 Nov. 7 ohne grössere Anomalie und ziemlich rasch, besonders Anfang December (6^m). Nach Mitte December trat fast völliger Stillstand ein, denn die Zu- und Abnahme betrug während 30 Tagen nur etwa 0^m1. Nach dem Maximum nahm das Licht um 0^m2 ab, dann trat neuerdings Verzögerung von Jan. 20 bis Anfang Februar ein; später nahm die Helligkeit wieder recht schnell ab.

In der Abnahme zeigten sich einige Unregelmässigkeiten, aber auch in den übrigen Theilen der Lichtcurve sind geringe Schwankungen in kurzer Periode angezeigt. Nur durch deren Berücksichtigung war es möglich, den Tag des grössten Lichtes abzuleiten, der aber trotzdem ohne grösseren Zwang noch um 6 bis 8 Tage früher oder 2 bis 3 Tage später angesetzt werden könnte, da zwischen Dec. 13 und 26 keine Beobachtung gelang. — Die diesjährige Lichtcurve zeigt grosse Aehnlichkeit mit der von 1877-78.

Ausserdem beobachtete ich mit einem 3 zöll. Merz'schen Fernrohr, das mir von Herrn Prof. Dr. Abt gütigst zur Benutzung überlassen wurde, im Januar 1886 an 6 Tagen die Farbe von o und zum Vergleich von α Ceti. Die mittlere Färbung war für α einfach orange gelb, genau wie 1878, für o stark orange gelb, während er 1878 weniger stark gefärbt erschien als α . Auch diesmal wäre die Farbe wohl eher heller als die von α Ceti gewesen, nur in Folge der geringen Helligkeit erschien o dunkler gefärbt.

Nach ca. 750 Farbenbeobachtungen von 33 geeigneten Sternen, die ich in den Jahren 1877 und 1878 anstellte, habe ich eine Reductionstabelle auf die Farbenscala und die Sternfarben in A. N. 1902 ff. von J. F. Jul. Schmidt in Athen berechnet, wobei sich eine sehr gute Uebereinstimmung der beobachteten Färbungen zeigte.

Auf diese Scala bezogen, erhalte ich folgende Zahlenwerthe für meine Beobachtungen:

α Ceti:

1878 im Herbst Farbe = 6.90	} 2.3 ^m
1886 » Januar » = 6.85	

o Ceti Maximum:

1878 im Herbst Farbe = 6.72	3.2 ^m mit 4 z. Fernrohr	4 Beob.
1886 » Januar » = 7.25	5.6 » 3 » »	6 »

Schmidt giebt für α Ceti die Farbe = 6.8 an.

Friedrich Schwab.

Beobachtungen des neuen Sterns bei χ^1 Orionis.

Derselbe hat seit der Entdeckung fortwährend an Licht abgenommen, jedoch nicht immer mit gleicher Geschwindigkeit; besonders gegen Ende Januar war die Abnahme nach vorheriger Verzögerung ziemlich schnell. Anfang Februar trat andauernde Verlangsamung ein, doch nimmt die Helligkeit noch immer etwas ab, neuerdings (Ende März und Anfang April) wieder schneller.

Die erste Nachricht über den Stern erhielt ich Dec. 29, am 30. begann ich die Vergleichen. Seit Jan. 25 benutzte ich das erwähnte 3 zöll. Fernrohr, vorher ein starkes Opernglas. Im Fernrohr erschien die Nova stark orangeroth (bei 8^m3). Diese Färbung ward bei abnehmender Grösse immer tiefer, selbst bei 9^m6 fiel die dunkelrothe Farbe zeitweilig noch auf.

Wegen der störenden Röthe bleibt eine 11-12 tägige periodische Abweichung vom mittleren Zug der Curve unsicher, ich erwähne sie blos, um etwaige Bestätigung durch andere Beobachtungen anzuregen.

Den nahen nachfolgenden Nachbar schätze ich = schwach 11^m.

Zum Schluss gebe ich die Grössen nach der Lichtcurve mit genauem Anschluss an die Helligkeiten der DM., welche mir Herr Dr. Kobold gütigst brieflich mittheilte. Den Nachbarstern in $\alpha = 5^h 46^m 39^s$, $\delta = +20^\circ 8'4''$ setze ich = 9^m9.

1885 Dec. 26	= 7 ^m 0 (?)
» 29	= 7.2
1886 Jan. 2	= 7.4
» 6	= 7.6
» 11	= 7.8
» 17	= 8.0
» 22.5	= 8.2
» 26	= 8.4

1886 Jan. 28.5	= 8 ^m 6
» 31	= 8.8
Febr. 7.5	= 9.0
» 23	= 9.2
März 13	= 9.4
» 29	= 9.6
April 4	= 9.8
» 11	= 10.0 (?)

Klausenburg in Siebenbürgen 1886 April.

Friedrich Schwab.

Beobachtungen des neuen Sterns im Andromeda-Nebel auf der Wiener Sternwarte.

Der neue Stern im Andromeda-Nebel, von dessen Entdeckung die telegraphische Nachricht am 1. Sept. v. J. Vormittags hier eintraf, konnte wegen bedeckten Himmels erst am nächsten Tage (2. Sept.) mit dem grossen Refractor untersucht werden.

Bei schwacher Vergrösserung schien an diesem Tage der neue Stern genau in der Mitte des Nebels zu stehen; bei stärkerer Vergrösserung (ungefähr 800) bemerkte ich aber, dass ihm nahezu in demselben Parallel ein Lichtknoten folgte, in dem von Zeit zu Zeit ein äusserst kleines Sternchen aufblitzte. Der Stern selbst erschien als scharf-begrenzter Punkt. Ich mass, obwohl die Einstellung auf den Lichtknoten wegen der Helligkeit der Nova sehr schwierig war, die Position von Nova — Lichtknoten:

$$\Delta\alpha = -1^s 12 \quad \Delta\delta = -5'' 07.^*)$$

Von nun an beobachtete ich den neuen Stern bis Ende des verflossenen Jahres, so oft es Zeit und Umstände erlaubten und maass auch die Positionen einer grösseren Anzahl von Sternen in dem Nebel, um für meine Zeichnung des Nebels ein Netz zu haben. Die Bond'schen Canäle waren stets recht deutlich zu sehen, und zieht sich auch ein Zweig derselben gegen die Nova hin. Im südlich vorangehenden Theile des Nebels zeigt sich an einer Stelle, wo

*) Diese Beobachtung findet sich bereits in den A. N. Nr. 2681 mitgetheilt, nur ist dort irrthümlicherweise das Zeichen der Declinationsdifferenz + statt — angesetzt.

Sternwarte Währing 1886 März 5.

sich die beiden Canäle berühren, eine eigenthümliche Granulation der Nebelmasse; dieselbe erscheint dort flockig.

Wie die Helligkeit der Nova allmählig abnahm, trat auch der oben erwähnte Lichtknoten, der eigentliche Mittelpunkt des Nebels, immer deutlicher hervor und auch das kleine Sternchen in seinem Innern wurde immer besser sichtbar, ja, als die Nova bereits zur 12. Grösse herabgesunken war, konnte man ausser demselben noch 2 oder 3 Sternchen zeitweilig aufblitzen sehen.

Am 10. November stellte ich auf die Mitte des Lichtknotens ein und mass:

$$\begin{aligned} \text{Centrum} - \text{Nova} \quad \Delta\alpha &= +1^s 42 & \Delta\delta &= +4'' 79 \\ &= +1.37 & &= +4.54 \end{aligned}$$

während am 12. November bei der Einstellung auf das Sternchen im Lichtknoten sich ergab:

$$\begin{aligned} \Delta\alpha &= +1^s 14 & \Delta\delta &= +2'' 52 \\ &= +1.00 & &= +2.84 \end{aligned}$$

Am Meridiankreise wurden die Positionen der Nova, auf 1885.0 reducirt, wie folgt erhalten:

Sept. 3	0 ^h 36 ^m 26 ^s 61	+40° 38' 15.3
» 5	26.63	14.2
» 7	26.55	—
» 10	26.67	13.7
Mittel:	0 36 26.62	+40 38 14.4
Präc. 1885.0	+3 ^s 254	+19 ^{''} 80

R. Spitaler, Assistent der k. k. Sternwarte.

Ueber den veränderlichen Stern DM. +39°2773 im Bootes.

In Nr. 2595 der A. N. habe ich die Veränderlichkeit des Sterns DM. +39°2773 angezeigt. Seither habe ich den Stern regelmässig beobachtet, und jetzt lässt sich, mit Zuziehung älterer Schätzungen, schon ein recht sicherer Schluss über die Periodenlänge ziehen. Bei den folgenden Rechnungen konnte jedoch das in diesem Jahre beobachtete Maximum noch nicht benutzt werden; es wird also ausschliesslich als Controlle der Genauigkeit des Resultates dienen. Die bei der Rechnung benutzten Epochen waren:

Ep.	Maximum	H	Ep.	Minimum	H
(0)	1884 Aug. 30	7 ^m 3	(+1/2)	1885 Jan. 28	9 ^m 4
(+1)	1885 Juni 1	7.1	(+1 1/2)	1885 Oct. 23	9.4

Hiermit erhält man für die Periodenlänge:

$$\begin{aligned} \text{Aus den Maximis} & 275^d \\ \text{Aus den Minimis} & 268 \\ \text{Mittel: } P &= 271^d 5 \end{aligned}$$

Während der hiesigen Zonenbeobachtungen wurde der Stern am 29. April und 9. Mai 1880 beobachtet. Die Helligkeitsschätzungen an beiden Tagen ergaben identisch 7^m0. Der Stern war folglich ganz in der Nähe des Maximums beobachtet; man hat daher genähert:

$$\text{Ep. } (-6) = 1880 \text{ Mai } 4.$$

Während der Bonner Durchmusterung wurde der Stern am 17. Febr. 1857 als 7^m5 beobachtet, dagegen am 18. April