DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

XXVI. Jahrgang.

Redaction: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. A. Eulenburg und Dr. J. Schwalbe, Berlin. — Verlag: Georg Thieme, Leipzig.
W. Lichtensteinallee 3. W. Am Karlsbad 5. Rabensteinplatz 2.

INHALT.

- I. Nierenausschaltung durch Harnleiterunterbindung. Von Prof. Dr. L. Landau in Berlin. S. 749.
II. Ueber die bindegewebige Induration des Herzfleisches (Myofibrosis cordis). Von Prof. Dr. K. Dehio in Dorpat. S. 750.
III. Zweiter Bericht über Malaria und Moskitos an der afrikanischen Westküste. Von Marinestabsarzt Dr. H. Ziemann in Wilhelmshaven. S. 753.
IV. Ein Fall von tödtlicher parenchymatöser Colonblutung. Von Dr. L. Huismans, Oberarzt am St. Vincenzhause in Köln. S. 756.
V. Ueber traumatisches Coma diabeticum. Von Dr. W. Spitzer in Karlsbad. S. 757.
Aus der ärztlichen Praxis: Ein Fall von Varicella maligna. Von Dr. Friedmann in Beuthen. S. 759. — Schwere Hyperemesis durch Druck eines Scheidenpessars. Von Dr. Wichert in Cüstrin. S. 759.

- Auswärtige Correspondenzen:** Londoner Brief. Von Dr. J. P. zum Busch in London. S. 759.
Öffentliches Sanitätswesen: Pestepidemie im Dorfe Kolobowka im Jarew'schen Kreise des Astrachan'schen Gouvernements. Von Dr. M. J. Arustamow in Astrachan. S. 761.
Standesangelegenheiten: Die Beschränkung der Kassenärzte in der Verordnung von Medikamenten. Von Dr. jur. Biberfeld in Hamburg. S. 763.
Correspondenzen und Erwiderungen: Vorläufige Mittheilung über die bactericide Wirkung der unsichtbaren Strahlen des Inductionsfunkens. Von Dr. H. Strebel in München. S. 764.
Kleine Mittheilungen. S. 764.

I. Nierenausschaltung durch Harnleiterunterbindung.

Von L. Landau, Berlin.

Bei Operationen in der Bauch- und Beckenhöhle werden Harnleiter nicht allzu selten in Folge mangelnder Technik und Uebung verletzt, ohne dass es die Art der zu heilenden Erkrankung erforderte. Indessen giebt es pathologische Prozesse, bei deren Operation die Verletzung des Harnleiters eine unvermeidliche, ja für das Gelingen der Operation unter Umständen sogar nothwendige ist. Ich rechne hierher die Fälle von Exstirpation weit vorgeschrittener Carcinome des Uterus, die man in der Regel operativ zu entfernen sich hütet und die man meines Erachtens darum fälschlich als inoperable bezeichnet und dementsprechend behandelt. Es sind dies in der Regel diejenigen Carcinome, welche lateral vom Cervix in die parametranen Gegend eingebrochen sind und auf grössere oder kleinere Strecken den Harnleiter umstrickt oder ihn selbst bereits infiltrirt haben. Jeder Versuch, im Reinen zu operiren, muss hier den Harnleiter treffen. Bei wesentlich einseitiger Entwicklung der Neubildung halte ich in derartigen Fällen eine Totalexstirpation des Krebses nicht für aussichtslos und bei dem heutigen Stande der Technik für gerechtfertigt. Von der Vervollkommenheit dieser, wie sie zum Theil durch die erneute Anwendung der abdominalen Exstirpation und die von uns¹⁾ seit 1887 geübte Anwendung der vaginalen Exstirpationsweise mit Klemmen und durch combinirtes Verfahren erreicht worden ist, will ich hier nicht sprechen.

Vielmehr soll hier nur von dem bei der abdominalen Operation ausgebreiteter Carcinome vorkommenden Ereigniss gewisser Harnleiterverletzungen die Rede sein.

Die Frage, wie der Operateur sich nach einem solchen Ereigniss verhalten soll, ist da, wo man im Stande ist, die getrennten Theile zu vereinigen oder den Harnleiter in die Blase zu implantiren, genügend beantwortet. Gute Methoden sind für den direkten und indirekten Schluss des Harnleiters, sowie für dessen Implantation in die Blase in grösserer Zahl angegeben und mit Erfolg ausgeführt worden.

Nicht erledigt ist jedoch die Frage, was geschehen soll, wenn ein so grosses Stück des Ureters excidirt werden musste oder

resecirt worden ist, dass es unmöglich ist, sein oberes Ende bis an die Blase zum Zwecke der Implantation herabzuziehen.

Hier sind von den Operateuren, welchen dieses Ereigniss während der Operation nicht entging, verschiedene Wege zur Heilung dieses, ohne sofortige Reparatur tödtlichen Zufalles, eingeschlagen worden: die Implantation des verletzten Harnleiters in den Dünn- oder Dickdarm, in den andern Harnleiter, Anlegung einer Harnleiterbauchdeckenfistel und endlich die sofortige Nierenexstirpation der betroffenen Seite.

Aber alle diese Verfahren sind in ihren Erfolgen zweifelhaft, wegen der meist schon längeren Dauer des Eingriffs gefährlich und selbst bei gelungener Operation in ihrem Effect quoad vitam so unsicher, dass ein neues, von gutem Erfolg begleitetes Verfahren wohl bekannt gemacht zu werden verdient: es ist das die sofortige Unterbindung des Harnleiters nach der in grösserer Ausdehnung erfolgten Resection desselben. In aller Kürze will ich über einen solchen Fall, bei dem nach meiner Ueberzeugung lediglich durch dieses Vorgehen der baldige Tod der Patientin abgewendet wurde, berichten.

Es handelte sich um eine 38jährige Frau P. mit einem so weit vorgeschrittenen, besonders in das rechte Parametrium eingebrochenen Cervixcarcinom, dass ich selbst die Totalexstirpation für nicht wohl ausführbar hielt. Der Versuch der vaginalen Exstirpation, den ich am 8. Mai d. J. unternahm, schlug in der That fehl, da die weite, hohe, und seitliche Verbreitung des Carcinoms keiner Zange oder Muzeux eine Handhabe bot und dieselben, wo auch immer eingesetzt, ausrissen. Bei dem guten Allgemeinbefinden widerstrebte es mir jedoch, die Patientin ihrem traurigen Schicksal zu überlassen, und ich versuchte am 17. Mai die Totalexstirpation vom Abdomen aus. Allein schon beim energischen Herausholen des Fundus uteri und Zug mit Muzeux'schen Zangen riss der grösste Theil des Corpus von seiner morschen carcinomatösen Basis (Cervixrest und infiltrirtes Parametrium) ab. Eine Unterbindung im carcinomatösen Gewebe war aussichts- und zwecklos, und so erschien es mir als das Beste, die carcinomatösen Massen plus Cervix, theils vom Abdomen, theils von der Vagina aus, soweit es ging, stumpf auszugraben, resp. mit der Scheere abzuschneiden, nachdem vorher lateral im makroskopisch gesunden Gewebe von der Vagina aus Klemmen angelegt worden waren.

Nach der Entfernung des Uterus und des im rechten parametranen Gewebe gelegenen etwa daumengrossen Knotens zeigte es sich, dass der rechte, auf eine Strecke von über 5 cm in diesem Knoten verlaufende Harnleiter in seiner Continuität getrennt und

¹⁾ Siehe L. und Th. Landau, Die vaginale Radikaloperation. Berlin 1896.

auf diese Strecke mit entfernt worden war. Die Operation hatte schon ca. 1½ Stunde gedauert, und das centrale Harnleiterstück war auch nicht im entferntesten der Blasenegend zu nähern, sodass ich schon aus diesen Gründen mich kurzer Hand entschloss, den Ureter am unteren freien Ende zu unterbinden, um eventuell später die Nephrektomie auszuführen. Das periphere Stück des Ureters war nicht sichtbar.

Der Erfolg war ein vortrefflicher. Mit Ausnahme von drei Tagen (vom 8. bis 11. Tage nach der Operation), an welchen die Kranke heftig erbrach und über starke Kopfschmerzen klagte, war trotz der weit über die Hälfte verringerten Urinmenge (noch bis zum 14. Tage) die Reconvalescenz eine ausgezeichnete.

Die Patientin ist bis heute (November) recidivfrei. Was aber für diesen Bericht das wichtigste ist: von Seiten des uropoëtischen Systems sind keinerlei Erscheinungen aufgetreten; bis jetzt ist nicht einmal die Entstehung einer Hydronephrose nachzuweisen; wenn eine solche vorhanden, so ist sie bisher symptomlos verlaufen. Die heute vorgenommene cystoskopische Untersuchung zeigt, dass die rechte Niere functionell total ausgeschaltet ist; die rechte Harnleitermündung ist nur als zartes Grübchen sichtbar.

Der erste, der freilich nur theoretisch in analogen Fällen die Unterbindung des Harnleiters vorgeschlagen hat, war Guyon¹⁾ 1892. Wie ich aus der Litteratur ersah, ist diese Operation vor mir bereits dreimal ausgeführt worden, und zwar von Bastianelli,²⁾ Füh³⁾ und Phenomenow.⁴⁾ Die Würdigung der Litteratur und die ausführliche Publication des Falles wird in der nächsten Zeit mein Assistent, Herr Dr. Weinreb, liefern.

Ich selbst möchte noch ausdrücklich hervorheben, dass ich das von mir mit Erfolg angewendete Verfahren keineswegs bei jeder Ureterenverletzung empfehle. Es darf gerade so wie die Nephrektomie nur als ein Nothverfahren betrachtet werden, da, wo plastische Operationen aussichtslos oder unmöglich sind. Aber als ein Nothverfahren wird es im gegebenen Falle ein sonst verlorenes Leben retten können. Ob der glückliche Verlauf in unseren und den bisher beschriebenen Fällen gestatten wird, die Grenzen der Indication für die Exstirpation sonst für inoperabel gehaltener Carcinome noch weiter als bisher abzustecken, das wird die Zukunft lehren.