Das Trichlorhydrin, $C^6H^5Cl^3$, einer der Glycerinsalzsäureäther, der isomer ist mit dem gechlorten Chlorpropylen, mit Jodkalium, Kupfer und Wasser erhitzt, liefert C^6H^6 (Propylen) und Propylwasserstoff C^6H^8 , Wasserstoff und Kohlensäure.

Man kann somit auf einem neuen Wege vom Glycerin $C^6H^8O^6$ aus zu den correspondirenden Kohlenwasserstoffen übergehen, und somit allen Sauerstoff, den es enthält, hinwegnehmen. Man braucht nur diesen Sauerstoff in Form von Wasser fortzuschaffen und dieses Wasser durch Salzsäure zu ersetzen

und dann für das Chlor Wasserstoff einzuschieben. (*Compt. rend. — Chem. Centrbl. 1857. No. 35.*) B.

Unterschied der Temperaturen, bei denen sich Aether und Schwefelkohlenstoff entflammen.

Jeder Chemiker weiss, wie leicht Aether und Schwefelkohlenstoff Feuer fangen, sobald sie in die Nähe eines brennenden Körpers gebracht werden. Dieser grossen Aehnlichkeit ungeachtet existirt ein grosser Unterschied zwischen den Temperaturen, bei denen diese Flüssigkeiten sich entflammen. Das folgende Experiment zeigt diese Verschiedenheit in auffallender Weise.

Man giesst Aether in die eine, Schwefelkohlenstoff in die andere Untertasse, nimmt aus dem Ofen eine grosse glühende, aber nicht flammende Holzkohle und führt sie rasch in den Aether ein. Sie wird darin erlöschen, ohne den Aether zu entflammen. Man zieht die nicht mehr roth glühende Kohle augenblicklich heraus und taucht sie in den Schwefelkohlenstoff, der durch sie alsbald entflammt wird.

Wenn man im Dunkeln experimentirt, gewahrt man über dem Aether einen ungemein bleich-bläulichen Schein; gleichzeitig oxydirt sich der Aether unter Aldehydbildung, allein eine lebhafte Verbrennung findet nicht statt. (*M. Berthelot, Ann. de Chim. et de Phys. 3. Sér. Avr. 1857. Tom. XLIX. pag. 486 — 487.*) Dr. H. Ludwig.

Neues Reagens auf Jod.

Nach Morid ist das Benzin ein weit empfindlicheres Reagens auf Jod, als Chloroform und Stärke. Es lässt sich mittelst desselben die Gegenwart von 1 Milligramm