Der Name „Niobe“ ist durch die Mehrzahl der Herren Astronomen, welche am 20^{ten} und 21^{ten} August in Dresden versammelt waren, gewählt worden und kommt vor in Homer's Ilias XXIV. 602, 606; Apollodor III. 5, 6; Hygin. fab. 9 und 10; Ovid Met. VI. 148, 156, 165, 273 etc.

Bilk bei Düsseldorf 1861 Aug. 30.

R. Luther.

Einiges über Pseudo-Daphne (56), von Herrn Dr. R. Luther.

Herr Goldschmidt, der sich mit mir in die Wieder-Aufsuchung seines Planeten Pseudo-Daphne (56) so getheilt hatte, dass er vorzugsweise zwischen Hyp. I. u. II. der in *M* 1310 gegebenen Ephemeriden suchte, während ich die grösseren Rectascensionen von 21^h12^m bis 22^h28^m durchmustert habe, hat am 27^{ten} August den wohlverdienten Lohn für seine grosse Ausdauer darin gefunden, dass er den Planeten mit der sternreichen akademischen Charte 20^h des Herrn Dr. Hencke gleichsam aufs Neue entdeckt hat. Die tägliche Bewegung zeigt eine befriedigende Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung, und der Ort des Planeten ist nach der Beobachtung nur 6' nördlich von der Curve, die aus meinen Elementen folgen würde.

Folgende nur ganz flüchtig entworfen

Elemente III. (56)

Epoche 1857 Sept. 13 0^h Berlin

$M = 36^{\circ} 9' 5$

$\pi = 294 40,6$

$\Delta = 194 39,5$

$i = 8 3,5$

$\phi = 13 7,6$

$\mu = 846'' 72$

Mittl. Äquin. 1861,0

hatten bloss den Zweck, die Beobachtungen von 1857 und 1861 vorläufig zu verbinden, und zeigen zugleich die Verschiedenheit des Planeten (56) von Daphne.

Folgende ebenfalls nur flüchtig berechnete Ephemeride wird die Rectascensionen wahrscheinlich etwas zu klein geben:

0 ^h Berlin	AR. in Zeit	Decl.	log Δ
1861 Aug. 28	20 ^h 26 ^m 3 ^s	—6°44' 1	0,0400
29	25 48	52,3	
30	25 35	—7 0,4	
31	25 24	—7 8,4	

Bilk bei Düsseldorf 1861 Sept. 4.

0 ^h Berlin	AR. in Zeit	Decl.	log Δ
1861 Sept. 1	20 ^h 25 ^m 24 ^s	— 7°16' 4	0,0498
2	25 7	24,3	
3	25 2	32,2	
4	24 58	39,9	
5	24 56	47,6	0,0605
6	24 56	55,2	
7	24 58	— 8 2,7	
8	25 2	10,0	
9	25 8	17,3	0,0720
10	25 16	24,4	
11	25 25	31,5	
12	25 37	38,5	
13	25 50	45,3	0,0841
14	26 5	52,0	
15	26 23	58,5	
16	26 42	— 9 4,9	
17	27 3	11,2	0,0966
18	27 25	17,3	
19	27 50	23,3	
20	28 16	29,2	
21	28 44	34,9	0,1095
22	29 14	40,4	
23	29 46	45,8	
24	30 20	51,0	
25	30 55	56,1	0,1228
26	31 31	—10 1,0	
27	32 10	5,8	
28	32 50	10,4	
29	33 32	14,8	0,1362
30	34 15	19,0	
Oct. 1	35 0	23,1	
2	35 47	27,0	
3	36 35	30,8	0,1498
4	37 25	34,4	
5	38 16	37,8	
6	39 8	41,0	
7	20 40 3	—10 44,1	0,1634

R. Luther.

Elemente des Cometen II. 1861, von Herrn Auwers.

Von dem Cometen II. 1861 habe ich folgende Positionen bestimmt:

	M. Zt. Königsb.	α	δ
Aug. 21	10 ^h 36 ^m 19 ^s 5	15 ^h 22 ^m 9 ^s 67	+44°40' 36'' 9
30	9 57 56,7	15 32 8,94	+43 41 38,0

Beide beruhen auf sehr guten Sternörter.

An die erste dieser Beobachtungen, die erste von *Liais* und das Mittel aus der Pariser und Bilk's vom 18^{ten} Juli versuchte ich vergeblich eine Parabel anzuschliessen; der mittlere Ort liess sich nur bis auf 1' darstellen. Durch Variation von M und $\frac{1}{a}$ ergab sich vielmehr folgende Ellipse:

$$\begin{aligned} T &= \text{Juni 11,55058 Greenwich} \\ \pi &= 249^\circ 7' 15''4 \\ \Omega &= 278 57 30,0 \\ i &= 85 29 18,5 \\ \log q &= 9,915033 \\ \log e &= 9,995242 \quad \text{Bew. direct.} \\ &\text{Umlaufszeit 656 Jahre.} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Mittl. Äquin. 1861}$$

Nach Vollendung dieser Rechnung wurden mir die Beobachtungen von *Moesta* bekannt. Wie diese in dem Pariser Bulletin angegeben sind, enthalten sie mehrere Fehler, deren Verbesserung indess zweifellos ist. Juni 10 ist nämlich der Comet mit dem Sterne A. Z. 322, $\mathcal{M}$ 108, verglichen, dessen Declination für 1861,0 nach *Argelander* $-27^\circ 53' 28''6$ ist, während Lal. 7574 für denselben $-27^\circ 52' 34''8$ giebt; die Vergleichung der Beobachtung vom 10^{ten} Juni mit der vom 12^{ten} und den *Liais*'schen zeigt nun, dass die von *Moesta* benutzte Decl. der Zonen um $+1'$ zu corrigiren ist. Ferner

Königsberg 1861 Sept. 2.

ist Juni 12 $\Delta\delta +$ statt $-$ zu nehmen. Nach Anbringung dieser Verbesserungen habe ich die Beobachtungen Santiago Juni 10 und 12, und Rio Janeiro Juni 11 und 13 in den Normalort vereinigt

Juni 12,0 Gr. $\alpha\mathcal{C} = 61^\circ 14' 7''6$ $\delta\mathcal{C} = -27^\circ 18' 59''8$ mit Ausschluss jedoch der stärker abweichenden und bei einer $\Delta\alpha$ von 7^m wohl weniger sicheren AR. von Juni 10.

Die Beobachtungen Bilk Juli 22 und London Juli 23 geben den zweiten Ort

Juli 23,0 Gr. $\alpha\mathcal{C} = 221^\circ 27' 31''2$ $\delta\mathcal{C} = +50^\circ 43' 32''6$.

Indem ich ohne eine Hypothese über die Natur des Kegelschnitts aus diesen beiden Örtern und meiner Beobachtung vom 30^{ten} Aug. die Bahn des Cometen bestimmte, fand ich eine der vorigen nahe kommende Ellipse, deren Elemente sind:

$$\begin{aligned} T &= \text{Juni 11,55081 Greenwich} \\ \pi &= 249^\circ 7' 20''6 \\ \Omega &= 278 58 8,7 \\ i &= 85 28 52,1 \\ \log q &= 9,9150472 \\ \log e &= 9,9949560 \\ \log a &= 1,8525784 \quad \text{Bew. direct.} \\ &\text{Umlaufszeit} = 601^0. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Mittl. Äquin. 1861,0}$$

A. Aumers.

Verkäufliches Passageninstrument.

Es ist bei mir ein im besten Zustande befindliches transportables Passageninstrument von *Elliot, Brothers*, zum Verkauf deponirt. Das Fernrohr hat ein achromatisches Objectiv von 20 Pariser Linien Öffnung und 24 Zoll Brennweite, und zwei astronomische Oculare, von denen eins mit einem Prisma versehen ist. Die Fadenbeleuchtung geschieht durch die Horizontalachse. Die Zapfen sind von Glockenmetall. Das Instrument hat einen Verticalkreis von 5 Zoll Durchmesser, mit zwei Nonien, die unmittelbar Minuten angeben. An dem Nonienträger ist eine Libelle. Eine zweite Libelle dient zum Nivelliren der Hauptachse. Das Stativ ist von Messing. Beigegeben ist noch eine Lampe zur Fadenbeleuchtung. Das Ganze lässt sich in einen dazu gehörigen Kasten verpacken, der nahezu 30 Zoll lang, 16 Zoll breit und 9 Zoll hoch ist. Preis 120 Preuss. Thaler.

P.

Inhalt.

- (Zu Nr. 1325.) Schreiben des Herrn *Secchi*, Directors der Sternwarte des Coll. Rom. an den Herausgeber 63. —
Schreiben des Herrn *Goldschmidt* an den Herausgeber 69. —
 χ Cygni in der Periode der Sichtbarkeit 1861, von Herrn Prof. *Heis* 69. —
Beobachtungen am *Reichenbach'schen* Meridiankreise der Königsberger Sternwarte, von Herrn *Sievers* 71. —
Moon Culminations taken at the Observatory Williamstown, Victoria 73. —
Fernere Beobachtungen des Planeten (71) Niobe, von Herrn Dr. R. *Luther* 75. —
Einiges über Pseudo-Daphne (56), von Herrn Dr. R. *Luther* 77. —
Elemente des Cometen II. 1861, von Herrn *Aumers* 77. —
Verkäufliches Passageninstrument 79. —