Schreiben des Herrn Professors *Aguilar*, Directors der Sternwarte in Madrid, an den Herausgeber.

L'apparition d'étoiles filantes de la période de Novembre a été observée à Madrid dans la matinée du 14, et elle a été assez belle pour que je vous en donne quelques renseignements.

D'abord on veilla toute la nuit du 12 au 13, et le nombre horaire d'étoiles filantes observées a été très-petit; de 6 à 8 au plus.

Dans la nuit du 13 au 14 jusqu'à minuit, le nombre des météores constatés a été aussi très-petit, mais dès minuit à deux heures ce nombre alla en augmentant toujours, et les deux observateurs, chargés cette nuit de ce travail, comptèrent jusqu'à deux cents; petites et peu brillantes presque toutes, se mouvant dans la direction Est-Ouest, et le point de radiation était dans la constellation du Lion. On doit, cependant, distinguer dans ce nombre 6 ou 7 bolides d'une éclatante blancheur qu'illuminèrent complètement les champs voisins à l'Observatoire d'une clarté aussi vive que celle de la pleine lune.

De 2^h à 3^h la fréquence de météorites augmenta encore, et le nombre qui fût signalé pendant cet intervalle monta à 350. On doit remarquer ici qu'à 2^h 33^m un bolide magnifique éclata, sans bruit perceptible, entre les étoiles μ et λ Ursa^e majoris et se mouvant vers α de la même constellation, parcourant une trajectoire qu'on estima à 4 ou 5 degrés, et dont l'apparition dura un peu plus d'une seconde. Le bolide se résolut en un nuage fort brillant qui augmenta d'une manière rapide, jusqu'à atteindre un diamètre de 6 à 8 degrés, se dissipant d'abord par le centre, persistant encore en forme d'anneau. La durée totale du phénomène fut de 10 minutes comptés au chronomètre.

Depuis 3^h du matin l'augmentation fût peu sensible et le nombre de météorites observés est à peu près égal à celui de l'heure qui précède.

C'est depuis 4^h qu'on constata une augmentation remarquable, et entre 5^h et 5^h 30^m on compta 20 étoiles filantes par minute. Ces étoiles étaient, en général, d'une magnitude supérieure à celles observées dans les heures antérieures et 10 au moins de première grandeur. Généralement les trajectoires étaient très-petites, surtout celles qui se trouvaient près le point de radiation de la plupart, situé dans le voisinage de l'étoile γ Leonis.

A ce moment le nombre d'étoiles filantes paraissait diminuer un peu, mais il faut faire attention que l'aurore avait commencée, et les plus petits de ces météorites de-

vaient disparaître devant la lumière crépusculaire.

La couleur de la plupart des étoiles filantes était bleuâtre; les blanches étaient aussi en grand nombre, quelques unes d'une couleur rouge très-vive, et le plus petit nombre d'un joli vert émeraude: une de ces dernières fût observée à 5^h 9^m et laissa derrière-elle une traînée lumineuse comme une fusée qui persista pendant long-temps.

Il est bien difficile de fixer l'heure du maximum que je crois arriva lorsque les observations étaient déjà gênées par la lumière de l'aurore, et je fonde cette opinion en ceci. Entre 6^h 10^m et 6^h 35^m, lorsque toutes les étoiles du ciel avaient été effacées par la lueur crépusculaire, et on n'y voyait plus ni Vénus dans la région orientale, ni Mars près du zénith, ni même Sirius au S. O. on compta 13 météores d'une blancheur éclatante, et qui semblaient tomber verticalement sur la capitale. L'observation termina par l'apparition du Soleil, qui eût lieu 5 minutes après l'observation de la dernière étoile filante signalée par les observateurs.

Dans la nuit suivante du 14 au 15 on continua les observations, et à minuit 20 minutes, pendant qu'un observateur descendait de la terrasse de l'édifice et l'autre y montait pour le relever, il se forma, on ignore comment, dans la constellation Ursa major, entre les étoiles β et ψ , un nuage lumineux de figure irrégulière et variable par instants, et d'une grandeur trois ou quatre fois celle de la Lune. Etonné de cette apparition dont l'aspect ressemblait à celui d'une grande comète, le second observateur descendit pour appeler son collègue, et, d'accord tous les deux sur l'étrange phénomène qui se présentait à leurs regards, décidèrent l'examiner avec une équatorial établie dans une petite tour au milieu du champ. Mais pendant qu'ils préparaient l'instrument le nuage disparut complètement. Avait-il été produit par l'apparition de quelque bolide semblable à celui qu'on observa la veille à 2^h 33^m? Il est très-probable. Dans le reste de la nuit le nombre d'étoiles filantes fut très-petit. Il est vrai qu'à trois heures du matin le ciel commença à se couvrir de nuages, et qu'à quatre heures il était complètement voilé.

Esperons, donc, des nouvelles de l'Amérique qu'avec des conditions atmosphériques favorables on aura, peut-être, observé le phénomène dans toute sa splendeur.

Je joins ici l'observation du passage de Mercure sur le disque du soleil observée dans des conditions atmosphériques excellentes.