Datum	M. Z. Utrecht	Schätzung	Nova	Bemerk.
1902 Febr. 16	11 ^h 0	$d\ 1\ N\ 5\ h$	8 ^m 06	2
» 25	11.2	$d\ 2\ N\ 4\ h$	8.16	} 1, 2
Juni 25	13.0	$h\ 2\ N\ 1\ m$	8.83	
» 27	12.8	$h\ 1\ N\ 1\ m$	8.76	
Juli 6	13.3	$m\ 1\ N$	8.89	
» 14	13.4	$N = m$	8.97	
» 23	14.2	$h\ 2\ N\ 1\ m$	8.83	}
Sept. 6	13.4	$m\ 1\ N\ 3\ n$	9.05	
» 8	13.7	$m\ 3\ N$	9.2	
» 23	10.1	$m\ 3\ N$	9.2	
1902 Sept. 23	11.0	$n\ 1\frac{1}{2}\ N\ 1\frac{1}{2}\ s$	9.57	4
» 27	11.2	$n\ 3\ N\ 3\ s$	9.60	5
» 28	11.3	$n\ 3\ N\ 3\ s$	9.69	1

Datum	M. Z. Utrecht	Schätzung	Nova	Bemerk.
1902 Okt. 30	13 ^h 8	$n\ 4\ N\ 1\frac{1}{2}\ s$	9 ^m 78	1
Nov. 17	5.8	$n\ 1\frac{1}{2}\ N\ 3\ s$	9.55	6
1903 Jan. 7	14.0	$n\ 1\ N\ 4\ s$	9.44	
Febr. 16	10.8	$n\ 1\frac{1}{2}\ N\ 3\ s$	9.65	
Juli 19	12.8	$n\ 3\ N\ 1\ s$	9.90	
Aug. 15	10.5	$s\ 1\ N\ 5\ t$	10.25	
» 25	12.8	$N = s$ oder $N\ 1\ s$	10.05	1
Sept. 1	12.7	$s\ 1\frac{1}{2}\ N\ 5\ t$	10.31	
» 17	11.8	$n\ 4\ N\ 1\ s$	9.94	
1904 Juli 19	13.0	$s\ 2\frac{1}{2}\ N\ 2\frac{1}{2}\ t$	10.55	
Okt. 3	8.5	$s\ 4\ N\ 2\ t$	10.70	
Dez. 30	14.8	$s\ 4\ N\ 4\ t$	10.55	
1905 Jan. 13	12.8	$s\ 5\ N\ 2\ t$	10.74	

Bemerkungen.

1. Sehr klar. — 2. Mond. — 3. Letzte Beobachtung im Kometensucher. — 4. Erste Beobachtung im Zehnzöller. Der Sucher S gab $m\ 3\ N = n$. Mond. — 5. Der Sucher S gab $N\ 1\ n$. — 6. Der Sucher S gab $n\ 1\ N\ 4\ s$.

Utrecht, 1905 Jan. 15.

A. A. Nijland.

Beobachtungen der Nova Geminorum.

Im folgenden erlaube ich mir, die von Herrn *J. v. d. Bilt* und mir angestellten Helligkeitsschätzungen der Nova Geminorum mitzuteilen. Wir benutzten bis Ende April 1903 den Sucher ($a = 73\text{ mm}$, $f = 118\text{ cm}$) des Refraktors, später den Refraktor selbst ($a = 260\text{ mm}$, $f = 319\text{ cm}$). Außer den von Herrn J. A. Parkhurst (Popular Astronomy XI p. 330) gegebenen Vergleichsternen:

$a = \text{BD.} + 30^\circ 13' 14''$	$H = 8^m 19$
$B = \text{BD.} + 30^\circ 13' 00''$	8.25
$d = \text{BD.} + 30^\circ 13' 06''$	9.02
$G = \text{BD.} + 30^\circ 13' 20''$	9.20
$F = \text{BD.} + 30^\circ 13' 16''$	9.62
o	11.19
p	11.99
s	13.1

wurden auch noch BD. $+30^\circ 12' 97''$ ($8^m 2$) und $P = \text{BD.} + 30^\circ 13' 21''$ ($9^m 2$) benutzt und ein Sternchen x (Hagen, Popular Astronomy XI p. 344, Nr. 79), das für mein Auge zwei Stufen schwächer als s ist, und das ich also ungefähr $13^m 3$ schätze.

Übrigens kann auf die absoluten Helligkeiten der Vergleichsterne kein großes Gewicht gelegt werden. Trotzdem habe ich außer den Original-Schätzungen (4. Spalte) auch

Utrecht, 1905 Jan. 16.

die aus den Vergleichsternen hergeleitete Größe H der Nova (5. Spalte) angegeben.

Datum	M. Z. Utrecht	Bb.	Schätzung	H
1903 März 27	11 ^h 3	N	$B\ 1\ N\ 1\ a$	8 ^m 22
» 27	11.3	B	$N = B$	8.25
» 29	11.5	B	$N = \text{BD.} + 30^\circ 12' 97''$	8.2
April 14	10.3	B	$d\ 1\ N\ 1\ G$	9.11
» 16	9.2	B	$N = d$	9.02
» 18	10.0	B	$N = d$	9.02
» 18	12.0	N	$G\ 1\ N\ 2\ F$	9.34
» 29	9.4	B	$N = P$ oder $F\ 3\ N\ 1\ P$	9.25
Aug. 31	15.3	N	$o\ 2\ N\ 2\ p$	11.6
Sept. 1	13.7	N	$o\ 3\ N\ 2\ p$	11.7
» 17	14.0	N	$o\ 2\ N\ 2\ p$	11.6
» 18	13.0	B	$o\ 2\ N\ 4\ p$	11.5
» 18	13.5	N	$o\ 2\ N\ 2\ p$	11.6
» 20	13.1	B	$o\ 2\ N\ 3\ p$	11.5
1904 Nov. 14	12.5	N	$s\ 1\ N\ 1\ x$	13.2
Dez. 30	15.8	N	$s\ 3\ N = x$ oder $x\ 1\ N$	13.3

Beobachtungen bis April 29 im Sucher, die späteren im Refraktor.

A. A. Nijland.

Bedeckung des Sterns BD. $-6^\circ 61' 91''$ durch Jupiter 1903 Sept. 19.

Der Eintritt konnte hier nicht beobachtet werden. Als Jupiter sichtbar wurde, etwa um $6^h 43^m$, war der Stern schon verschwunden. Den Austritt beobachtete ich im 10-Zöller (Vergr. 267) um $8^h 25^m 38^s$ M. Z. Utrecht in einer jovizentrischen Breite von -50° . Die Luft war schlecht und der Jupitersrand wallte ziemlich stark. Der Stern war unmittelbar

nach dem Austritte so äußerst schwach, daß die Notierung möglicherweise zu spät gemacht ist; die Unsicherheit mag 10^s betragen.

Herr H. Struve hat in Nr. 3915 die an verschiedenen Sternwarten erhaltenen Beobachtungen der seltenen Erscheinung zusammengestellt. Ich möchte auch die hiesige Beob-