vielmehr als einfache Bindegewebscyste ansprechen. Er ist ein Unikum, denn etwas ähnliches scheint bisher noch niemals beschrieben zu sein.¹⁾

Über die Entstehung dieser Cyste bleiben wir völlig im unklaren, um so mehr, als sie verhältnismässig schnell gewachsen sein muss (in 1½ J.).

Am nächsten läge es, eine Ausstülpung der Dura an einer kongenital verdünnten Stelle anzunehmen. Aber dann hätte in dem Cystensack doch höchstens derselbe Flüssigkeitsdruck herrschen können wie im Duralsack, und es hätte nicht zu einer Kompression der Medulla kommen können. Auch spricht das Ergebnis der Lumbalpunktion gegen eine Kommunikation zwischen Cyste und Subduralraum. Eine zweite Möglichkeit wäre sekundäre Bildung der Cyste im Anschluss an einen entzündlichen Prozess. Diese Möglichkeit liegt nicht so entfernt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wenigstens demonstrierte mir vor kurzer Zeit Herr Kollege Schmorl als zufälligen Sektionsbefund eine intradurale Cyste von 5 cm Länge. Dieselbe, in der Höhe des mittleren Dorsalmarkes gelegen, war durch entzündliche Verwachsungen der Pia mit der Rückenmarksoberfläche einerseits und mit der Dura andererseits zustande gekommen und war ebenfalls prall mit Flüssigkeit gefüllt, hatte sogar zweifellos Druck ausgeübt, denn das Rückenmark war hier ein wenig abgeplattet.

In unserem Falle fehlten aber narbige Verwachsungen der Cyste und es bleibt also nichts anderes übrig, als ein selbständiges Wachstum derselben anzunehmen, wobei dann vermutlich der Druck des Cysteninhaltes ziemlich starken Schwankungen unterlegen war. Jedenfalls würden sich so der Wechsel der klinischen Erscheinungen und die schnelle Rückbildung der Kompressionserscheinungen am besten erklären.

3.

Auffallende Störung des Lokalisationsvermögens in einem Falle von Brown-Séquardscher Halbblähmung.

Von

Prof. Dr. Ad. Schmidt (Dresden).

Im 22. Bande dieser Zeitschrift (S. 1) findet sich eine Mitteilung von A. Schittenhelm über eine auffallende Beeinträchtigung des Lokalisationsvermögens von Hautreizen in einem Falle von Brown-Séquardscher

1) Nachtrag bei der Korrektur: Wie ich aus einem mir freundlichst übersandten Separatabdruck ersehe, haben die Herren Spiller, Mussler und Martin (a case of intradural spinal cyst, with operation and recovery; University of Pennsylvania. Bulletin 1903, March and April) einen ähnlichen Fall beobachtet, doch scheint es sich hier um eine Piacyste, vielleicht entzündlicher Natur, nach Art der im folgenden erwähnten, gehandelt zu haben. Unser Pat. ist inzwischen völlig geheilt.

Halblähmung nach einer Stichverletzung des Rückenmarkes. Die Störung betraf das Bein der gekreuzten Seite, welches gleichzeitig — ganz entsprechend dem Schema — ausgesprochene Analgesie und Thermanästhesie, dagegen lediglich gut erhaltene Berührungsempfindung und völlig normale Lage- und Bewegungsempfindung aufwies. Schittenhelm hat diesen Fall zum Ausgangspunkt einer grösseren Untersuchungsreihe über das Lokalisationsvermögen der Haut bei verschiedenartigen Sensibilitäts- und Motilitätsstörungen gemacht (ibid. S. 428), deren Ergebnis im Gegensatz zu den gleichartigen Untersuchungen O. Foersters¹⁾ besagt, dass die Sensibilität von grösstem Einfluss auf das Lokalisationsvermögen ist, derart, dass, je vollständiger und ausgedehnter dieselbe geschädigt ist, um so grössere Einbusse auch die Fähigkeit zu lokalisieren erleidet, während Motilität und Lage- und Bewegungsempfindungen ganz oder doch fast ganz ohne Einfluss auf das Lokalisationsvermögen sind.

Bei dem völligen Kontrast der Untersuchungsergebnisse Schittenhelms und Försters und der klinisch und psychologisch gleich hohen Bedeutung einer genaueren Erforschung des Lokalzeichens und seiner Störungen unter pathologischen Verhältnissen möchte ich, mit gütiger Erlaubnis meines früheren Chefs, Geh.-Rat Schultze, kurz einen ganz ähnlichen Befund mitteilen, den ich vor Jahren als Assistent der Bonner medizinischen Poliklinik aufgenommen habe. Er betrifft ebenfalls eine Stichverletzung des Rückenmarks mit Brown-Séquardscher Lähmung. Die Beobachtung ist freilich nicht so detailliert durchgeführt, wie diejenige Schittenhelms.

Herr J. W., 32 Jahre, Klempner. Letzte Untersuchung Sommer 1902.

Anamnese: Früher stets gesund. Am 20. Jan. 1889 bei einer Schlägerei Stich in den Rücken. Er fiel sofort zusammen und wurde in die chirurgische Klinik gebracht. Das linke Bein war völlig gefühllos, aber beweglich und schwoll anfangs etwas an; das rechte Bein war gelähmt, aber sehr empfindlich, so dass bereits bei leisen Berührungen heftige Schmerzen entstanden. Spontane Schmerzen waren nur an einer Stelle oberhalb des rechten Knies vorhanden (s. u.). Anfangs auch Schwäche beim Wasserlassen und Stuhlgang. Besserung im Verlaufe mehrerer Monate. Er lernte wieder gehen, wenn auch — wegen der Steifigkeit im rechten Bein — unter Hinken und wurde allmählich wieder voll arbeitsfähig. Jetzt merkt er nur noch geringe Gefühlsstörungen am linken Bein und Steifheit des rechten.

Status praes.: Kräftiger, gesund aussehender Mann. Innere Organe normal, desgleichen Sinnesorgane, Gehirnnerven und obere Extremitäten. Am Rücken findet sich in der Höhe des Dornfortsatzes des 12. Brustwirbels eine feine Narbe. Dasselbst geringe Anschwellung der Weichteile, aber keine Druckempfindlichkeit. Beweglichkeit der Wirbelsäule intakt.

Beim Gehen wird das rechte Bein ziemlich steif gehalten, die Fusspitze schleift am Boden. Die Muskulatur dieses Beines ist in toto etwas atrophisch (Oberschenkelumfang $5\frac{1}{2}$, Unterschenkelumfang $2\frac{1}{2}$ cm weniger als links), aber hart, kräftig und bei passiven Bewegungen spastisch. Der rechte Fuss ist in geringer Equinusstellung fixiert. Patellarreflex rechts gesteigert, auch von der Tibia auslösbar. Kein Fussklonus; Babinski rechts angedeutet. Kremasterreflex fehlt rechts, Bauchdeckenreflex beiderseits positiv.

1) Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. 1901. Bd. IX. S. 31.

Sensibilität. Linkes Bein: Berührungsempfindung durchaus normal. Schmerzempfindung (Nadelstiche) und Temperatursinn am ganzen Fuss und Unterschenkel, sowie an der Rückseite des Oberschenkels stark gestört, wenn auch nicht völlig aufgehoben. Bewegungs- und Lagegefühl in allen Gelenken normal. Das Lokalisationsvermögen ist am ganzen linken Unterschenkel und dem Fussrücken (nicht an der Fusssohle und weniger am Oberschenkel) auffallend schlecht, so dass der intelligente Kranke immer nur angeben kann, der Unterschenkel sei berührt, ohne jede Orientierung.

Rechtes Bein: Berührungsempfindung ebenfalls normal, abgesehen von einer zirkumskripten Stelle oberhalb des rechten Knies, wo eine geringe Herabsetzung besteht. Dieses soll derselbe Fleck sein, der auch früher stärker und gelegentlich jetzt noch schwach schmerzt (s. o.) Keinerlei Störungen der Schmerzempfindung und des Temperaturgefühls. Starke Herabsetzung des Bewegungsgefühls und der Lageempfindung in den Zehengelenken, im Fuss- und Kniegelenk, nicht im Hüftgelenk. Lokalisationsvermögen am ganzen Bein tadellos erhalten.

Es entspricht dieser Befund dem typischen Verhalten bei der Brown-Séquardschen Lähmung. Bemerkenswert ist, dass sich 13 Jahre nach der Verletzung noch so deutliche Störungen der Sensibilität nachweisen lassen. Wie in Schittenhelms Fall und in mehreren der von Köbner¹⁾ zusammengestellten älteren Beobachtungen ist das Lokalisationsvermögen auf der homolateralen Seite ungestört, obwohl hier die Lage- und Bewegungsempfindung stark beeinträchtigt ist. Auf der kontralateralen Seite dagegen ist es auffallend schlecht, zumal am Unterschenkel und Fuss (mit Ausnahme der Fusssohle). Dabei ist das Tastgefühl hier durchaus gut, nur Schmerzempfindung und Temperatursinn sind gestört.

Einer Verwertung dieser Beobachtung für die Theorie des Lokalisationsvermögens möchte ich mich enthalten. Wenn unser Fall auch auf der einen Seite für die Auffassung Schittenhelms spricht, dass Störungen der Lage- und Bewegungsempfindungen nicht notwendig solche des Lokalisationsvermögens nach sich zu ziehen brauchen, so beweist er doch andererseits nicht ohne weiteres die Abhängigkeit desselben von der Hautsensibilität. Denn das Tastgefühl ist bei unserem Patienten an der Stelle des Lokalisationsverlustes erhalten. Auch bei Schittenhelms Kranken war der Verlust des Tastgefühls kein vollständiger.

Vorläufig dürfte es deshalb zweckmässiger sein, nur die Tatsache zu registrieren. Dieselbe fordert zu weiteren Untersuchungen des Lokalisationsvermögens bei Halblähmungen auf.

1) D. Arch. f. klin. Medizin 19. 1877. S. 169.