III. Bemerkung.

Von
Prof. Dr. P. Baumgarten,
Königsberg i. Pr.

In seinem Aufsatz: „Neue Mittheilungen über die Pathogenie der acuten allgemeinen Milartuberculose“ (d. Bl. No. 24) äussert Weigert, dass er mein Nachweisungsverfahren der Tuberkelbacillen in phthisischen Sputis deshalb nicht empfehlen könne, weil es nicht gestatte, die Vortheile, die der Abbe'sche Apparat mit vollem Strahlenkegel bietet, auszunützen; ausserdem widerspräche dasselbe einem Hauptgrundsatz der histologischen Technik, spärliche und kleine Gebilde dunkel auf hellem Grunde erscheinen zu lassen, und nicht umgekehrt.

Ich kann zu meinem Bedauern diese Ausführungen Weigert's nicht unwiderlegt lassen. Was den ersten Punkt betrifft, so habe ich es gerade als einen Vorzug meiner Methode hingestellt, dass sie es ermöglicht, die Tuberkelbacillen, selbst in vereinzelt Exemplaren, auch ohne Anwendung der Immersionssysteme und des Abbe'schen Beleuchtungsapparates, mit voller Deutlichkeit, und zwar in ihrem natürlichen Zustande, zu sehen (wie es überhaupt bei mir histologischer Grundsatz ist, die Objecte möglichst in ihrer natürlichen Erscheinung zur Anschauung zu bringen). Die Verdeckung der Bacillen durch Gewebskerne, auf welche Weigert als ein nur durch intensive Färbung und Durchleuchtung zu besiegendes Hinderniss der Erkennung hinweist, kommt für meine Methode nicht in Betracht, da durch dieselbe alle Gewebskerne unsichtbar gemacht werden. Ich kann daher den ersten Einwurf Weigert's gegen meine Methode nicht als stichhaltig anerkennen. Was nun zweitens die Bemerkung anlangt, dass mein Verfahren einem Hauptgrundsatz der histologischen Technik widerspräche, so liegt derselben, glaube ich, ein Missverständniss Seitens Weigert's zu Grunde. Meine Methode der Darstellung der Tuberkelbacillen ist keine andere, als die für bakteriologische Untersuchungen altbewährte Kalimethode, die niemals einem Grundsatz der histologischen Technik widersprochen hat und auch heute einem solchen nicht widerspricht. Wenn ich zu Sputumpräparaten, in welchen die darin vorhandenen Tuberkelbacillen durch Kalibehandlung sichtbar gemacht sind, Farbstofflösung in der von mir beschriebenen Weise hinzufüge, so geschieht dies nicht der Tuberkel-, sondern der etwa im Präparate mitvorhandenen Fäulniss- resp. Mundschleimbacillen wegen, um diese letzteren, welche sofort den Farbstoff begierig aufnehmen von den Tuberkelbacillen, welche, ihr natürliches Aussehen bewahrend, vollkommen farblos bleiben, mit Sicherheit zu differenzieren. Die Färbung des Untergrundes spielt dabei in diagnostischer Hinsicht keine Rolle; je besser die Präparate, d. h. je dünner und gleichmässiger die zu untersuchenden Schichten sind, desto heller kann die Farbstofflösung genommen, und somit die Untergrundsfärbung eingeschränkt resp. (für die mikroskopische Betrachtung) auf Null reducirt werden.