Untersuchungen über die Bestandtheile des Magensaftes ;

von Dr. *William Marcet*.

(Gelesen vor der Chemical Society of London am 20. Juni 1861.)

Der Magensaft, welcher zu den folgenden Untersuchungen diente, wurde von zwei mit künstlich angelegten Magen fisteln versehenen Hunden gewonnen. Beide Hunde waren in gutem Gesundheitszustande. Die Ergebnisse waren folgende :

1. Der Magensaft besitzt die Eigenschaft, die Polarisations-ebene des Lichtes nach links zu drehen. Der Magensaft wurde von den Hunden gewonnen, indem dieselben nach vorhergehendem ein- oder zweitägigem Fasten mit klein gehackten weichen Knochen oder Knorpel von der Luftröhre des Schafes oder Ochsen gefüttert wurden. Der so erhaltene Magensaft drehte in allen Fällen die Polarisations-ebene nach links.

2. Dafs diese optische Wirkung des Magensaftes durch die Gegenwart eines Körpers bedingt ist, welcher die chemischen Eigenschaften von *Lehmann's* Pepton besitzt, eines Körpers, welcher während der Verdauung durch die Einwirkung des Magensaftes auf eiweisartige Körper entsteht.

3. Dafs reiner Magensaft, erhalten, wenn nach zweitägigem Fasten des Hundes der Magen sorgfältig mit Wasser ausgespült und die Secretion durch Einführung von Kieselsteinen durch den Schlund erregt wurde, nicht die geringste Einwirkung auf polarisirtes Licht hat, wodurch Annahme 2 bestätigt wird.

4. Ich habe das Drehungsvermögen dieses Bestandtheiles des Magensaftes bestimmt, und zwar so, dafs ich Lösungen von bekanntem Gehalt mittelst eines *Soleil'schen* Saccharimeters untersuchte, welches Instrument überhaupt bei allen diesen

Untersuchungen benutzt wurde, da es sich besonders dazu eignete. Ich fand das Drehungsvermögen einer Lösung von 0,024 Grm. Substanz in 25 CC. Wasser gleich Einem Grade von Soleil's Saccharimeter. Der Magensaft von Hunden, welcher ohne vorhergehendes Auswaschen des Magens und mittelst Knorpel gewonnen wird, besitzt ein Drehungsvermögen von 20 bis 40 Grad (Soleil). 25 CC. dieses Magensaftes oder 25 Grm. (in ganzen Zahlen) enthalten daher 0,48 bis 0,96 Grm. oder 2 bis 4 pC. optisch wirksamen Peptons. Der trockene Rückstand eines Magensaftes, welcher 31° Ablenkung zeigte, enthielt 86 pC. optisch wirksames Pepton; der von einem anderen Magensaft, welcher 7 Grad Ablenkung zeigte und nach Auswaschung des Magens und Fütterung mit Knochen erhalten war, enthielt 31 pC. optisch wirksames Pepton, natürlich unter der Voraussetzung, daß dieser Bestandtheil allein das Drehungsvermögen des Magensaftes bedingt.

5. Daß ich, gestützt auf eine specielle Untersuchung, allen Grund habe, anzunehmen, daß obiges Pepton der einzige optisch wirksame Bestandtheil des Magensaftes ist. Die Quantität dieses Peptons kann daher mittelst eines Polarisationsapparates in irgend einer Quantität Magensaft leicht und sicher bestimmt werden.

6. Ich habe bis jetzt noch nicht bestimmt, ob alle die verschiedenen Peptone diese optische Eigenschaft besitzen; so viel habe ich aber außer Zweifel gesetzt, daß obiges optisch wirksame Pepton durch die Verdauung von Schafs- oder Ochsen-Luftröhre und von knorpelhaltigen Knochen gebildet wird und daher aller Wahrscheinlichkeit nach von der Verdauung des Knorpels herrührt.